

MATEMÁTICA 2

Primer Cuatrimestre de 2014

Práctica *i*

Repaso de números complejos

Consideremos el conjunto $\mathbb{C} = \mathbb{R}^2$, y a un elemento (a, b) lo escribimos en la forma $a + ib$. Se define la operación de suma como la suma habitual en \mathbb{R}^2 y el producto

$$(a + ib)(c + id) = (ac - bd) + i(ad + bc).$$

Si $z = a + bi$, llamaremos $Re(z) = a$ e $Im(z) = b$.

Ejercicio 1. Calcule $(2 + i)(3 + 2i)$, $(2 - i)(3 - 2i)$, i^5 , $(2 + \sqrt{3}i)^3$, $(1 + i)^2$, $(1 - i)^2$, $(1 + i)^4$.

Ejercicio 2. Escribiendo, para $a \in \mathbb{R}$, $a = a + i0$, muestre que \mathbb{C} contiene a \mathbb{R} de manera compatible con el producto, es decir, multiplicar elementos de \mathbb{R} vistos como números complejos es lo mismo que multiplicarlos como números reales.

Ejercicio 3. Muestre con esta definición $i^2 = -1$.

Ejercicio 4. Si $z = a + ib$, se define el conjugado de z , y se lo denota \bar{z} , al número complejo

$$\bar{z} = a - ib$$

Muestre que

(i) $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$

(ii) $\overline{z\bar{w}} = \bar{z} w$ y si $\lambda \in \mathbb{R}$ entonces $\overline{\lambda z} = \lambda \bar{z}$.

(iii) $z\bar{z} = |z|^2$, donde $|z|^2 = a^2 + b^2$, si $z = a + bi$.

(iv) $Re(z\bar{w}) = Re(\bar{z}w) = \langle z, w \rangle$, el producto interno usual de \mathbb{R}^2 .

(v) Sea $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ una transformación \mathbb{R} -lineal, es decir,

$$f(z + w) = f(z) + f(w), \quad \forall z, w \in \mathbb{C}, \quad \text{y} \quad f(\lambda z) = \lambda f(z) \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}$$

Si además $f(zw) = f(z)f(w)$ y $f(1) = 1$, muestre que hay dos posibilidades: o bien $f(i) = i$ (y por lo tanto $f = \text{id}$) o bien $f(i) = -i$ (y f es la conjugación).

Ejercicio 5. (Escritura polar) Si $z = a + bi \neq 0$, y θ es tal que

$$\cos \theta = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \quad \text{sen } \theta = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

muestre que

$$z = |z|(\cos \theta + i \text{sen } \theta)$$

Si $w = |w|(\cos \beta + i \text{sen } \beta)$, muestre que

$$zw = |z||w|(\cos(\theta + \beta) + i \text{sen}(\theta + \beta))$$

Ejercicio 6. Llamemos $U(1) = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ (U por "unitario"). Muestre que si $z, w \in U(1)$ entonces $zw \in U(1)$. También $z^{-1} = \bar{z} \in U(1)$.

Ejercicio 7. Calcule $|z|$ y el ángulo θ para $(2 + i)$, $(2 - i)$, $(3 + 2i)$, $(3 - 2i)$, i , $(2 + \sqrt{3}i)$, $(1 + i)$, $(1 - i)$ y verifique la fórmula de adición de ángulos (y multiplicación de módulos) para los productos realizados en el ejercicio 1.

Ejercicio 8. Sea z un número complejo, muestre que existe un número complejo E de módulo 1 tal que $zE = |z|$.