

Ec. diferenciales con retardo - Práctica 1

1. Consideremos la ecuación lineal

$$u'(t) = a(\tau)u(t) + b(\tau)u(t - \tau) \quad t > 0$$

con $a(\tau), b(\tau) \in \mathbb{R}$. Probar:

- (a) Si $a(\tau) + b(\tau) > 0$, entonces el equilibrio nulo es inestable.
- (b) Si $a(\tau) + b(\tau) < 0$, y $b(\tau) \geq a(\tau)$ entonces el equilibrio nulo es asintóticamente estable.

¿Qué ocurre cuando $a(\tau) + b(\tau) < 0$, y $b(\tau) < a(\tau)$?

2. Para la ecuación de Nicholson

$$u'(t) = -du(t) + bu(t - \tau)e^{-u(t-\tau)}$$

con $b, d > 0$, probar:

- (a) Si $b > d$, entonces existe un equilibrio no nulo u^* . Determinar condiciones suficientes para la estabilidad asintótica local de u^* .
- (b) Si $b < d$ entonces 0 es el único equilibrio, que resulta localmente asintóticamente estable.
- (c) Probar que si $b \leq d$ entonces 0 es un atractor global para las soluciones positivas. Más precisamente, si u es solución con dato inicial $\phi > 0$, entonces $u(t)$ está definida y es positiva para todo $t > 0$, con $u(t) \rightarrow 0$ para $t \rightarrow +\infty$. *Sugerencia:* verificar primero que u no se puede anular. Luego, usar que si $u'(t) \geq 0$ entonces $u(t) \leq f(u(t-\tau))$, con $f(x) = xe^{-x}$.

3. Deducir una fórmula de variación de parámetros para el sistema lineal

$$X'(t) = AX(t) + \sum_{k=1}^N B_k X(t - \tau_k)$$

para $A, B_1, \dots, B_N \in \mathbb{R}^{n \times n}$ y retardos arbitrarios $\tau_1, \dots, \tau_N > 0$. Mostrar que la ecuación característica tiene la forma

$$h(\lambda) := P(\lambda, e^{-\tau_1 \lambda}, \dots, e^{-\tau_N \lambda}) = 0,$$

donde P es un polinomio de grado n en $N + 1$ variables.

4. Para $A, B \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$, probar que

$$h(\lambda) = \lambda^2 - \text{Tr}(A)\lambda + \det(A) + e^{-2\tau\lambda}\det(B) + e^{-\tau\lambda}(d_{AB} + d_{BA} - \text{Tr}(B)\lambda),$$

donde d_{XY} denota el determinante de la matriz formada por la primera columna de X y la segunda columna de Y .

5. Sean $L : C([-\tau, 0], \mathbb{C}^n) \rightarrow \mathbb{C}^n$ lineal y continua y $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{C}^n$ continua. Mostrar que las soluciones de $X'(t) = L(X_t) + f(t)$ con dato inicial $\phi \in C([-\tau, 0], \mathbb{C}^n)$ se pueden escribir en la forma

$$X(t) = X(t, \phi, 0) + X(t, 0, f).$$

6. Encontrar la ecuación característica para el problema con retardo distribuido

$$x'(t) = ax(t) + \int_{t-\tau}^t b(t-s)x(s) ds.$$

7. Sea $L : C([-\tau, 0], \mathbb{R}^n) \rightarrow \mathbb{R}^n$ lineal continua. Probar que λ es raíz característica si y solo si $\bar{\lambda}$ es raíz característica.

8. Considerar el siguiente modelo para el control de los niveles de testosterona:

$$\begin{aligned} R'(t) &= f(T(t)) - b_1 R(t) \\ L'(t) &= g_1(R(t)) - b_2 L(t) \\ T'(t) &= g_2(L(t-\tau)) - b_3 T(t) \end{aligned}$$

donde todas las constantes son positivas y f es una función positiva y estrictamente decreciente en $[0, +\infty)$. Probar que existe un único punto de equilibrio con coordenadas positivas y estudiar su estabilidad.

9. (a) Sean $p(\lambda) = \lambda^2 + r\lambda + s$ y $q \in \mathbb{R}$. Probar que todas las soluciones de la ecuación $p(\lambda) + qe^{-\tau\lambda} = 0$ tienen parte real negativa para todo $\tau \geq 0$, bajo alguna de las siguientes condiciones:

- i. $\frac{r^2}{2} \geq s > |q|$.
- ii. $\frac{r^2}{2} < s$ y $|q| < \frac{r}{2}\sqrt{4s - r^2}$.

Sugerencia: empleando el principio del mínimo, probar que existe $y \geq 0$ tal que $|p(iy)| \leq |p(\lambda)|$ para todo λ tal que $\text{Re}(\lambda) \geq 0$. Calcular explícitamente el valor $|p(iy)|^2$.

(b) Hallar matrices $A, B \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ tales que lo anterior se pueda aplicar al sistema $X'(t) = AX(t) + BX(t-\tau)$.