

## PRÁCTICA 8: MEDIDAS ABSTRACTAS

**Ejercicio 1.** Probar que las siguientes ternas  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  constituyen espacios de medida. En cada caso encontrar los conjuntos de medida nula y caracterizar  $\int_X f(x) d\mu(x)$ .

- (a) **Medida de contar.** Dado un conjunto  $X$  tomamos  $\mathcal{A} = \mathcal{P}(X)$ , y para cada  $E \in \mathcal{A}$  definimos

$$\mu(E) = \begin{cases} \#E, & \text{si } E \text{ es finito,} \\ +\infty, & \text{si } E \text{ es infinito.} \end{cases}$$

- (b) **Medida de contar pesada.** Dada  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  una sucesión de números reales no negativos (denominados pesos), tomamos  $X = \mathbb{N}$  con  $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\mathbb{N})$  y definimos para cada  $E \in \mathcal{A}$

$$\mu(E) := \sum_{n \in E} a_n.$$

- (c) **Medida de Dirac concentrada en  $x_0$ .** Dado un conjunto  $X$  no vacío y  $x_0 \in X$  tomamos  $\mathcal{A} = \mathcal{P}(X)$  y para cada  $E \in \mathcal{A}$  definimos

$$\mu(E) = \begin{cases} 1, & \text{si } x_0 \in E, \\ 0, & \text{si } x_0 \notin E. \end{cases}$$

La medida  $\mu$  se denomina la medida delta de Dirac concentrada en  $x_0$  y se nota  $\delta_{x_0}$ .

- (d) **Medida de Lebesgue pesada.** Tomamos  $X = \mathbb{R}^n$  con  $\mathcal{A}$  la sigma-álgebra de los conjuntos medibles Lebesgue y dada una función medible  $\omega : \mathbb{R}^n \rightarrow [0, +\infty)$  (denominada peso) definimos para cada  $E \in \mathcal{A}$

$$\mu(E) := \int_E \omega(x) dx.$$

**Ejercicio 2.** Probar que toda medida  $\mu$  definida sobre  $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}))$  es una medida de contar pesada para alguna elección adecuada de pesos  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ .

**Ejercicio 3.** Un espacio  $(X, \Sigma, \mu)$  se dice de medida completa si dado  $Z \in \Sigma$  tal que  $\mu(Z) = 0$ , para cada  $Y \subseteq Z$  resulta  $Y \in \Sigma$  y  $\mu(Y) = 0$ . En este caso, probar que:

- (a) Si  $Z_1 \in \Sigma$ ,  $Z_1 \Delta Z_2 \in \Sigma$  y  $\mu(Z_1 \Delta Z_2) = 0$ , entonces  $Z_2 \in \Sigma$ .  
 (b) Si  $f$  es medible y  $f = g$  a.e., entonces  $g$  es medible.

**Ejercicio 4.** Sea  $(X, \mathcal{A})$  un espacio medible y  $\mu : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$  una aplicación tal que:

- (i) Si  $A, B \in \mathcal{A}$  son disjuntos, entonces  $\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$ ,  
 (ii) Si  $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{A}$  y  $A_n \searrow \emptyset$ , entonces  $\lim_n \mu(A_n) = 0$ .

Probar que  $\mu$  es una medida.

**Ejercicio 5.** (Pushforward de una medida). Sea  $(X, \mathcal{A})$  un espacio medible y  $\mu$  una medida (no negativa) y finita sobre  $X$ . Sea  $F : X \rightarrow \mathbb{R}^n$  una función medible. Probar que la fórmula,

$$\mu_F(E) := \mu(F^{-1}(E)),$$

define una medida sobre la sigma-álgebra de Borel de  $\mathbb{R}^n$  tal que para toda función Borel medible  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  no negativa vale que

$$\int_{\mathbb{R}^n} f d\mu_F = \int_X f \circ F d\mu.$$

Concluir que una función Borel medible  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  es integrable para  $\mu_F$  si y sólo si  $f \circ F$  es integrable para  $\mu$  y que, en este caso,  $\int_{\mathbb{R}^n} f d\mu_F = \int_X f \circ F d\mu$ .

**Ejercicio 6.** Sea  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  un espacio medible con  $\mu$  una medida positiva y finita. Sean  $f \in L^1(X, \mu)$  y  $S \subseteq \mathbb{C}$  cerrado tal que  $\frac{1}{\mu(E)} \int_E f d\mu \in S$  para todo  $E \in \mathcal{A}$  con  $\mu(E) > 0$ . Probar que  $f(x) \in S$ , para casi todo  $x$  (respecto de  $\mu$ ).

**Ejercicio 7.** Sean  $(X, \mathcal{A}, \nu)$  un espacio de medida con signo y  $A, B \in \mathcal{A}$  respectivamente un conjunto positivo y negativo para  $\nu$  tales que:  $X = A \cup B$  y  $A \cap B = \emptyset$ . Dado  $E \in \mathcal{A}$  demostrar las siguientes afirmaciones:

- (a)  $\nu^+(E) = \nu(E \cap A) = \sup\{\nu(H) : H \subseteq E, H \in \mathcal{A}\}$ ,
- (b)  $-\nu^-(E) = \nu(E \cap B) = \inf\{\nu(H) : H \subseteq E, H \in \mathcal{A}\}$ .

**Ejercicio 8.** Sean  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida,  $f$  una función  $\mu$ -integrable y  $\nu$  la medida sobre  $(X, \mathcal{A})$  definida para cada  $E \in \mathcal{A}$  por la fórmula

$$\nu(E) = \int_E f(x) d\mu(x).$$

Dado  $E \in \mathcal{A}$  demostrar las siguientes afirmaciones:

- (a)  $\nu^+(E) = \int_E f^+(x) d\mu(x)$ ,
- (b)  $\nu^-(E) = \int_E f^-(x) d\mu(x)$ .

**Ejercicio 9.** Sean  $\lambda$  y  $\mu$  medidas sobre  $(X, \Sigma)$  con  $\lambda(X) < +\infty$ .

- (a) Probar que si  $\lambda \ll \mu$  entonces dado  $\varepsilon > 0$  existe  $\delta > 0$  tal que para todo  $E \in \mathcal{A}$

$$\mu(E) < \delta \Rightarrow \lambda(E) < \varepsilon.$$

- (b) Mostrar que sin la hipótesis  $\lambda(X) < +\infty$  la afirmación en (a) puede ser falsa.

**Ejercicio 10.** Sean  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  un espacio de medida finita,  $f \in L^1(X, \mathcal{A}, \mu)$  y  $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{A}$  una  $\sigma$ -álgebra de subconjuntos de  $X$ .

(a) Probar que si definimos la aplicación  $\mu_f: \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$  para cada  $B \in \mathcal{F}$  por la fórmula

$$\mu_f(B) = \int_B f(x) d\mu(x)$$

entonces  $\mu_f$  es una medida con signo sobre el espacio  $(X, \mathcal{F})$  que satisface  $\mu_f \ll \mu$ . Deducir que existe una función  $g \in L^1(X, \mathcal{F}, \mu)$  tal que para todo  $B \in \mathcal{F}$

$$\int_B f(x) d\mu(x) = \int_B g(x) d\mu(x).$$

(b) Determinar la función  $g$  del inciso anterior si  $\mathcal{F} = \{\emptyset, B, B^c, X\}$  para algún  $B \in \mathcal{A}$ .

**Ejercicio 11.** Decidir si  $\lambda \ll \mu$  en cada uno de los siguientes casos y hallar la derivada de Radon-Nikodym  $\frac{d\lambda}{d\mu}$  cuando corresponda.

- (a)  $X = \mathbb{R}^n$ ,  $\mathcal{A}$  = sigma-álgebra de Lebesgue,  $\mu$  = medida de Lebesgue y  $\lambda = \delta$ .
- (b)  $X = \mathbb{R}^n$ ,  $\mathcal{A}$  = sigma-álgebra de Lebesgue,  $\lambda$  = medida de Lebesgue y  $\mu$  = medida de contar. ¿Contradicen sus conclusiones el Teorema de Radon Nikodym?
- (c)  $X = \mathbb{N}$ ,  $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\mathbb{N})$ ,  $\lambda$  = medida de contar,  $\mu$  = medida de contar con pesos  $a_n = 2^{-n}$ .

**Ejercicio 12.** Sean  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  un espacio de medida finita y  $\nu$  una medida con signo sobre  $(X, \mathcal{A})$  tal que  $\nu \ll \mu$ .

(a) Probar que existe una función  $g \in L^1(X, \mathcal{A}, \mu)$  tal que para toda  $f \in L^1(X, \mathcal{A}, \nu)$

$$\int_X f(x) d\nu(x) = \int_X f(x) g(x) d\mu(x).$$

(b) Probar que  $\{x \in X : g(x) \geq 0\}$  y  $\{x \in X : g(x) < 0\}$  son respectivamente un conjunto positivo y uno negativo para  $\nu$ .

**Ejercicio 13.** Dada  $\mu$  una medida de Borel finita sobre  $\mathbb{R}$  definimos  $F_\mu: \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty)$  por la fórmula

$$F(x) = \mu((-\infty, x]).$$

- (a) Probar que  $F$  es monótona creciente, continua a derecha,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \mu(\mathbb{R})$  y  $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ .
- (b) Probar que  $\mu$  es absolutamente continua respecto de  $\mathcal{L}$  : la medida de Lebesgue unidimensional si y sólo si  $F$  es una función absolutamente continua. Mostrar además que en tal caso se tiene

$$\frac{d\mu}{d\mathcal{L}} = F'.$$

- (c) Probar que  $\mu$  es singular respecto  $\mathcal{L}$  si y sólo si  $F' = 0$  c.t.p. con respecto a  $\mathcal{L}$ . *Sugerencia:* Considerar un argumento similar al usado para probar que las funciones monótonas son derivables en casi todo punto.

**Ejercicio 14.** Sea  $E \subseteq \mathbb{R}^n$ . Notamos con  $\mathcal{H}^\alpha$  la medida de Hausdorff  $\alpha$ -dimensional.

- (a) Probar que  $\mathcal{H}^\alpha(E + x) = \mathcal{H}^\alpha(E) \forall E$  medible,  $\forall x \in \mathbb{R}^n$ .

- (b) Probar que  $\mathcal{H}^\alpha(cE) = c^\alpha \mathcal{H}^\alpha(E) \forall E$  medible,  $\forall c > 0$ .
- (c) Probar que si  $\mathcal{H}^\alpha(E) < \infty$ , entonces  $\mathcal{H}^\beta(E) = 0 \forall \beta > \alpha$ .
- (d) Probar que si  $0 < \mathcal{H}^\alpha(E) \leq \infty$ , entonces  $\mathcal{H}^\beta(E) = \infty \forall \beta < \alpha$ .

**Ejercicio 15.** Sea  $E \subseteq \mathbb{R}^n$ . Definimos la *dimensión* de  $E$  como

$$\dim(E) = \sup\{\alpha : \mathcal{H}^\alpha(E) = \infty\} = \inf\{\alpha : \mathcal{H}^\alpha(E) = 0\}.$$

- (a) Probar que  $\mathcal{H}^\alpha(E) = 0 \forall \alpha > \dim(E)$ .
- (b) Sea  $(E_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}^n$ . Probar que si  $\dim(E_n) = d$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ , entonces  $\dim(\cup_{n \in \mathbb{N}} E_n) = d$ . Concluir que si  $E$  es numerable, entonces  $\dim(E) = 0$ .
- (c) Sea  $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  una aplicación bi-Lipschitz, es decir, existen  $C_1, C_2 > 0$  tales que

$$C_1 \|x - y\| \leq \|f(x) - f(y)\| \leq C_2 \|x - y\| \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n.$$

Probar que  $\dim(E) = \dim(f(E))$ .

**Ejercicio 16.** Sea  $(\Omega, \mathcal{A}, P)$  un espacio de probabilidad y sea  $X = \sum_{n=1}^k a_n A_n$  una variable aleatoria simple, donde los números reales  $a_n$  son todos distintos, los conjuntos  $A_n$  son disjuntos dos a dos y  $\Omega = \cup_{n=1}^k A_n$ . Sea  $\mathcal{U}(X) = \{X^{-1}(B) : B \text{ boleano}\}$  la  $\sigma$ -álgebra generada por  $X$ .

- (a) Describir precisamente los conjuntos que componen  $\mathcal{U}(X)$ .
- (b) Probar que si una variable aleatoria  $Y$  es  $\mathcal{U}(X)$ -medible, entonces  $Y$  es constante en cada uno de los conjuntos  $A_n$ .
- (c) Mostrar que entonces  $Y$  puede ser escrita en función de  $X$ .

**Ejercicio 17.**

- (a) Sea  $(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$  un espacio de medida y sea  $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  una función  $\mathcal{A}$ -medible. Consideramos la medida  $\mu_X$  en los borelianos de  $\mathbb{R}$  definida por  $\mu_X(A) = \mu(X^{-1}(A))$ . Probar que para toda función  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$   $\mu_X$ -integrable, vale que

$$\int_{\mathbb{R}} f d\mu_X = \int_{\Omega} f(X) d\mu.$$

- (b) Sea  $(\Omega, \mathcal{A}, P)$  un espacio de probabilidad y sea  $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$  una función  $\mathcal{A}$ -medible con  $\int_{\Omega} f dP = 1$ . Definimos una medida  $\nu$  sobre  $(\Omega, \mathcal{A})$  por

$$\nu(A) = \int_A f dP.$$

Probar que  $(\Omega, \mathcal{A}, \nu)$  es un espacio de probabilidad y que para toda  $g: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$   $\nu$ -integrable vale que

$$\int_{\Omega} g d\nu = \int_{\Omega} g f dP.$$

- (c) En particular, sea  $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  una variable aleatoria y sea  $f$  la función densidad de  $X$ . Sea  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  y supongamos que  $Y = g(X)$  es integrable. Probar que

$$E(Y) = \int_{\mathbb{R}} g f.$$