

## Matemática 2 - Primer Cuatrimestre 2019

### Práctica 5 - Diagonalización

**Ejercicio 1.** Para las matrices  $A$  siguientes, calcular el polinomio característico, los autovalores y bases y dimensiones de los espacios de autovectores correspondientes a cada autovalor (analizar por separado los casos  $K = \mathbb{R}$  y  $K = \mathbb{C}$ ). En cada caso decidir si la matriz es diagonalizable, y de ser posible, exhibir una matriz  $P$  inversible tal que  $P^{-1}AP$  sea diagonal.

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -4 & -1 & 0 \\ 4 & -8 & -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & -2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

**Ejercicio 2.** Como en el ejercicio anterior, discutiendo según los valores de los parámetros  $a, b, c \in \mathbb{R}$  (analizar por separado los casos  $K = \mathbb{R}$  y  $K = \mathbb{C}$ ).

$$\begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 \\ 0 & a & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}.$$

**Ejercicio 3.** Hallar todos los valores de  $k \in \mathbb{R}$  tales que la siguiente matriz sea diagonalizable:

$$A = \begin{pmatrix} k & 1 & k+k^2 & -k^2 \\ 0 & k+1 & 0 & k \\ 0 & 1 & k & 1 \\ 0 & 0 & 0 & k+1 \end{pmatrix}.$$

**Ejercicio 4.** Sea  $A = \begin{pmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$  tal que para toda fila  $F_i$ , la suma de sus coeficientes es igual a 1. Probar que 1 es autovalor de  $A$  y encontrar un autovector correspondiente.

**Ejercicio 5.** Sea  $f : K^n \rightarrow K^n$  un proyector con  $\dim(\text{Im}(f)) = s$ . Probar que  $f$  es diagonalizable y calcular el polinomio característico  $\mathcal{X}_f$  de  $f$ .

**Ejercicio 6.** Calcular  $A^n$  para todo  $n \in \mathbb{N}$  para las siguientes matrices  $A$ :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{pmatrix} 5 & -12 \\ 2 & -5 \end{pmatrix}.$$

Determinar en cada caso si es posible encontrar  $B \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$  tal que  $B^2 = A$ . ¿Y en  $\mathbb{C}^{2 \times 2}$ ?

**Ejercicio 7.** Sea  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  la transformación lineal definida por

$$f(x, y, z) = (-7y + z, 4y, -2x + y + 3z).$$

- a) Encontrar una base  $\mathcal{B}$  de  $\mathbb{R}^3$  tal que  $[f]_{\mathcal{B}}$  sea diagonal.
- b) Calcular  $f^n := f \circ f \circ \dots \circ f$  ( $n$  veces),  $\forall n \in \mathbb{N}$ .
- c) Hallar, si es posible, una transformación lineal  $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  tal que  $g \circ g = f$ .

**Ejercicio 8.** Se define una sucesión de números enteros de la siguiente manera:

$$a_0 := 1, \quad a_1 := 2 \quad \text{y} \quad a_{n+2} = a_{n+1} + 2a_n, \quad \forall n \geq 0.$$

- a) Determinar  $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$  tal que para todo  $n \geq 0$

$$\begin{pmatrix} a_{n+2} \\ a_{n+1} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} a_{n+1} \\ a_n \end{pmatrix}.$$

- b) Usando lo anterior mostrar que para todo  $n \geq 0$  se tiene

$$\begin{pmatrix} a_{n+1} \\ a_n \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- c) Diagonalizando la matriz  $A$  determinar el valor de  $a_n$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ .

**Ejercicio 9.** Encontrar una fórmula general para  $x_n$  e  $y_n$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}_0$ , en función de  $x_0$  e  $y_0$  (ecuaciones en diferencias):

$$\begin{cases} x_{n+1} = 6x_n + 2y_n \\ y_{n+1} = 2x_n + 3y_n \end{cases}.$$

**Ejercicio 10.** Sea  $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$  con autovalores  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$  y  $\frac{4}{5}$ . Para un vector inicial  $x^{(0)} \in \mathbb{R}^{3 \times 1}$ , se define  $x^{(n)} = A^n x^{(0)}$ . Probar que para todo  $x^{(0)}$  se cumple  $x^{(n)} \rightarrow 0$  (es decir,  $x_i^{(n)} \rightarrow 0$ ,  $1 \leq i \leq 3$ ).

**Ejercicio 11.** Supongamos que en cierta especie hay una epidemia en la que al cabo de cada mes se enfermó la mitad de los que están sanos a principios de mes y murió la cuarta parte de los que estaban enfermos. Llamemos  $x_k$  al número de muertos al cabo del  $k$ -ésimo mes,  $y_k$  al número de enfermos al cabo del  $k$ -ésimo mes y  $z_k$  al número de sanos al cabo del  $k$ -ésimo mes.

1. Determinar  $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$  que describa el proceso, o sea tal que

$$\begin{pmatrix} x_{k+1} \\ y_{k+1} \\ z_{k+1} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_k \\ y_k \\ z_k \end{pmatrix}.$$

2. Si la distribución original  $(x_0, y_0, z_0)$  al principio del primer mes (o término del mes 0) es  $(0, 0, 10000)$ , o sea de ningún enfermo y 10000 sanos, calcular el número de enfermos al cabo del  $k$ -ésimo mes.
3. Probar que cualquiera sea la distribución original  $(x_0, y_0, z_0)$ ,  $(x_k, y_k, z_k)$  tiende a un múltiplo de  $(1, 0, 0)$  (determinarlo en función de  $(x_0, y_0, z_0)$ ), es decir mueren todos (lo cual es obvio ya que se enferman o se mueren pero ni se curan ni nacen nuevos individuos en el modelo).

**Ejercicio 12.** Resolver los siguientes sistemas de ecuaciones diferenciales:

$$1. \begin{cases} x'(t) &= 8x(t) + 10y(t) \\ y'(t) &= -5x(t) - 7y(t) \end{cases} .$$

$$2. \begin{cases} x'(t) &= 6x(t) + 2y(t) \\ y'(t) &= 2x(t) + 3y(t) \end{cases} , \text{ con condiciones iniciales } x(0) = 3, y(0) = -1.$$

**Ejercicio 13.** Utilizando el Teorema de Hamilton-Cayley:

a) Calcular  $A^{1000}$  para  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ .

b) Dada  $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$ , expresar  $A^{-1}$  como combinación lineal de  $A$  y de  $I_2$ .