

Práctica 9: Teorema de cambio de variables

Se sugiere complementar la resolución de los ejercicios de esta práctica con GeoGebra.

Integrales dobles en coordenadas polares

1. Para cada una de las siguientes integrales, graficar la región cuya área está dada por la integral y calcularla.

$$a) \int_{\pi/4}^{3\pi/4} \int_1^2 r \, dr \, d\theta, \quad b) \int_{\pi/2}^{\pi} \int_0^{2\sin(\theta)} r \, dr \, d\theta.$$

2. Calcular las siguientes integrales.

a) $\iint_D x^2 y \, dA$, donde D es la mitad superior del disco con centro en el origen y radio 5.

b) $\iint_D (2x - y) \, dA$, donde D es la región del primer cuadrante encerrada por la circunferencia $x^2 + y^2 = 4$ y las rectas $x = 0$ e $y = x$.

c) $\iint_D \sin(x^2 + y^2) \, dA$, donde D es la región del primer cuadrante entre las circunferencias con centro en el origen y radios 1 y 3.

d) $\iint_D e^{-x^2-y^2} \, dA$, donde D es la región acotada por la semicircunferencia $x = \sqrt{4 - y^2}$ y el eje y .

3. Usar una integral doble para hallar el área de las siguientes regiones.

a) Un pétalo de la rosa $r = \cos(3\theta)$.

b) La región dentro de las circunferencias $(x - 1)^2 + y^2 = 1$ y $x^2 + y^2 = 1$.

4. Calcular el volumen del sólido dado en cada uno de los siguientes casos.

a) Bajo el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ y arriba del disco $x^2 + y^2 \leq 4$.

b) Bajo el paraboloides $z = 18 - 2x^2 - 2y^2$ y arriba del plano xy .

c) Encerrado por el hiperboloide $-x^2 - y^2 + z^2 = 1$ y el plano $z = 2$.

d) Dentro de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 16$ y fuera del cilindro $x^2 + y^2 = 4$.

(*) 5. (i) Se define la integral impropia en todo el plano \mathbb{R}^2 como

$$I = \iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dA = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)} dy dx = \lim_{r \rightarrow +\infty} \iint_{D_r} e^{-(x^2+y^2)} dA$$

donde D_r es el disco con radio r y centro en el origen.

Demostrar que

$$\iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dA = \pi.$$

(ii) Una definición equivalente de la integral impropia del item (i) es

$$\iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dA = \lim_{r \rightarrow +\infty} \iint_{S_r} e^{-(x^2+y^2)} dA$$

donde S_r es el cuadrado con vértices $(\pm r, \pm r)$.

Use esto para demostrar que

$$\left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \right) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} dy \right) = \pi.$$

(iii) Deducir que

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}.$$

(iv) Haciendo el cambio de variables $t = x/\sqrt{2}$, demostrar que

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2/2} dx = \sqrt{2\pi}.$$

Éste es un resultado fundamental para probabilidad y estadística.

Integrales triples en coordenadas cilíndricas

6. Identificar y graficar las siguientes superficies cuyas ecuaciones están dadas en coordenadas cilíndricas.

$$a) \theta = \pi/4, \quad b) r = 5, \quad c) z = 4 - r^2, \quad d) 2r^2 + z^2 = 1.$$

7. Expresar las siguientes ecuaciones en coordenadas cilíndricas.

$$a) x^2 - x + y^2 + z^2 = 1, \quad b) z = x^2 - y^2, \quad c) -x^2 - y^2 + z^2 = 1.$$

8. Graficar el sólido descrito por las siguientes desigualdades.

$$a) 0 \leq r \leq 2, \quad -\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2, \quad 0 \leq z \leq 1,$$

$$b) 0 \leq \theta \leq \pi/2, \quad r \leq z \leq 2.$$

9. Para cada una de las siguientes integrales, graficar el sólido cuyo volumen está dado por la integral y calcularla.

$$a) \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^2 \int_0^{r^3} r \, dz \, dr \, d\theta, \quad b) \int_0^2 \int_0^{2\pi} \int_0^r r \, dz \, d\theta \, dr.$$

10. Calcular las siguientes integrales.

a) $\iiint_E \sqrt{x^2 + y^2} \, dV$, donde E es la región que está en el interior del cilindro $x^2 + y^2 = 16$ y entre los planos $z = -5$ y $z = 4$.

b) $\iiint_E z \, dV$, donde E está encerrada por el paraboloides $z = x^2 + y^2$ y el plano $z = 4$.

c) $\iiint_E x^2 \, dV$, donde E es el sólido que está dentro del cilindro $x^2 + y^2 = 1$, por encima del plano $z = 0$ y por debajo del cono $z^2 = 4x^2 + 4y^2$.

11. Calcular el volumen del sólido dado en cada uno de los siguientes casos.

a) Dentro del cilindro $x^2 + y^2 = 1$ y la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$

b) Entre el paraboloides $z = x^2 + y^2$ y la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 2$.

Integrales triples en coordenadas esféricas

12. Identificar y graficar las siguientes superficies cuyas ecuaciones están dadas en coordenadas esféricas.

$$a) \phi = \pi/3, \quad b) \rho = 3, \quad c) \rho = \sin(\theta) \sin(\phi).$$

13. Expresar las siguientes ecuaciones en coordenadas esféricas.

$$a) z^2 = x^2 + y^2, \quad b) x^2 + z^2 = 9, \quad c) x^2 - 2x + y^2 + z^2 = 0.$$

14. Graficar el sólido descrito por las siguientes desigualdades.

$$a) 2 \leq \rho \leq 4, \quad 0 \leq \phi \leq \pi/3, \quad 0 \leq \theta \leq \pi,$$

$$b) \rho \leq 1, \quad 3\pi/4 \leq \phi \leq \pi.$$

15. Calcular las siguientes integrales.

a) $\iiint_E (9 - x^2 - y^2) \, dV$, donde E es la semiesfera sólida $x^2 + y^2 + z^2 \leq 9, z \leq 0$,

b) $\iiint_E x e^{x^2+y^2+z^2} dV$, donde E es la porción de la esfera unitaria $x^2+y^2+z^2 \leq 1$ que está en el primer octante.

16. Hallar el volumen del sólido que está dentro de la esfera $x^2+y^2+z^2 = 4$, por encima del plano xy y por abajo del cono $z = \sqrt{x^2+y^2}$.

Cambios de variables en integrales múltiples

17. Encontrar la imagen de S bajo la transformación dada.

a) $S = \{(u, v) \mid 0 \leq u \leq 3, 0 \leq v \leq 2\}$; $x = 2u + 3v, y = u - v$,

b) S el cuadrado acotado por las rectas $u = 0, u = 1, v = 0, v = 1$; $x = v, y = u(1 + v^2)$,

c) S el disco dado por $u^2 + v^2 \leq 1$; $x = au, y = bv$.

18. Para cada una de las regiones R del plano xy dadas, hallar una transformación T que mapee una región rectangular S en el plano uv (con lados paralelos a los ejes) sobre R .

a) R está acotada por $y = 2x - 1, y = 2x + 1, y = 1 - x, y = 3 - x$,

b) R es el paralelogramo con vértices $(0, 0), (4, 3), (2, 4), (-2, 1)$,

c) R está acotada por las hipérbolas $y = 1/x, y = 4/x$ y las rectas $y = x, y = 4x$.

19. Utilizar las transformaciones dadas para calcular la integral.

a) $\iint_R (x - 3y) dA$, donde R es la región triangular con vértices $(0, 0), (2, 1)$ y $(1, 2)$; $x = 2u + v, y = u + 2v$,

b) $\iint_R x^2 dA$, donde R es la región acotada por la elipse $9x^2 + 4y^2 = 36$; $x = 2u, y = 3v$.

20. Calcular $\iiint_E dV$, donde E es el sólido encerrado por el elipsoide $x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 = 1$.

Sugerencia: usar la transformación $x = au, y = bv, z = cw$.

21. Calcular las siguiente integrales utilizando un cambio de variables apropiado.

a) $\iint_R (x+y)e^{x^2-y^2} dA$, donde R es el rectángulo encerrado por las rectas $x-y = 0, x-y = 2, x+y = 0, x+y = 3$,

b) $\iint_R e^{x+y} dA$, donde R está dada por la desigualdad $|x| + |y| \leq 1$.