

PRÁCTICA 1

Ejercicio 1. Demostrar las siguientes igualdades de conjuntos:

$$\text{i) } B - \bigcup_{i \in I} A_i = \bigcap_{i \in I} (B - A_i)$$

$$\text{ii) } B - \bigcap_{i \in I} A_i = \bigcup_{i \in I} (B - A_i)$$

$$\text{iii) } \bigcup_{i \in I} (B \cap A_i) = B \cap \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right)$$

Ejercicio 2. Sea $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una familia de conjuntos y sea $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$. Hallar una familia de conjuntos $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$ que verifique simultáneamente:

- $B_n \subseteq A_n$ para cada $n \in \mathbb{N}$
- $B_k \cap B_j = \emptyset$ si $k \neq j$
- $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n$

Ejercicio 3. Sea $f : X \rightarrow Y$ una función y sean A y B subconjuntos de X .

i) Demostrar que:

$$\text{(a) } f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$$

$$\text{(b) } f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$$

ii) Generalizar al caso de uniones e intersecciones infinitas.

iii) Exhibir un ejemplo donde la inclusión en i) (b) sea estricta.

Ejercicio 4. Sean $f : X \rightarrow Y$ una función, $A \subseteq X$ y $B, B_1, B_2 \subseteq Y$. Demostrar que:

$$\text{i) } A \subseteq f^{-1}(f(A))$$

$$\text{ii) } f(f^{-1}(B)) \subseteq B$$

$$\text{iii) } f^{-1}(Y - B) = X - f^{-1}(B)$$

$$\text{iv) } f^{-1}(B_1 \cup B_2) = f^{-1}(B_1) \cup f^{-1}(B_2)$$

$$\text{v) } f^{-1}(B_1 \cap B_2) = f^{-1}(B_1) \cap f^{-1}(B_2)$$

Generalizar iv) y v) al caso de uniones e intersecciones infinitas.

Ejercicio 5. Sea $f : X \rightarrow Y$ una función. Probar que $f(f^{-1}(B)) = B$ para cada $B \subseteq Y$ si y sólo si f es sobreyectiva.

Ejercicio 6. Sea $f : X \rightarrow Y$ una función. Probar que las siguientes propiedades son equivalentes:

- i) f es inyectiva
- ii) $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$ para todo $A, B \subseteq X$
- iii) $f^{-1}(f(A)) = A$ para todo $A \subseteq X$
- iv) $f(A) \cap f(B) = \emptyset$ para todo par de subconjuntos A, B tales que $A \cap B = \emptyset$
- v) $f(A - B) = f(A) - f(B)$ para todo $B \subseteq A \subseteq X$

Ejercicio 7. Para cada subconjunto S de un conjunto A dado se define la *función característica* de S , $\mathcal{X}_S : A \rightarrow \{0, 1\}$, por

$$\mathcal{X}_S(a) = \begin{cases} 1 & \text{si } a \in S \\ 0 & \text{si } a \notin S \end{cases}$$

Probar que:

- i) $\mathcal{X}_{S \cap T} = \mathcal{X}_S \cdot \mathcal{X}_T$ para todo par de subconjuntos $S, T \subseteq A$
- ii) $\mathcal{X}_{A-S} = 1 - \mathcal{X}_S$ para todo $S \subseteq A$
- iii) $\mathcal{X}_S + \mathcal{X}_T = \mathcal{X}_{S \cup T} + \mathcal{X}_{S \cap T}$ para todo $S, T \subseteq A$

Ejercicio 8. Sea \sim una relación de equivalencia sobre un conjunto A . Para cada $a \in A$ se define el conjunto $S_a = \{b \in A / a \sim b\}$. Probar que:

- i) Para todo par de elementos $a_1, a_2 \in A$ vale: $S_{a_1} = S_{a_2}$ o $S_{a_1} \cap S_{a_2} = \emptyset$
- ii) $A = \bigcup_{a \in A} S_a$

Ejercicio 9. Sea A un conjunto no vacío. Probar que son equivalentes:

- i) A es infinito
- ii) Para todo $x \in A$, existe una función $f_x : A \rightarrow A - \{x\}$ biyectiva
- iii) Para todo $\{x_1, \dots, x_n\} \subset A$, existe una función $f_{\{x_1, \dots, x_n\}} : A \rightarrow A - \{x_1, \dots, x_n\}$ biyectiva.

Ejercicio 10. Sea A un conjunto numerable. Supongamos que existe una función sobreyectiva de A en un conjunto B . Probar que B es contable.

Ejercicio 11. Probar que los siguientes conjuntos son numerables (es decir, tienen cardinal \aleph_0):

$$\mathbb{Z}_{\leq -1} ; \mathbb{Z}_{\geq -3} ; 3\mathbb{N} ; \mathbb{Z} ; \mathbb{N}^2 ; \mathbb{Z} \times \mathbb{N} ; \mathbb{Q} ; \mathbb{N}^m \quad (m \in \mathbb{N})$$

Ejercicio 12.

- i) Sean A y B conjuntos contables. Probar que $A \cup B$ es contable.
- ii) Sea $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una familia de conjuntos contables. Probar que $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ es contable.

iii) Sea \mathcal{A} un conjunto finito y $\mathcal{S} = \bigcup_{m \in \mathbb{N}} \mathcal{A}^m$. Probar que $\#(\mathcal{S}) = \aleph_0$.

Deducir que, cualquiera sea el alfabeto utilizado, hay más números reales que palabras para nombrarlos.

Ejercicio 13. Sean A y B conjuntos, A infinito y B numerable. Probar que:

- i) Existe una biyección entre $A \cup B$ y A
- ii) Si A no es numerable y $B \subseteq A$, entonces existe una biyección entre $A - B$ y A .
¿Es numerable el conjunto $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$?

Ejercicio 14. Probar que $\mathbb{Q}[X]$, el conjunto de todos los polinomios con coeficientes racionales, es numerable.

Ejercicio 15. Se dice que un número complejo z es *algebraico* si existen enteros a_0, \dots, a_n no todos nulos, tales que

$$a_0 + a_1z + \dots + a_{n-1}z^{n-1} + a_nz^n = 0$$

i) Demostrar que el conjunto de todos los números algebraicos es numerable.

ii) Deducir que existen números reales que no son algebraicos.

NOTA: Estos números se llaman *trascendentes*.

iii) Probar que, más aún, hay tantos números trascendentes como números reales.

Ejercicio 16. Sea $X \subseteq \mathbb{R}_{>0}$ un conjunto de números reales positivos. Supongamos que existe una constante positiva C tal que para cualquier subconjunto finito $\{x_1, \dots, x_n\} \subset X$ vale $\sum_{i=1}^n x_i \leq C$. Probar que X es contable.

Ejercicio 17. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función monótona. Probar que:

$$\#(\{x \in \mathbb{R} / f \text{ no es continua en } x\}) \leq \aleph_0$$

Ejercicio 18. Probar que si A es un conjunto numerable, el conjunto de las partes finitas de A (es decir, el subconjunto de $\mathcal{P}(A)$ formado por los subconjuntos finitos de A) es numerable.

Ejercicio 19. Hallar el cardinal de los siguientes conjuntos de sucesiones:

- i) $\{(a_n) / a_n \in \mathbb{N} \text{ para todo } n \in \mathbb{N}\}$
- ii) $\{(a_n) \subset \mathbb{N} / a_n \leq a_{n+1} \text{ para todo } n \in \mathbb{N}\}$
- iii) $\{(a_n) \subset \mathbb{N} / a_n \geq a_{n+1} \text{ para todo } n \in \mathbb{N}\}$
- iv) $\{(q_n) \subset \mathbb{Q} / \lim_{n \rightarrow \infty} q_n = 0\}$
- v) $\{(q_n) \subset \mathbb{Q} / (q_n) \text{ es periódica}\}$

vi) $\{(a_n) \subset \mathbb{N} / 1 \leq a_n \leq m \text{ para todo } n \in \mathbb{N}\} \quad (m \in \mathbb{N})$

Ejercicio 20. Hallar el cardinal de los siguientes conjuntos:

- i) $\{I / I \text{ es un intervalo de extremos racionales}\}$
- ii) $\{[a, b] / a, b \in \mathbb{R}\}$
- iii) I , sabiendo que $\{A_i\}_{i \in I} \subset \mathbb{R}$ es una familia de intervalos disjuntos
- iv) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 3x + 2y \geq 7\}$
- v) $\mathbb{R}_{>0}$

Ejercicio 21. Probar que la unión numerable de conjuntos de cardinal c tiene cardinal c .

Ejercicio 22. Sean a, b, c cardinales. Probar que:

- i) $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$
- ii) $a^{b+c} = a^b \cdot a^c$
- iii) $(a^b)^c = a^{bc}$
- iv) $(ab)^c = a^c \cdot b^c$
- v) Si $b \leq c$, entonces $a^b \leq a^c$ y $b^a \leq c^a$

Ejercicio 23. Probar que $n^{\aleph_0} = \aleph_0^{\aleph_0} = c^{\aleph_0} = c$ cualquiera sea $n \in \mathbb{N}_{\geq 2}$.

Ejercicio 24. Mostrar que \mathbb{R} se puede escribir como unión disjunta de c conjuntos de cardinal c .

Ejercicio 25. Se consideran los siguientes conjuntos de funciones:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}(\mathbb{R}) &= \{f / f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}\} & \mathcal{F}(\mathbb{Q}) &= \{f / f : \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{R}\} \\ \mathcal{C}(\mathbb{R}) &= \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}) / f \text{ es continua}\} & \mathcal{C}(\mathbb{Q}) &= \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{Q}) / f \text{ es continua}\} \end{aligned}$$

- i) Probar que $\#(\mathcal{F}(\mathbb{R})) > c$.
- ii) Calcular $\#(\mathcal{F}(\mathbb{Q}))$.
- iii) Calcular $\#(\mathcal{C}(\mathbb{Q}))$.
- iv) Probar que la función $\phi : \mathcal{C}(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathcal{C}(\mathbb{Q})$ dada por $\phi(f) = f|_{\mathbb{Q}}$ es inyectiva.
- v) Calcular $\#(\mathcal{C}(\mathbb{R}))$.

Ejercicio 26. Probar que el conjunto de partes numerables de \mathbb{R} (es decir, el subconjunto de $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ formado por todos los subconjuntos numerables de \mathbb{R}) tiene cardinal c .

Ejercicio 27. Sean A y B conjuntos no vacíos. Probar que o bien existe $f : A \rightarrow B$ inyectiva, o bien existe $g : B \rightarrow A$ inyectiva. En otras palabras, $\#A \leq \#B$ o $\#B \leq \#A$.

Ejercicio 28. Sean A y B conjuntos no vacíos. Probar que existe una función sobreyectiva $f : A \rightarrow B$ si y solo si existe una función inyectiva $g : B \rightarrow A$.

Ejercicio 29. Probar que en un espacio vectorial:

- i) todo conjunto linealmente independiente puede extenderse a una base;
- ii) de todo sistema de generadores se puede extraer una base.

Ejercicio 30. Sea X un conjunto y sea \mathcal{R} una relación de orden definida en X . Probar que \mathcal{R} se puede extender a un orden total: es decir, existe una relación de orden $\tilde{\mathcal{R}} \supset \mathcal{R}$ tal que para cualesquiera $a, b \in X$ se tiene que $(a, b) \in \tilde{\mathcal{R}}$ o bien $(b, a) \in \tilde{\mathcal{R}}$.