

Práctica 7: Extremos restringidos - Multiplicadores de Lagrange

---

1. Determinar los extremos absolutos de  $f|_A$  en los siguientes casos:

(a)  $f(x, y) = xy(x - y)^2$      $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x > 0, y > 0\}$ ;

(b)  $f(x, y) = xy(x - y)^2$      $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x \geq 0, y \geq 0\}$ ;

(c)  $f(x, y) = 2x^2 - xy + y^2 + 7x$      $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / |x| \leq 3, |y| \leq 3\}$ ;

(d)  $f(x, y) = 2x + 4y - x^2 - y^2 - 3$      $A = \mathbb{R}^2$ ;

(e)  $f(x, y) = 2x + 4y - x^2 - y^2 - 3$      $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / |x| \leq 1, |y| \leq 1\}$ .

2. Considerar el cuadrado de vértices  $(-1, 0)$ ,  $(1, 0)$ ,  $(1, -2)$  y  $(-1, -2)$ . Sea  $A$  la región determinada por el cuadrado y su interior. Encontrar los extremos absolutos de la función

$$f(x, y) = 2x - y^2$$

en el recinto  $B$ , donde  $B$  es el recinto

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 \geq 1\} \cap A.$$

3. Sea  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  la función

$$f(x, y) = (y - 1)^2 - x^3 + 3x^2 + 5.$$

Encontrar, justificando su existencia, el máximo y el mínimo valor que alcanza  $f$  en la región

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 \leq y \leq 4\}.$$

4. Sea  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  la función

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - x + \frac{1}{4}.$$

Encontrar, justificando su existencia, el máximo y el mínimo valor que alcanza  $f$  en la región

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1; x + y \geq 0\}.$$

5. Encontrar el punto de la parábola  $y^2 = 4x$  cuya distancia al  $(1, 0)$  es mínima

(a) Usando multiplicadores de Lagrange;

(b) Reduciéndolo a trabajar con una función de una variable.

6. Encontrar los máximos y mínimos de  $f(x, y) = x^4 + y^4 - x^2 - y^2 + 1$  dentro del círculo unitario y en el borde.

7. Encontrar los máximos y mínimos de  $f(x, y) = y + x - 2xy$  en el interior y en el borde de

$$R = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 / |x| \leq \frac{1}{2} \right\}.$$

8. Encontrar los extremos de  $f$  sujetos a las restricciones mencionadas:

(a)  $f(x, y, z) = x - y + z \quad A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x^2 + y^2 + z^2 = 2\};$

(b)  $f(x, y) = \text{sen}(xy) \quad A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + 2y^2 = 1\};$

(c)  $f(x, y) = xy \quad A = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 / \frac{|xy|}{|xy|+1} \leq 1 \right\};$

(d)  $f(x, y) = \max(x, y) \quad A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 = 1\};$

(e)  $f(x, y, z) = x + y + z \quad A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x^2 - y^2 = 1, 2x + z = 1\};$

(f)  $f(x, y, z, w) = x + y - z - w \quad A = \{(x, y, z, w) / x^2 + y^2 = 1 \text{ y } w = x + z\}.$

9. Resolver los siguientes problemas geométricos mediante el método de Lagrange:

(a) Encontrar la distancia más corta desde el punto  $(a_1, a_2, a_3) \in \mathbb{R}^3$  hasta el plano de ecuación  $b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_0 = 0$  donde  $(b_1, b_2, b_3) \neq (0, 0, 0)$ .

(b) Encontrar el punto sobre la recta de intersección de los dos planos  $a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + a_0 = 0$  y  $b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_0 = 0$  que esté más cerca del origen.

(c) Mostrar que el volumen del mayor paralelepípedo rectangular que puede inscribirse en el elipsoide

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

es  $8abc/3\sqrt{3}$ .

10. Encontrar la distancia mínima entre la parábola  $y = x^2$  y la recta  $x - y - 2 = 0$ .

11. Encontrar el punto de la superficie  $z = xy - 1$  más cercano al origen.

12. Si  $\alpha, \beta, \gamma$  son tres ángulos positivos tales que  $\alpha + \beta + \gamma = \pi/2$ , entonces

$$\text{sen}(\alpha) \text{sen}(\beta) \text{sen}(\gamma) \leq \frac{1}{8}.$$

13. La temperatura de una placa en un punto cualquiera  $(x, y)$  viene dada por la función  $T(x, y) = 25 + 4x^2 - 4xy + y^2$ . Una alarma térmica, situada sobre los puntos de la circunferencia  $x^2 + y^2 = 25$ , se dispara a temperaturas superiores a 180 grados o inferiores a 20 grados. ¿Se disparará la alarma?

14. Sea  $E$  el elipsoide definido por

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 3x^2 + y^2 - 2xy + z^2 = 1\}.$$

Encontrar el punto  $p \in E$  más lejano al plano  $yz$ .

15. Encontrar los puntos del cono

$$z^2 = (y - 2)^2 + (x - 1)^2$$

más cercanos al origen de coordenadas.

16. Encontrar los puntos más lejanos y cercanos al punto  $(0, 0, 2)$  de la esfera de ecuación

$$x^2 + (y - 1)^2 + z^2 = 1.$$

17. En una empresa se fabrican recipientes con forma de prisma rectangular con las siguientes características: la suma de todas sus aristas es de 30 metros y su superficie total es de 36 metros cuadrados. Determinar la capacidad máxima y mínima de estos recipientes.

Sugerencia: El prisma rectangular que fabrica la empresa no es otra cosa que una caja de zapatos gigante. Tener en cuenta la simetría de las variables en las formulas involucradas.