

Algebra I
2do. Cuatrimestre 2012
Práctica 1 - Conjuntos

Si A es un subconjunto de un conjunto referencial V , denotaremos por A' al complemento de A respecto de V . Por convención, si x es un número real positivo, \sqrt{x} denota el único número real positivo cuyo cuadrado es x .

1. Dado el conjunto $A = \{1, 2, \{3\}, \{1, 2\}, -1\}$, determinar cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas:

<i>i)</i> $3 \in A$	<i>ii)</i> $\{1, 2\} \subseteq A$	<i>iii)</i> $\{1, 2\} \in A$.
<i>iv)</i> $\{3\} \subseteq A$	<i>v)</i> $\{\{3\}\} \subseteq A$	<i>vi)</i> $\emptyset \in A$.
<i>vii)</i> $\{-1, 2\} \subseteq A$	<i>viii)</i> $\emptyset \subseteq A$	<i>ix)</i> $\{1, 2, -1\} \in A$.

2. Determinar si $A \subseteq B$ en cada uno de los siguientes casos

(a) $A = \{1, 2, \sqrt{9}\}$ $B = \{1, 2, \{3\}, -3\}$.
 (b) $A = \{1, 2, 0, -1, -2\}$ $B = \{x \in \mathbb{R} / |x + 3| \leq 1\}$.
 (c) $A = \{1, 2, \sqrt{9}\}$ $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.
 (d) $A = \{\emptyset\}$ $B = \emptyset$.
 (e) $A = \{x \in \mathbb{R} / 2 < |x| < 3\}$ $B = \{x \in \mathbb{R} / x^2 < 3\}$

3. Dados los conjuntos $A = \{1, 3, 5, 7, 8, 11\}$ y $B = \{-1, 3 - 5, 7, -8, 11\}$, hallar $A \cap B$, $A \cup B$, $B - A$ y $A \Delta B$.

4. Dado el conjunto referencial $V = \{n \in \mathbb{N} / n \text{ es múltiplo de } 15\}$, hallar el complemento del subconjunto A de V definido por $A = \{n \in V / n \geq 132\}$.

5. Dado el conjunto referencial $V = \{1, \{3\}, -2, 7, 10, \{1, 2, 3\}, 3\}$ y dados los subconjuntos $A = \{1, -2, 7, 3\}$, $B = \{1, \{3\}, 10\}$ y $C = \{-2, \{1, 2, 3\}, 3\}$ hallar

<i>i)</i> $A \cap (B \Delta C)$	<i>ii)</i> $(A \Delta B) - C$	<i>iii)</i> $(A - B) \cap C$
<i>iv)</i> $(A \cup B') \cap C$	<i>v)</i> $A' \cap B' \cap C'$	<i>vi)</i> $(A - B') \Delta C$

6. En un grupo de 110 alumnos hay 63 alumnos que estudian inglés, 30 que estudian alemán y 50 que estudian francés. Sabiendo que hay 7 alumnos que estudian los tres idiomas, 30 que sólo estudian inglés, 13 que sólo estudian alemán y 25 que sólo estudian francés, determinar


- (a) ¿Cuántos alumnos estudian exactamente dos idiomas?
 (b) ¿Cuántos alumnos estudian inglés y alemán pero no francés?
 (c) ¿Cuántos alumnos estudian alemán y francés pero no inglés?
 (d) ¿Cuántos alumnos estudian inglés y francés pero no alemán?
 (e) ¿Cuántos alumnos no estudian ningún idioma?

7. Sean A , B y C conjuntos. Representar en un diagrama de Venn


<i>i)</i> $A \cap (B \cup C)$	<i>ii)</i> $A \cup (B \cap C)$	<i>iii)</i> $A' \cup (B \cap C)$
<i>iv)</i> $(A \cup B') \cap C$	<i>v)</i> $A \Delta (B \cup C)$	<i>vi)</i> $(A \Delta B) \cap (C - A)$
<i>vii)</i> $A - (B' \Delta C)$	<i>viii)</i> $A \cup (B \Delta C)$	<i>ix)</i> $(A \cup B) \cap (A \cup C)$

8. Encontrar fórmulas que describan las partes rayadas de los siguientes diagramas de Venn, utilizando únicamente intersecciones, uniones y complementos.


i)




ii)



iii)



iv)



9. Determinar cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas cualesquiera sean los conjuntos A , B y C y cuáles no. Para las que sean verdaderas, dar una demostración, para las otras dar un contraejemplo.

(a) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$.

(b) $(A \cup B)' = A' \cap B'$.

(c) $A \Delta B \subseteq (A \Delta C) \cup (B \Delta C)$.

(d) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

(e) $C \subseteq A \implies B \cap C \subseteq (A \Delta B)'$.

(f) $A \Delta B = \emptyset \iff A = B$.

(g) $(A \Delta B) - C = (A - C) \Delta (B - C)$.

(h) $A \Delta \emptyset = A$.

10. Sean A , B y C subconjuntos de un conjunto referencial V . Probar que

(a) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

(b) $(A \cap B)' = A' \cup B'$.

(c) $A \cap (B \Delta C) = (A \cap B) \Delta (A \cap C)$.

(d) $A - (B - C) = (A - B) \cup (A \cap C)$.

(e) $A - (A \Delta B) = A \cap B$.

(f) $(A \cap C) - B = (A - B) \cap C$.

(g) $A \subseteq B \implies A \Delta B = B \cap A'$.

(h) $A \subseteq B \iff B' \subseteq A'$.

(i) $C \subseteq A \implies (A \cup B) \cap C' = (B - C) \cup (A \Delta C)$.

(j) $A \cap C = \emptyset \implies A \cap (B \Delta C) = A \cap B$.

11. (a) Hallar el conjunto $\mathcal{P}(A)$ de partes de A en los casos

i) $A = \emptyset$

ii) $A = \{1\}$

iii) $A = \{a, b\}$

iv) $A = \{1, a, \{-1\}\}$

v) $A = \{1, \{1, 2\}\}$

vi) $A = \{1, 3, 5, \emptyset\}$

- (b) ¿Qué relación existe entre la cantidad de elementos de A y la de su conjunto de partes?
- (c) Sean A y B conjuntos. Probar que $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B) \iff A \subseteq B$.
12. (a) Sean $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 3, 5, 7\}$, $C = \{a, b, c\}$. Hallar $A \times A$, $B \times C$, $(A \cap B) \times C$, $(A \cup B) \times C$ y $(A - B) \times B$
- (b) Sean X e Y conjuntos. Si X tiene n elementos e Y tiene m elementos, ¿cuántos elementos tiene $X \times Y$?
- (c) Sean A , B y C conjuntos. Probar que





$$\begin{array}{ll}
 i) (A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C) & ii) (A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C) \\
 iii) (A - B) \times C = (A \times C) - (B \times C) & iv) (A \Delta B) \times C = (A \times C) \Delta (B \times C)
 \end{array}$$

13. Si A es un conjunto con n elementos y B es un conjunto con m elementos, ¿cuántas relaciones de A en B hay?
14. Sea $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Graficar la relación

$$\mathcal{R} = \{(1, 1), (1, 3), (3, 1), (3, 3), (6, 4), (4, 6), (4, 4), (6, 6)\}$$

dibujando 6 puntos en el plano que representen cada uno de los elementos de A y una flecha de a a b para cada $(a, b) \in \mathcal{R}$. Viendo el gráfico determinar si \mathcal{R} es reflexiva, simétrica, antisimétrica o transitiva.

15. Sea $A = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$. Para cada uno de los siguientes gráficos describir por extensión la relación en A que representa y determinar si es reflexiva, simétrica, antisimétrica o transitiva.




16. En cada uno de los siguientes casos determinar si la relación \mathcal{R} en A es reflexiva, simétrica, antisimétrica, transitiva, de equivalencia o de orden.
- (a) $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $\mathcal{R} = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5)\}$.
- (b) $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $\mathcal{R} = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (1, 2), (1, 3), (2, 5), (1, 5)\}$.
- (c) $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $\mathcal{R} = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5)\}$.
- (d) $A = \mathbb{N}$, $\mathcal{R} = \{(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} / a + b \text{ es par}\}$.

- (e) $A = \mathbb{N}$, $\mathcal{R} = \{(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} / a + b \text{ es impar}\}$.
- (f) $A = \mathbb{Z}$, $\mathcal{R} = \{(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} / |a| \leq |b|\}$.
- (g) $A = \mathcal{P}(\mathbb{R})$, \mathcal{R} definida por $A \mathcal{R} B \iff 2 \notin A - B$.
- (h) $A = \mathcal{P}(\mathbb{R})$, \mathcal{R} definida por $A \mathcal{R} B \iff A \cap \{1, 2, 3\} \subseteq B \cap \{1, 2, 3\}$.
- (i) $A = \mathbb{Z}$, \mathcal{R} definida por $a \mathcal{R} b \iff a + 3b$ es divisible por 4.
- (j) $A = \mathbb{N}$, \mathcal{R} definida por $a \mathcal{R} b \iff b$ es múltiplo de a .

17. Dar un ejemplo de una relación en \mathbb{R} que:

- (a) sea simétrica y antisimétrica.
- (b) no sea ni simétrica ni antisimétrica.
- (c) sea simétrica y transitiva pero no reflexiva.
- (d) sea reflexiva y simétrica pero no transitiva.
- (e) sea de equivalencia y de orden.

18. Sea $A = \{a, b, c, d, e, f\}$ y sea \mathcal{R} la relación en A representada por el gráfico



19. ¿Cuál es la mínima cantidad de pares que se deben agregar a \mathcal{R} de manera que la nueva relación obtenida sea
- (a) reflexiva,
 - (b) simétrica,
 - (c) transitiva,
 - (d) reflexiva y simétrica,
 - (e) simétrica y transitiva,
 - (f) reflexiva y transitiva,
 - (g) de equivalencia.
20. Dado el conjunto $A = \{a, b, c, d, e, f, g\}$ encuentre una relación de orden \mathcal{R} en A que tenga 12 elementos y que verifique $(a, b) \in \mathcal{R}$, $(e, a) \in \mathcal{R}$ y $(c, d) \notin \mathcal{R}$. ¿Es única?
21. Sea $A = \{a, b, c, d, e, f\}$. Dada la relación de equivalencia en A

$$\mathcal{R} = \{(a, a), (b, b), (c, c), (d, d), (e, e), (f, f), (a, b), (b, a), (a, f), (f, a), (b, f), (f, b), (c, e), (e, c)\}$$

hallar

- (a) la clase de b ,
- (b) la clase de c ,
- (c) la clase de d ,

- (d) la partición asociada a \mathcal{R} .
22. Sea $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. Hallar y graficar la relación de equivalencia en A asociada a la partición $\{\{1, 3\}, \{2, 6, 7\}, \{4, 8, 9, 10\}, \{5\}\}$.
23. Hallar todas las particiones del conjunto $A = \{1, 2, 3\}$. ¿Cuántas relaciones de equivalencia pueden definirse en A ?
24. (a) Determinar si \mathcal{R} es una función de A en B en los casos
- $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{a, b, c, d\}$, $\mathcal{R} = \{(1, a), (2, a), (3, d), (4, b), (5, c)\}$,
 - $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{a, b, c, d\}$, $\mathcal{R} = \{(1, a), (2, a), (3, a), (4, b), (5, c), (3, d)\}$,
 - $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{a, b, c, d\}$, $\mathcal{R} = \{(1, a), (2, a), (3, d), (4, b)\}$,
 - $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b, c, d, e\}$, $\mathcal{R} = \{(1, a), (2, a), (3, e)\}$,
 - $A = \mathbb{N}$, $B = \mathbb{R}$, $\mathcal{R} = \{(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{R} / a = 2b - 3\}$,
 - $A = \mathbb{R}$, $B = \mathbb{N}$, $\mathcal{R} = \{(a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{N} / a = 2b - 3\}$,
 - $A = \mathbb{Z}$, $B = \mathbb{Z}$, $\mathcal{R} = \{(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} / a + b \text{ es divisible por } 5\}$,
 - $A = \mathbb{N}$, $B = \mathbb{N}$, $\mathcal{R} = \{(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} / b = a^2\}$,
- (b) Para cada una de las relaciones de A en B definidas en a) que sean funciones hallar la imagen y determinar si es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva.
25. Determinar si las siguientes funciones son inyectivas, sobreyectivas o biyectivas. Para las que sean biyectivas hallar la inversa y para las que no sean sobreyectivas hallar la imagen.
- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 12x^3 - 5$.
 - $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 12x^2 - 5$.
 - $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x + y$.
 - $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(x) = (2x, x^2, x - 7)$.
 - $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } x < 6, \\ x + 6 & \text{si } x \geq 6. \end{cases}$
 - $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $f(n) = \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{si } n \text{ es par} \\ n + 1 & \text{si } n \text{ es impar.} \end{cases}$
 - $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $f(n) = \begin{cases} n - 1 & \text{si } n \text{ es par} \\ 2n & \text{si } n \text{ es impar.} \end{cases}$
 - $f : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $f(a, b) = 3a - 2b$.
 - $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $f(a) = \begin{cases} a + 1 & \text{si } a \text{ es par} \\ a - 1 & \text{si } a \text{ es impar.} \end{cases}$
26. (a) Dadas las funciones

$$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \qquad g : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$f(n) = \begin{cases} \frac{n^2}{2} & \text{si } n \text{ es divisible por } 6 \\ 3n + 1 & \text{en otro caso} \end{cases} \qquad g(n, m) = n \cdot (m + 1)$$

calcular $(f \circ g)((3, 4)$, $(f \circ g)((2, 5)$ y $(f \circ g)((3, 2)$.

(b) Dadas las funciones

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \qquad g : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \leq 7 \\ 2x - 1 & \text{si } x > 7 \end{cases} \qquad g(n) = \sqrt{n}$$

Hallar todos los $n \in \mathbb{N}$ tal que

i. $(f \circ g)(n) = 13$.

ii. $(f \circ g)(n) = 15$.

27. Hallar $f \circ g$ en los casos

(a) $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = 2x^2 - 18$
 $g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad g(x) = x + 3$.

(b) $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x + 3$
 $g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad g(x) = 2x^2 - 18$

(c) $f : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}, \quad f(n) = \begin{cases} n - 2 & \text{si } n \text{ es divisible por } 4 \\ n - 1 & \text{si } n \text{ no es divisible por } 4, \end{cases}$
 $g : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}, \quad g(n) = 4n$.

(d) $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R}, \quad f(x) = (x + 5, 3x)$
 $g : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad g(n) = \sqrt{n}$.

28. Hallar dos funciones $f : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$ y $g : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$ tales que $f \circ g = \text{id}_{\mathbb{N}}$ y $g \circ f \neq \text{id}_{\mathbb{N}}$, donde $\text{id}_{\mathbb{N}} : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$ denota la función identidad.

29. Sean A, B y C conjuntos. Probar que si $f : B \longrightarrow C$ y $g : A \longrightarrow B$ son funciones entonces valen

(a) si $f \circ g$ es inyectiva entonces g es inyectiva.

(b) si $f \circ g$ es sobreyectiva entonces f es sobreyectiva.

(c) si f y g son inyectivas entonces $f \circ g$ es inyectiva.

(d) si f y g son sobreyectivas entonces $f \circ g$ es sobreyectiva.

(e) si f y g son biyectivas entonces $f \circ g$ es biyectiva.