

Práctica 5

1. Calcular

a) $\int_0^{\pi/4} e^{it} dt$ b) $\int_0^{\infty} e^{-zt} dt$ ($\operatorname{Re}(z) > 0$) c) $\int_1^2 \log(it) dt$

2. a) Sean γ, σ las poligonales de vértices $\{1, i\}$ y $\{1, 1+i, i\}$ respectivamente. Hallar una parametrización de γ y de σ y calcular $\int_{\gamma} f$ y $\int_{\sigma} f$, donde $f(z) = |z|^2$.

b) Deducir que en el plano complejo deja de ser cierto que toda función continua tiene primitiva.

3. Calcular: $\int_{\gamma} 3z dz$ y $\int_{\gamma} 3|z| dz$, para

a) γ : segmento que une -1 con 1 .

b) γ : $|z| = 1$ de -1 a 1 , recorrido en el sentido horario.

c) γ : $|z| = 1$ de -1 a 1 , recorrido en el sentido antihorario.

d) γ : poligonal de vértices $-1, i, 1$.

4. Calcular

a) $\int_C e^z dz$, si $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$, recorrida una vez en sentido horario.

b) $\int_0^1 x dz$, uniendo ambos puntos con un segmento y luego con la poligonal de vértices: $0, i, 1$.

c) $\int_{|z-a|=r} (z-a)^m dz$ para cada $m \in \mathbb{Z}$, recorriendo la curva una vez en sentido horario.

5. Sea γ el polígono cerrado de vértices: $1-i, 1+i, -1+i, -1-i, 1-i$.

Hallar $\int_{\gamma} \frac{dz}{z}$.

6. Sean $D \subset \mathbb{C}$ abierto, $\gamma: [a, b] \rightarrow D$ diferenciable a trozos y $f: D \rightarrow \mathbb{C}$ continua. Se define:

$$\int_{\gamma} f |dz| = \int_a^b f(\gamma(t)) |\gamma'(t)| dt$$

a) ¿Qué se obtiene cuando $f \equiv 1$?

- b) Calcular $\int_{\gamma} |dz|$ para $\gamma : |z - a| = r$.
- c) Probar que $\left| \int_{\gamma} f dz \right| \leq \int_{\gamma} |f| |dz|$ y deducir que si $|f(z)| \leq M$ y $\ell = \text{long}(\gamma)$, entonces $\left| \int_{\gamma} f dz \right| \leq M\ell$.

7. Calcular

a) $\int_{\gamma} x dz$, γ : segmento de 0 a $1 + i$

b) $\int_{|z|=1} |z - 1| |dz|$

c) $\int_{C_i} z^n dz$ ($a \in \mathbb{R}_{>0}, n \in \mathbb{N}$)

$$C_1 : z(t) = ae^{it}, 0 \leq t \leq \pi; \quad C_2 : z(t) = ae^{it}, 0 \leq t \leq 2\pi$$

d) $\int_{C_i} \frac{dz}{z - 2}$ $C_1 : |z - 2| = 4; \quad C_2 : |z - 1| = 5$

e) $\int_{\gamma} (x^2 + iy^2) |dz|$ $\gamma : |z| = 2$

f) $\int_{|z-1|=1} \bar{z}^2 dz$

8. Hallar $\int_{\gamma} z^{-\frac{1}{2}} dz$, donde:

- a) $\gamma : |z| = 1, \text{Im}(z) \geq 0$, de 1 a -1 .
- b) $\gamma : |z| = 1, \text{Im}(z) \leq 0$, de 1 a -1 .

9. Sea $\gamma(t) = 1 + e^{it}$ para $0 \leq t \leq 2\pi$. Hallar

a) $\int_{\gamma} (z^2 - 1)^{-1} dz$.

b) Idem para $\gamma(t) = 2e^{it}$, $-\pi \leq t \leq \pi$.

10. Sea f holomorfa en un abierto conexo Ω tal que $|f(z) - 1| < 1$ en Ω . Mostrar que $\int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = 0$ para cualquier curva cerrada γ contenida en Ω .

Nota: f' es continua.

