

1. Sean $(X_n)_{n \geq 2}$ v. a. independientes $X_n \sim \varepsilon(1)$. Sea $Y_n = \frac{X_n}{\ln n}$.

a) Probar que $Y_n \xrightarrow{P} 0$.

b) Probar que $\lim_{n \rightarrow \infty} P(\cup_{m=n}^{\infty} |Y_m| \geq \epsilon) = 1$. Deducir que $P(Y_n \rightarrow 0) = 0$.

c) Sean $(X_n)_{n \geq 1}$ v. a. independientes tal que $P(X_n = 1) = \frac{1}{n}$, $P(X_n = 0) = 1 - \frac{1}{n}$. Entonces $X_n \xrightarrow{P} 0$, pero $P(X_n \rightarrow 0) = 0$.

2. Sean X_1, \dots, X_n v.a. independientes tales que $X_1 = 0$ y para $j \geq 2$

$$P(X_j = k) = \begin{cases} \frac{1}{j^3} & \text{si } k = \pm 1, \pm 2, \dots, \pm j \\ 1 - \frac{2}{j^2} & \text{si } k = 0 \end{cases}$$

Probar que

$$\sum_{j=1}^n \frac{X_j}{n^\alpha} \xrightarrow{P} 0 \quad \text{si } \alpha > \frac{1}{2}$$

Sugerencia: $\sum_{k=1}^j k^2 = \frac{j(j+1)(2j+1)}{6}$.

3. Sean $(X_n)_{n \geq 1}$ v.a. independientes con $P(X_n = n^\theta) = P(X_n = -n^\theta) = \frac{1}{2}$ y $\bar{X}_n = \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{n}$. Probar que si $0 < \theta < \frac{1}{2}$ entonces $\bar{X}_n \xrightarrow{P} 0$.

4. Un minorista recibe galletitas sin sal de 3 fábricas distintas siendo las cantidades recibidas medidas en kg. v.a. independientes X, Y, Z con distribuciones: $X \sim N(100, 20)$, $Y = 97 + W$ con $W \sim \varepsilon(\frac{1}{3})$ y $Z \sim \mathcal{U}[80, 90]$. Acotar inferiormente la probabilidad de que el total recibido se encuentre entre 275 y 295.

5. Una máquina produce rieles cuya longitud es una v.a. con distribución $\mathcal{U}[0,8, 1,2]$. Se eligen al azar n rieles en forma independiente y se forma el promedio \bar{X} de sus longitudes. Hallar n para que

$$P(0,99 < \bar{X} < 1,01) > 0,90.$$

6. Sea p la probabilidad de que una persona elegida al azar apoye la legalización del consumo de marihuana (p es desconocida). Se toma una muestra de 50 personas elegidas al azar, se les pregunta si apoyan o no la legalización y se estima p a partir de la frecuencia relativa f_r que se define por

$$f_r = \frac{\text{N}^\circ \text{ de personas encuestadas que están a favor de la legalización}}{50}$$

Observar que f_r es una variable aleatoria, y p es un número. Cuánto más cerca esté f_r de p , mejor estimador será. Hallar una cota superior para $P(|f_r - p| > 0,1)$ que no dependa de p .

7. Sean X_1, \dots, X_n v.a. independientes tales que $X_n \sim \mathcal{U}[0, a_n]$, $a_n > 0$. Probar que:

a) Si $a_n = n^2$ entonces con probabilidad 1 sólo un número finito de las X_n toma valores < 1 .

b) Si $a_n = n$ entonces con probabilidad 1 un número infinito de las X_n toma valores < 1 .

8. Se tira una moneda equilibrada infinitas veces en forma independiente. Consideremos una racha fija (s_1, \dots, s_k) donde cada $s_i \in \{c, s\}$; $1 \leq i \leq k$.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que la racha aparezca entre el tiro $n + 1$ y el $n + k$?

b) Mostrar que la probabilidad de que la racha aparezca infinitas veces es 1.

9. Se elige al azar un número en el intervalo $[0, 1]$.

a) Encontrar la probabilidad de que la primera cifra decimal sea 2.

b) Encontrar la probabilidad de que la n -ésima cifra decimal sea 5 y la $(n + 1)$ -ésima sea 7.

c) Sea B el suceso: "el número 57 aparece infinitas veces en el desarrollo decimal". Probar que $P(B) = 1$.

d) Sea A_n el suceso: "el 9 aparece n veces consecutivas en los $2n$ primeros lugares". Calcular $P(A^\infty)$ con $A^\infty =$

$$\{A_n \text{ infinitas veces}\} = \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k.$$

e) ¿Cuál es la probabilidad de que sea racional?

Observación: Si un número admite dos desarrollos decimales se optará por el finito. Por ejemplo, se toma 0.745 y no 0.7449.

10. Recordemos que una colección $\{X_\alpha\}_{\alpha \in A}$ de variables aleatorias se dice *acotada en probabilidad* (o *tight* que suele traducirse como *tensa* o *rígida*) si dado $\varepsilon > 0$ existe $K > 0$ tal que

$$P(|X_\alpha| > K) < \varepsilon \quad \forall \alpha \in A.$$

- a) Probar que si X es una variable aleatoria, entonces X es acotada en probabilidad.
 b) Sean X_1, \dots, X_n variables aleatorias, probar que $\{X_i\}_{1 \leq i \leq n}$ es una colección acotada en probabilidad.
 c) Sea $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de variables aleatorias y X una v. a. tales que $X_n \xrightarrow{P} X$. Probar que $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ está acotada en probabilidad. Más aún, dado $\varepsilon > 0$ mostrar que existe un $K > 0$ tal que

$$P(|X_n| > K) < \varepsilon \quad \forall n \in \mathbb{N} \text{ y } P(|X| > K) < \varepsilon,$$

es decir que la colección $\{(X_n)_{n \in \mathbb{N}}, X\}$ está acotada en probabilidad.

11. Sean $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ e $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dos sucesiones de v. a.

- a) Probar que si $X_n \xrightarrow{P} 0$ e $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ está acotada en probabilidad, entonces $X_n Y_n \xrightarrow{P} 0$.
 b) Si $X_n \xrightarrow{P} X$ e $Y_n \xrightarrow{P} Y$ probar que $X_n + Y_n \xrightarrow{P} X + Y$ y que $X_n Y_n \xrightarrow{P} XY$.
 c) Si $|X_n| \leq c \quad \forall n$, probar que la condición necesaria y suficiente para que $X_n \xrightarrow{P} 0$ es que $\lim_{n \rightarrow \infty} E(|X_n|) = 0$. Exhibir un contraejemplo para la equivalencia anterior en el caso en que la sucesión $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ no sea acotada.

12. Sean $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ e $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dos sucesiones de v. a. y sean X e Y dos v. a.

- a) Si $X_n \xrightarrow{P} X$ y g es una función uniformemente continua, probar que $g(X_n) \xrightarrow{P} g(X)$.
 b) Ídem 12a para g continua.
Sugerencia: Usar 12a y el ejercicio 10.
 c) Si $X_n \xrightarrow{P} X$, $Y_n \xrightarrow{P} Y$ y g es una función continua, probar que $g(X_n, Y_n) \xrightarrow{P} g(X, Y)$.
 d) Si $X_n \xrightarrow{c.s.} X$, $Y_n \xrightarrow{c.s.} Y$ y g es una función continua, probar que $g(X_n, Y_n) \xrightarrow{c.s.} g(X, Y)$.
 e) Usando 11c probar que si $X_n \xrightarrow{P} c$ donde c es una constante y si f es una función acotada y continua en c , entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} E[f(X_n)] = f(c)$.

13. Sea $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de v. a.

- a) Supongamos que $Y_n \xrightarrow{P} c$, donde c es una constante, $c > 0$. Se define la sucesión

$$Z_n = \begin{cases} \frac{1}{Y_n} & \text{si } Y_n \neq 0 \\ 0 & \text{si } Y_n = 0. \end{cases}$$

Probar que $Z_n \xrightarrow{P} \frac{1}{c}$. Notar que la propiedad también vale si $c < 0$.

- b) Supongamos que $Y_n \xrightarrow{P} Y$, con $P(Y = 0) = 0$. Se define la misma sucesión Z_n que en el ítem anterior. Probar que $Z_n \xrightarrow{P} Z$ dada por

$$Z = \begin{cases} \frac{1}{Y} & \text{si } Y \neq 0 \\ 0 & \text{si } Y = 0. \end{cases}$$

Notar que $Z = \frac{1}{Y}$ c.s.

14. Sean f y g funciones continuas en $[0, 1]$ tales que $0 \leq f(x) \leq cg(x)$ donde c es una constante positiva y $\int_0^1 g(x) dx > 0$.

- a) Sean X_1, \dots, X_n las coordenadas de un punto P elegido al azar en el cubo $[0, 1]^n$ (es decir, con distribución uniforme). Sean $Y_n = \sum_{i=1}^n \frac{f(X_i)}{n}$ y $Z_n = \sum_{i=1}^n \frac{g(X_i)}{n}$. Verificar que:

$$Y_n \xrightarrow{P} \int_0^1 f(x) dx$$

$$Z_n \xrightarrow{P} \int_0^1 g(x) dx$$

b) Probar que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \cdots \int_0^1 \frac{f(x_1) + \cdots + f(x_n)}{g(x_1) + \cdots + g(x_n)} dx_1 \cdots dx_n = \frac{\int_0^1 f(x) dx}{\int_0^1 g(x) dx}$$

Sugerencia: Usar el ejercicio 12e.

15. Un ejemplo de variables aleatorias que convergen casi seguramente sin convergencia de ninguno de los momentos.

Sean $(X_n)_{n \geq 1}$ v.a. tales que:

$$P(X_n = 0) = 1 - \frac{1}{n^2} \quad P(X_n = n^2) = \frac{1}{n^2}.$$

Mostrar que $X_n \xrightarrow{c.s.} 0$ pero $E(X_n^p) \not\rightarrow 0 \forall p \in \mathbb{N}$.

16. Sean $(X_n)_{n \geq 1}$ v.a.i.i.d., $X_i \sim \mathcal{U}[0, 1]$. Hallar el límite c.s. de Y_n donde $Y_n = \left(\prod_{i=1}^n X_i \right)^{1/n}$.

17. Sean $(X_n)_{n \geq 1}$ v.a.i.i.d., $E(X_1) = \text{Var}(X_1) = 1$ y $E(X_1^4) < \infty$. Probar que entonces

$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{\left(n \sum_{i=1}^n X_i^2 \right)^{1/2}} \xrightarrow{c.s.} \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

18. Sean $(X_n)_{n \geq 1}$ v.a. i.i.d., $E(|X_1|^2) < \infty$. Hallar

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E(X_1 | X_1 + \cdots + X_n)$$

Sugerencia: Probar que $E(X_1 | X_1 + \cdots + X_n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.