

PRÁCTICA 1 -REALES: SUCESIONES Y SUPREMOS-

“Não se pode esperar aprender Matemática contemplativamente. Apelo, portanto, ao leitor para que tente resolver os exercícios que lhe pareçam mais atraentes e/ou desafiadores. [...] Procure ler o enunciado de cada um. É boa sorte na viagem que ora inicia.”

LAGES LIMA.

Ejercicio 1. Para cada $x \in \mathbb{R}$ se define $A_x = \{m \in \mathbb{Z} : m \leq x\}$.

- i) Verificar que $A_x \neq \emptyset$ y es acotado superiormente. Concluir que existe el máximo de A_x . Este número se llama la *parte entera de x* y se notará $[x]$.
- ii) Demostrar que:
 - a) $0 \leq x - [x] < 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}$.
 - b) $[x] = x \iff x \in \mathbb{Z}$.
 - c) $[x + y] \leq [x] + [y] + 1$.
 - d) $x < y \Rightarrow [x] \leq [y]$.

Ejercicio 2.

- i) Sean $x, y \in \mathbb{R}$ tales que $y - x > 1$. Mostrar que existe un entero k tal que $x < k < y$.
- ii) Sean $x, y \in \mathbb{R}$ tales que $x < y$. Mostrar que existe $r \in \mathbb{Q}$ tal que $x < r < y$.
- iii) Sean $r, s \in \mathbb{Q}$ tales que $r > s$. Mostrar que existe un número irracional entre r y s .
- iv) Sean $x, y \in \mathbb{R}$ tales que $x < y$. Mostrar que existe un número irracional entre x e y .

Ejercicio 3.

- i) Probar que para cada $x \in \mathbb{R}$, existe una sucesión $(q_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{Q}$ estrictamente decreciente tal que $q_n \geq x$ para todo $n \in \mathbb{N}$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} q_n = x$.
- ii) Enunciar y probar un enunciado análogo donde $(q_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sea estrictamente creciente.

Ejercicio 4. Sean $x = (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$ y $\varepsilon > 0$. Mostrar que existe $q = (q_1, \dots, q_m) \in \mathbb{Q}^m$ tal que $\|x - q\| = \left(\sum_{i=1}^m (x_i - q_i)^2\right)^{1/2} < \varepsilon$.

Ejercicio 5. Sea $A = \left\{ \frac{m}{2^n} \mid m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N} \right\}$. Probar que A es denso en \mathbb{R} .

Analizar la misma situación para el conjunto $B = \left\{ \frac{m}{b^n} \mid m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N} \right\}$, donde $b \in \mathbb{R}_{>0}$.

Ejercicio 6. Sean $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ y $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sucesiones de números reales tales que

- i) $\exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_0, a_n \leq b_n \leq c_n$;
- ii) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \ell$.

Probar que $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \ell$.

Ejercicio 7.

- i) Sea $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión monótona. Probar que:
- Si existe una subsucesión $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ convergente a $\ell \in \mathbb{R}$, entonces $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge a ℓ . ¿Qué pasa si la subsucesión tiende a ∞ ?
 - $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge $\iff (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es acotada.
- ii) Demostrar que cualquier subsucesión de una sucesión convergente es también convergente.
- iii) Encontrar una sucesión **no** convergente $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ que verifique $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n - a_{n+1}| = 0$.
- iv) Analizar la situación del inciso anterior pero con la condición: $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n - a_{n+p}| = 0$ para todo $p \in \mathbb{N}$ y estudiar si la respuesta contradice algún resultado conocido.

Ejercicio 8. Mostrar que en un cuerpo totalmente ordenado arquimediano son equivalentes las afirmaciones siguientes (¿dónde se usa la arquimedianoidad?):

- toda sucesión acotada tiene una subsucesión convergente;
- toda sucesión de Cauchy es convergente;
- si $(I_n)_{n \geq 1}$ es un encaje de intervalos cerrados cuyas longitudes tienden a cero, entonces existe un único $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$;
- todo conjunto acotado superiormente y no vacío tiene supremo;
- toda sucesión monótona y acotada superiormente tiene supremo.

Ejercicio 9. Sea $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión acotada de números reales. Para cada $n \in \mathbb{N}$ se considera $A_n = \{a_k : k \geq n\}$. Sean $\lambda_n = \sup A_n$ y $\gamma_n = \inf A_n$.

- Probar que $(\lambda_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es decreciente y $(\gamma_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es creciente. Concluir que $(\lambda_n)_{n \in \mathbb{N}}$ y $(\gamma_n)_{n \in \mathbb{N}}$ son sucesiones convergentes. Al límite de la sucesión $(\lambda_n)_{n \in \mathbb{N}}$ (resp. $(\gamma_n)_{n \in \mathbb{N}}$) lo llamaremos *límite superior* (resp. *límite inferior*) de $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ y lo notaremos $\limsup a_n$ (resp. $\liminf a_n$).
- Sean $\alpha = \liminf a_n$ y $\beta = \limsup a_n$, y sea $\varepsilon > 0$. Probar que a la derecha de $\beta + \varepsilon$ y a la izquierda de $\alpha - \varepsilon$ existen finitos términos de $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$. ¿Vale la recíproca?

Ejercicio 10. Hallar los límites superior e inferior de las siguientes sucesiones:

- 1, 3, -1, 1, 3, -1, 1, 3, -1, ...
- $(-1)^n \left(2 + \frac{3}{n}\right)$.
- $\left(1 - \frac{1}{n}\right) \operatorname{sen} \left(n \frac{\pi}{2}\right)$.
- $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ definida por: $s_1 = 0$, $s_{2n} = \frac{s_{2n-1}}{2}$, $s_{2n+1} = \frac{1}{2} + s_{2n}$.
- $\frac{n}{3} - \left[\frac{n}{3}\right]$.

Ejercicio 11.

- i) Encontrar una sucesión $(x_n) \subset \mathbb{R}$ tal que $\liminf x_n = -3$, $\limsup x_n = 5$ y el conjunto $\{x_n / n \in \mathbb{N}\}$ sea infinito.
- ii) ¿Es cierto que
- si $\limsup x_n = 2$, entonces existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $x_n > 1,99$ para todo $n \geq n_0$?
 - si $\limsup x_n = b$, entonces existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $x_n \leq b$ para todo $n \geq n_0$?

Ejercicio 12. Sea $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de números reales acotada.

- i) Probar que $\alpha = \limsup a_n$ si y sólo si para cada $\varepsilon > 0$ se verifica:
- $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\forall n \geq n_0, a_n < \alpha + \varepsilon$;
 - $\forall n \in \mathbb{N} \exists m \geq n$ tal que $a_m > \alpha - \varepsilon$.
- ii) Demostrar que $\alpha = \limsup a_n$ si y sólo si se verifican las dos condiciones siguientes:
- Existe una subsucesión $(a_{n_j})_{j \in \mathbb{N}}$ tal que $\lim_{j \rightarrow \infty} a_{n_j} = \alpha$;
 - si $(a_{n_j})_{j \in \mathbb{N}}$ es una subsucesión convergente, entonces $\lim_{j \rightarrow \infty} a_{n_j} \leq \alpha$.

Ejercicio 13. Sea $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$. Probar que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \ell$ si y sólo si $\limsup a_n = \liminf a_n = \ell$.**Ejercicio 14.** Sean $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}, (b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sucesiones reales acotadas. Probar que:

- $\limsup(a_n + b_n) \leq \limsup a_n + \limsup b_n$.
- $\limsup(a_n \cdot b_n) \leq \limsup a_n \cdot \limsup b_n$, si $a_n, b_n \geq 0$.
- Si $c > 0$ entonces, $\limsup(c \cdot a_n) = c \cdot \limsup a_n$.

Enunciar y probar resultados análogos para \liminf .

Ejercicio 15. Sea $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}_{>0}$.

- Probar que: $\liminf \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \liminf \sqrt[n]{a_n} \leq \limsup \sqrt[n]{a_n} \leq \limsup \frac{a_{n+1}}{a_n}$.
- Deducir que si existe $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = A \in \mathbb{R}_\infty$ entonces, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = A$.
- Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}$.

Ejercicio 16. Sean $x, y \in \mathbb{R}$ y $(x_i)_{i \geq 0}, (y_j)_{j \geq 0}$ desarrollos de ambos en base $b > 1$. Se supone que el desarrollo de y es infinito, i.e., para todo $n \in \mathbb{N}$ existe $i > n$ con $y_i > 0$.

- Probar que si $x_i = y_i$ para todo $i \leq n - 1$ y $x_n < y_n$, entonces $x < y$.
- Deducir que el orden entre x e y es el mismo que el de los primeros términos en que difieren sus desarrollos.
- Manteniendo las hipótesis de i), sea $z \in [x, y]$. Probar que entonces z tiene un desarrollo en base b con $z_i = x_i = y_i$ para todo $i \leq n - 1$.

Ejercicio 17. Hallar el desarrollo en base 2, 3 y 16 de los números 2,25; 10,7; 27 y 255.