
ANÁLISIS NUMÉRICO

Segundo Cuatrimestre 2017

Práctica N° 1: Diferencias Finitas (Introducción)

Discretización de derivadas

Ejercicio 1 Para las siguientes discretizaciones de la derivada primera, halle una expresión para el error local y señale las hipótesis de suavidad necesarias sobre la función u para que el orden de precisión sea el indicado en cada caso.

$$u'(x) \sim \frac{u(x+h)-u(x)}{h} \quad (\text{diferencia forward}) \quad O(h)$$

$$u'(x) \sim \frac{u(x)-u(x-h)}{h} \quad (\text{diferencia backward}) \quad O(h)$$

$$u'(x) \sim \frac{u(x+h)-u(x-h)}{2h} \quad (\text{diferencia centrada}) \quad O(h^2)$$

Repita el análisis para la discretización con diferencias centradas de la derivada segunda.

$$u''(x) \sim \frac{u(x+h) - 2u(x) + u(x-h)}{h^2}, \quad \text{de orden } O(h^2)$$

¿Qué hipótesis de suavidad es necesaria en este último caso?

Ejercicio 2 Las siguientes son versiones de orden 2 de las diferencias forward o backward, que utilizan nodos a un solo lado de x .

(a) Verifique que la siguiente fórmula para la derivada primera tiene orden $O(h^2)$:

$$u'(x) \sim -\frac{1}{h} \left(\frac{3}{2}u(x) - 2u(x+h) + \frac{1}{2}u(x+2h) \right)$$

(b) Halle una fórmula de aproximación para la derivada segunda $u''(x)$ que utilice los valores de u en $x, x+h$ y $x+2h$. ¿Cuál es el orden que resulta en este caso?

Problemas de valores iniciales

Ejercicio 3 Dada una constante $a > 0$, considere el problema de valores iniciales para $t > 0$.

$$y'(t) = -ay(t) \quad y(0) = 1$$

Para cada paso temporal Δt fijo se consideran las discretizaciones

$$\frac{y^{n+1}-y^n}{\Delta t} = -ay^n \quad \text{Euler explícito}$$

$$\frac{y^{n+1}-y^n}{\Delta t} = -ay^{n+1} \quad \text{Euler implícito}$$

$$\frac{y^{n+1}-y^n}{\Delta t} = -a \left(\frac{1}{2}y^{n+1} + \frac{1}{2}y^n \right) \quad \text{Adams-Moulton de 1 paso}$$

Grafique la solución obtenida para $a = 7$, $\Delta t = 0.1$ y $0 < t < 3$. Demuestre que

- (a) Para Euler explícito se tiene $|y_n| \rightarrow 0$ si $\Delta t < 2/a$, y $|y^n| \rightarrow \infty$ si $\Delta t > 2/a$.
 (b) Para Euler implícito y el Método de Adams-Moulton de 1 paso, $y_n \rightarrow 0$ para todo h .

Ejercicio 4 Dada la ecuación cuadrática $z^2 + bz + c = 0$ con b y c en \mathbb{R} . Demuestre que las raíces están en el círculo unitario $\Leftrightarrow |c| \leq 1$ y $|b| \leq 1 + c$. (Este resultado facilita el análisis de esquemas de 2 pasos).

Ejercicio 5 Considere el problema

$$y''(t) = -ay(t), \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0, \quad 0 < t < T_f,$$

y la discretización explícita de 2 pasos

$$\frac{y^{n+1} - 2y^n + y^{n-1}}{(\Delta t)^2} = -ay^n.$$

- (a) Implemente el método y compare con la solución para $a = 1$, $\Delta t = 1$ y $T_f = 120$.
 (b) Muestre que $|y^n| \rightarrow \infty$ si $\Delta t > 2/\sqrt{a}$, y que en caso contrario $|y^n|$ permanece acotado.

Sug. Reemplace $y_n = \lambda^n$ y resuelva una ecuación de recurrencia para λ .

Problemas de Valores de Contorno

Ejercicio 6 (Condiciones de Dirichlet). Se desea resolver numéricamente la ecuación de Poisson en una dimensión con condiciones de borde de tipo Dirichlet

$$\begin{cases} u_{xx}(x) = f(x), & \text{para } x \in (0, 1) \\ u(0) = \alpha \\ u(1) = \beta. \end{cases} \quad (1)$$

Para ello se considera la malla uniforme $\{x_j = hj, j = 0, 1, 2, \dots, m+1\}$ con $h = 1/(m+1)$. Para los puntos de la malla $x_j \in (0, 1)$ El esquema de diferencias centradas para la derivada segunda (Ej. 1) conduce al sistema de ecuaciones:

$$\frac{1}{h^2} (U_{j-1} - 2U_j + U_{j+1}) = f(x_j) \quad \text{para } j = 1, 2, 3, \dots, m.$$

Utilizando las condiciones de borde $U_0 = \alpha, U_{m+1} = \beta$ se obtiene el sistema

$$A^h U^h = F^h \quad (2)$$

donde $U^h = [U_1, U_2, \dots, U_m]^T$ es el vector de incógnitas, mientras que la matriz tridiagonal A^h y el vector F^h están dados por:

$$A^h = \frac{1}{h^2} \begin{bmatrix} -2 & 1 & & & & \\ 1 & -2 & 1 & & & \\ & 1 & -2 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & 1 & -2 & 1 \\ & & & & 1 & -2 \end{bmatrix}, \quad F^h = \begin{bmatrix} f(x_1) - \alpha/h^2 \\ f(x_2) \\ f(x_3) \\ \vdots \\ f(x_{m-1}) \\ f(x_m) - \beta/h^2 \end{bmatrix}$$

Se define el error de truncado en la malla como

$$\tau_j^h = (A^h u)_j - u_{xx}(x_j), \quad \tau^h = [\tau_1^h, \dots, \tau_m^h]$$

donde u es la solución de (1). Para h fijo, definimos el error puntual en x_j como

$$e_j^h = u(x_j) - U_j^h, \quad e^h = [e_1^h, \dots, e_m^h]$$

(a) Escriba un programa en Matlab que permita obtener la solución U dado f .

Sug.: utilice el comando `toeplitz`.

(b) Grafique el tiempo de ejecución en función de m tanto como si se utiliza el comando `sparse` como si no.

(c) Demuestre que si $f \in C^2(0, 1)$ existe una constante C independiente de h y de m tal que

$$\max_{1 \leq j \leq m} |\tau_j^h| < Ch^2$$

(d) Para $f = \sin(2\pi x)$, utilizando la solución exacta grafique $\|e^h\|_\infty$ en función de h y en escala logarítmica, para valores de $h \rightarrow 0$. ¿Cuál es la pendiente que se observa?

Ejercicio 7 (Capa límite) Considere la ecuación


$$\varepsilon u_{xx} - u_x = f, \quad u(0) = \alpha \quad u(1) = \beta. \quad (3)$$

cuya solución exacta para el caso $f(x) = -1$ está dada por

$$u_\varepsilon(x) = \alpha + x + (\beta - \alpha - 1) \left(\frac{e^{x/\varepsilon} - 1}{e^{1/\varepsilon} - 1} \right)$$

(a) Grafique la solución exacta para el caso $\alpha = 1, \beta = 3$ a medida que $\varepsilon \rightarrow 0$. Interprete el significado del término *capa límite* que se suele aplicar al comportamiento de $u_\varepsilon(x)$ para x cerca del borde $\{x = 1\}$ y $\varepsilon \rightarrow 0$. ¿De qué tamaño es la *capa límite*?

(b) Resuelva numéricamente la ecuación (3) usando diferencias centradas para las derivadas primera y segunda, y una malla de tamaño h . Grafique el error para distintos valores de h y ε . ¿Qué ocurre si $h \gg 2\varepsilon$?



John von Neumann
Budapest 1903 - Washington 1957