

ALGEBRA LINEAL - Práctica N°9 - Segundo cuatrimestre de 2017**Variedades Lineales**

Ejercicio 1. Probar que los siguientes conjuntos son variedades lineales y calcular sus dimensiones:

i) $M_1 = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 / 2x_1 - x_3 = 1 \text{ y } x_2 + x_3 = -2\}$

ii) $M_2 = \{P \in \mathbb{Q}_3[X] / P'(2) = 1\}$

iii) $M_3 = \{A \in \mathbb{C}^{2 \times 2} / \text{tr}(A) = 5\}$

Ejercicio 2. Sean $\Pi = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 / 2x_1 - x_2 + x_3 = 1\}$ y $L = \langle (0, 1, 1) \rangle + (1, 1, 0)$. Hallar una variedad lineal $M \subseteq \mathbb{R}^3$ de dimensión 2 tal que $M \cap \Pi = L$.

Ejercicio 3. Hallar ecuaciones implícitas para la mínima variedad lineal $M \subseteq \mathbb{R}^4$ que contiene a $(1, 1, 2, 0)$, $(2, 1, 1, 0)$ y $(-1, 0, 4, 1)$.

Ejercicio 4. Sean $L = \langle (2, 1, 1) \rangle + (0, -1, 1) \subseteq \mathbb{R}^3$ y $P = (0, 0, 1)$.

i) Hallar un plano Π tal que $L \subseteq \Pi$ y $P \in \Pi$.

ii) ¿Existirá un plano Π' tal que $L \subseteq \Pi'$, $P \in \Pi'$ y $(1, 0, 0) \in \Pi'$ simultáneamente?

Ejercicio 5.

i) Sea $L_1 = \langle (2, 1, 0) \rangle + (0, 0, 1)$. Hallar una recta $L_2 \parallel L_1$ que pase por el punto $(-1, 3, 0)$.

ii) Si L_1 y L_2 son las rectas de i), hallar un plano $\Pi \subseteq \mathbb{R}^3$ tal que $L_1 \subseteq \Pi$ y $L_2 \subseteq \Pi$ simultáneamente. ¿Es Π único?

Ejercicio 6.

i) Encontrar en \mathbb{R}^3 dos rectas alabeadas que pasen por $(1, 2, 1)$ y $(2, 1, 1)$ respectivamente.

ii) Encontrar en \mathbb{R}^4 dos planos alabeados que pasen por $(1, 1, 1, 0)$ y $(0, 1, 1, 1)$ respectivamente.

iii) ¿Hay planos alabeados en \mathbb{R}^3 ? Más generalmente, si V es un K -espacio vectorial de dimensión n y M_1 y M_2 son variedades lineales alabeadas en V , ¿qué se puede decir de sus dimensiones?

Ejercicio 7. En cada uno de los siguientes casos, decidir si las variedades lineales M_1 y M_2 se cortan, son paralelas o son alabeadas. En cada caso, hallar $M_1 \cap M_2$, $M_1 \vee M_2$ y calcular todas las dimensiones:

i) $M_1 = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 / x_1 + x_2 - x_3 = 1\}$, $M_2 = \langle (1, 0, 1) \rangle + (0, 0, -3)$

ii) $M_1 = \langle (1, 2, 1, 0), (1, 0, 0, 1) \rangle + (1, 2, 2, -1)$, $M_2 = \langle (1, 0, 1, 1), (2, 2, 1, 0) \rangle + (-1, 4, 2, -3)$

iii) $M_1 = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 / x_1 - x_2 - 1 = x_3 + x_4 = 0\}$

$M_2 = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 / x_1 - x_2 = x_2 + x_3 + x_4 - 1 = 0\}$

Ejercicio 8. Sean en \mathbb{R}^3

$$M_1 = \langle (1, 1, 1) \rangle + \langle (0, 2, 0) \rangle \quad \text{y} \quad M_2 = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 / x_1 + x_2 - x_3 = x_1 - x_2 + x_3 = 1\}.$$

- i) Hallar planos Π_1 y Π_2 de \mathbb{R}^3 tales que $M_1 \subseteq \Pi_1$, $M_2 \subseteq \Pi_2$ y $\Pi_1 \parallel \Pi_2$ simultáneamente.
- ii) Hallar $M_1 \cap M_2$ y $M_1 \vee M_2$ y calcular sus dimensiones.

Ejercicio 9. Sean $L_1, L_2 \subseteq \mathbb{R}^3$ las rectas definidas por

$$\begin{aligned} L_1 &= \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 / x_1 - 3x_3 = 0, x_2 - x_3 = -2\} \quad \text{y} \\ L_2 &= \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 / x_1 - 6x_3 = 1, x_2 + 2x_3 = 0\}. \end{aligned}$$

Hallar una recta $L \subseteq \mathbb{R}^3$ que pase por el punto $(1, 0, 2)$ y corte a L_1 y a L_2 .

Ejercicio 10. Sean $A = (1, 1, 2)$ y $B = (2, 0, 2)$. Sea $\Pi = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 / x_1 + x_2 = 2\}$. Hallar $C \in \Pi$ tal que A, B y C formen un triángulo equilátero. ¿La solución es única?

Ejercicio 11. Se consideran en \mathbb{R}^2 las rectas $L_1 : x_2 = 0$, $L_2 : x_2 = \alpha$ y $L_3 : x_2 = \beta$, con α y β en \mathbb{R} no nulos y distintos entre sí. Sean L y L' dos rectas transversales a L_1, L_2 y L_3 . Probar que

$$\frac{d(L_1 \cap L, L_2 \cap L)}{d(L_2 \cap L, L_3 \cap L)} = \frac{d(L_1 \cap L', L_2 \cap L')}{d(L_2 \cap L', L_3 \cap L')}.$$

Este enunciado se conoce con el nombre de *Teorema de Thales*.

Ejercicio 12. Sean A_1, A_2 y A_3 en \mathbb{R}^3 tres puntos no alineados. Probar que el conjunto

$$S = \{x \in \mathbb{R}^3 / d(x, A_1) = d(x, A_2) = d(x, A_3)\}$$

es una recta ortogonal al plano que contiene a A_1, A_2 y A_3 . Calcular S en el caso $A_1 = (1, -1, 0)$, $A_2 = (0, 1, 1)$ y $A_3 = (1, 1, 2)$.

Ejercicio 13. Sea $P : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la proyección ortogonal, para el producto interno canónico, sobre el subespacio $S = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 / 2x_1 - x_2 = 0\}$.

- i) Hallar una recta $L \subset \mathbb{R}^3$ tal que $P(L) = (1, 2, 1)$. ¿Es única?
- ii) Hallar una recta $L' \subset \mathbb{R}^3$ tal que $P(L') = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 / 2x_1 - x_2 = 0, x_1 - x_3 = 0\}$. ¿Es única?

Ejercicio 14. Hallar en \mathbb{R}^n el complemento ortogonal a M que pasa por A , la proyección ortogonal de A sobre M y $d(A, M)$ en los siguientes casos:

- i) $n = 3$, $M : \begin{cases} 3x_1 + x_3 = 1 \\ x_1 - x_2 = -1 \end{cases}$, $A = (1, 0, 0)$
- ii) $n = 4$, $M : \begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 1 \\ 2x_1 - 3x_4 = 2 \end{cases}$, $A = (0, 2, 0, -1)$

Ejercicio 15. Dado en \mathbb{R}^2 el triángulo de vértices $A = (2, -3)$, $B = (8, 5)$ y $C = (14, 11)$, hallar la longitud de la altura que pasa por el vértice A .

Ejercicio 16. Sean en \mathbb{R}^3 los puntos $P_1 = (1, -1, 0)$ y $P_2 = (1, 1, 1)$. Encontrar tres planos Π distintos tales que $d(P_1, \Pi) = d(P_2, \Pi)$.

Ejercicio 17. Sean en \mathbb{R}^3 la recta $L = \langle (1, 1, 2) \rangle$ y el punto $P = (1, 0, -2)$. Encontrar un plano Π ortogonal a L tal que $d(P, \Pi) = \sqrt{6}$.

Ejercicio 18. Calcular la distancia entre M_1 y M_2 en los siguientes casos:

i) $M_1 = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 / x_1 - 2x_2 + x_3 = 1\}$

$$M_2 = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 / x_1 - 2x_2 + x_3 = 3\}$$

ii) $M_1 = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 / x_1 + x_2 = 1, x_1 - x_3 = 0\}$

$$M_2 = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 / x_1 + x_2 + x_3 = 0, x_3 = 1\}$$

iii) $M_1 = \langle (1, -1, 0), (2, 1, 1) \rangle + (1, 0, 0)$

$$M_2 = \{(3, 0, 1)\}$$

iv) $M_1 = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 / x_1 - x_2 + x_3 = -2, x_2 - 2x_4 = 2\}$

$$M_2 = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 / x_1 + x_2 + x_3 = 0, x_2 - 2x_4 = -8, x_1 - x_2 + x_4 = 5\}$$

Ejercicio 19. Probar que si M_1 y M_2 son variedades lineales de \mathbb{R}^n con $\dim(M_1) \leq \dim(M_2)$ y $M_1 \parallel M_2$, entonces $d(M_1, M_2) = d(P, M_2)$ para todo $P \in M_1$.

Ejercicio 20. Sean en \mathbb{R}^3

$$M_1 = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 / 2x_1 - x_2 + x_3 = 1\} \text{ y } M_2 = (1, 1, 1) + \langle (0, 1, 1), (1, 0, -2) \rangle.$$

Hallar un plano Π tal que $M_1 \parallel \Pi$, $M_2 \parallel \Pi$ y $d(M_1, \Pi) = d(M_2, \Pi)$.

Ejercicio 21. Sea $L = \langle (3, 0, -4) \rangle + (1, -1, 0)$. Encontrar una recta L' alabeada con L , tal que $d(L, L') = 2$.

Ejercicio 22.

i) Construir una rotación $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $f(M_1) = M_2$ en cada uno de los siguientes casos:

a) $M_1 = \{(1, 2, -1)\}$, $M_2 = \{(-1, 2, 1)\}$

b) $M_1 = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 / x_1 - x_2 = 2, x_3 = 1\}$

$$M_2 = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 / x_1 - 2x_2 = 1, 3x_2 - x_3 = -4\}$$

c) $M_1 = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 / x_1 - x_2 + x_3 = 3\}$

$$M_2 = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 / x_1 - x_2 + x_3 = -3\}$$

ii) Encontrar M_1 y M_2 variedades lineales de \mathbb{R}^3 de igual dimensión tales que no haya ninguna rotación $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ que cumpla $f(M_1) = M_2$.

Ejercicio 23. Sean en \mathbb{R}^3 los planos $\Pi_1 : x_2 - x_3 = 1$ y $\Pi_2 : x_2 + x_3 = -1$. Definir una transformación ortogonal $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $f(\Pi_1) = \Pi_2$ y $f(\Pi_2) = \Pi_1$.

Ejercicio 24. Sea $k \in \mathbb{R}$ y sean Π_1 y Π_2 los planos en \mathbb{R}^3 definidos por

$$\Pi_1 = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 / x_1 - x_2 + 2x_3 = k\} \quad \text{y} \quad \Pi_2 = \langle (1, 0, 1), (0, 1, 2) \rangle + (1, -1, 1).$$

Determinar k para que exista una simetría $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $f(\Pi_1) = \Pi_2$. Para ese valor de k hallar dicha simetría y calcular $f(\Pi_2)$.