

Forma de Smith

Ejemplos: 1) $M = \mathbb{Z}\mathbf{L}_1 \oplus \mathbb{Z}\mathbf{L}_2$ está generado por

$$\mathbf{m}_1 = (1, 0), \mathbf{m}_2 = (0, 1) \text{ con relaciones}$$

$$4\mathbf{m}_1 = 0, 12\mathbf{m}_2 = 0.$$

Considero $\varphi: \mathbb{Z}^2 \rightarrow M$

$$(r, s) \mapsto rm_1 + sm_2$$

$$\rightarrow \ker \varphi = \{(r, s) \in \mathbb{Z}^2 : (r, s) = (4a, 12b); a, b \in \mathbb{Z}\}$$

$\rightarrow (4a, 12b) \in \ker \varphi$ se escribe como

$$(4a, 12b) = a(4, 0) + b(0, 12).$$

La matriz para las relaciones es $\begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 12 \end{pmatrix}$.

2) Sea M el grupo abeliano generado por $\{\mathbf{m}_1, \mathbf{m}_2\}$

y supongamos que el submódulo de

relaciones K está generado por $\{(3, 0), (0, 6)\}$.

\rightarrow la matriz de relaciones es $\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$

$$\text{y } K = \{(3a, 6b) | a, b \in \mathbb{Z}\}.$$

Además $K = \ker(\mathbb{Z}^2 \xrightarrow{\varphi} \mathbb{Z}\mathbf{L}_3 \oplus \mathbb{Z}\mathbf{L}_6)$ donde

$$\varphi(r, s) = (r+3\mathbb{Z}, s+6\mathbb{Z}) \text{ y luego}$$

$$M \cong \mathbb{Z}\mathbf{L}_3 \oplus \mathbb{Z}\mathbf{L}_6.$$

3) Sea M el grupo abeliano con generadores $\{m_1, m_2\}$ y relaciones: $2m_1 + 4m_2 = 0$,

$-2m_1 + 6m_2 = 0$. El submódulo de relaciones contiene a $k_1 = (2, 4)$, $k_2 = (-2, 6)$

Si K es un subgrupo generado por k_1, k_2

→ la matriz sería $\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -2 & 6 \end{pmatrix}$.

Como K también podría generarse con k_1, k_1+k_2 respecto a este conj. de generadores la matriz de relaciones sería

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -2 & 6 \end{pmatrix}$$

en general,

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -2 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_2 \leftarrow C_2 - 2C_1} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -2 & 10 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \leftarrow F_1 + F_2} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 10 \end{pmatrix}$$

en la matriz de relaciones respecto de la base $\{m_1, 2m_1 + m_2\}$

esto nos dice que $M \cong \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_{10}$
 Esta matriz corresponde a $\{m_1, 2m_1 + m_2\}$ y $\{k_1, k_1 + k_2\}$

Generadores y relaciones:

R dominio principal; M R -módulo finitamente generado. $\{m_1, \dots, m_n\}$ conj. de generadores de M

$\rightarrow \exists \varphi: R^n \rightarrow M$ epimorf. tq.

$$\varphi(r_1, \dots, r_n) = \sum_i r_i m_i. \text{ Sea } K = \ker \varphi$$

$$\rightarrow M \cong R^n / K.$$

Def: K es el submódulo de relaciones de M .

OBS: 1) si $(r_1, \dots, r_n) \in K \rightarrow \sum_i r_i m_i = 0$.

2) K es finitamente generado

3) si $\{k_1, \dots, k_m\} \subseteq R^n$ es un conj. de generadores para K , si $k_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in})$

$\rightarrow (a_{ij})$ es la matriz de relaciones de M

respecto del conj. de generadores $\{m_1, \dots, m_n\}$
y $\{k_1, \dots, k_m\}$.

Lema: M finitamente generado; $\{m_1, \dots, m_n\}$ conj.
de generadores (ordenado). Sup. que K está
generado por $\{k_1, \dots, k_p\}$ (ordenado)

Sia $A \in R^{P \times n}$ la matriz de relaciones

entonces

1) si $P \in R^{P \times P}$ es inverible y $PA = \begin{pmatrix} l_1 \\ l_2 \\ \vdots \\ l_p \end{pmatrix}$
 $\rightarrow \{l_1, \dots, l_p\}$ genera K y

entonces PA es la matriz de relaciones respecto
de $\{m_1, \dots, m_n\}$ y $\{l_1, \dots, l_p\}$;

2) si $Q = R^{n \times m}$ es inverible y $Q^{-1} = (q_{ij})$,

$m'_j = \sum_i q_{ij} m_i \rightarrow \{m'_1, \dots, m'_m\}$ es un

conj. de generadores para M y las filas de
 AQ generan el correspondiente submódulo
de relaciones: AQ es la matriz de relaciones
respecto de $\{m'_1, \dots, m'_m\}$;

3) $P \in R^{P \times P}$; $Q \in R^{m \times n}$ inveribles. Si

$B = PAQ \rightarrow B$ es la matriz de relaciones
respecto de un cierto conj. de generadores de M
y de un cierto submódulo de relaciones.

Dem: 1) sup. $P = (\alpha_{ij}) \rightarrow$ las filas de
 PA son:

$$l_1 = \alpha_{11} k_1 + \dots + \alpha_{1p} k_p$$

$$\vdots$$

$$l_p = \alpha_{p1} k_1 + \dots + \alpha_{pp} k_p$$

$\rightarrow l_j \in K \forall j \in \{1, \dots, p\}$ es un conj. de generadores de K por P es inversible.

(u decir, $k_i = \beta_{i1} l_1 + \dots + \beta_{ip} l_p$, donde $P^{-1} = (\beta_{ij})$)

$$2) A \begin{pmatrix} m_1 \\ \vdots \\ m_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow (AQ)Q^{-1} \begin{pmatrix} m_1 \\ \vdots \\ m_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

y entonces:

$$(AQ) \begin{pmatrix} m'_1 \\ \vdots \\ m'_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

Además, si $\Gamma = (\Gamma_1, \dots, \Gamma_n) \in K'$ ($=$ el submódulo de relaciones respecto de $\{m'_1, \dots, m'_n\}$)

$$\rightarrow \sum \Gamma_i m'_i = 0 \text{ . Luego, }$$

$$(\Gamma_1, \dots, \Gamma_n) Q^{-1} \begin{pmatrix} m_1 \\ \vdots \\ m_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow (\Gamma_1, \dots, \Gamma_n) Q^{-1} \in K$$

$$\rightarrow (\Gamma_1, \dots, \Gamma_n) Q^{-1} = \sum_i c_i k_i, c_i \in R$$

$$\rightarrow (\Gamma_1, \dots, \Gamma_n) = \sum_i c_i (k_i Q)$$

3) fácil.

Consideremos 3 tipos de operaciones en las filas (columnas)

- 1) multiplicar la fila (columna) por un elemento de $U(R)$;
- 2) intercambiar dos filas (columnas);
- 3) sumarle a una fila (columna) un múltiplo de otra.

Cada una de estas operaciones es invisible.

Si E es la matriz que se obtiene después de haberle aplicado operaciones de filas a la identidad $n \times n \rightarrow EA$ es la matriz que se obtiene después de haberle aplicado esas operaciones a A .

Análogamente, si E' es la matriz que se obtiene después de aplicar operaciones en las columnas de la identidad $m \times m$, AE' es la que se obtiene después de aplicar esas operaciones en A .

OBS: i) E y E' son invisibles.

2) si a la matriz A le aplicamos operaciones de filas/columnas, el resultado tendrá la

forma PAQ con P y Q invertibles.

Proposición: A matriz de relaciones para M

si $\exists P, Q$ invertibles tales que

$$PAQ = \text{diag}(a_1, a_2, \dots, a_n) \rightarrow M \cong R/(a_1) \oplus \dots \oplus R/(a_n)$$

dem: PAQ es la matriz de rels. respecto de

$\{m_1, \dots, m_n\}$ y del submódulo K de rels. generado por las filas de PAQ.

$$\text{Sea } \varphi: R^n \rightarrow M, \quad \varphi(r_1, \dots, r_n) = \sum r_i m_i;$$

$$\rightarrow K = \ker \varphi \quad y \quad R^n/K \cong M. \quad \text{Además}$$

$K = \ker \psi$ donde $\psi: R^n \rightarrow R/(a_1) \oplus \dots \oplus R/(a_n)$
es el epimorf. canónico.

Tarea: $\exists P, Q$ invertibles tales que

$$PAQ = \begin{pmatrix} a_1 & & \\ \vdots & \ddots & \\ & & a_n \end{pmatrix} \quad \text{con } a_i \neq 0 \quad y \quad a_i | a_{i+1}$$

forma
de Smith

dem: hacemos el caso 2×2 . $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

Sea $e = (a:c) \rightarrow \exists x, y \in R$ tales que

$e = ax + by$. Como $e|a$, $\exists \alpha \in R: a = e\alpha$.

y $\exists \beta \in \mathbb{R}$: $b = e\beta$. Además $1 = \alpha x + \beta y$.
 observar que

$$\begin{pmatrix} x & y \\ -\beta & x \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \alpha - y \\ \beta & x \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} x & y \\ -\beta & x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e & bx + dy \\ +dc - a\beta & -b\beta + d\alpha \end{pmatrix}$$

Como el $-a\beta + cd$, puedo aplicar una operación de filas para obtener

$$\begin{pmatrix} e & u \\ 0 & v \end{pmatrix}$$

Hago algo similar pero por columnas y obtengo una matriz de la forma

$$\begin{pmatrix} e_1 & 0 \\ * & * \end{pmatrix} \text{ donde } e_1 = (e: u)$$

Iterando este proceso obtengo una sucesión $(e) \subseteq (e_1) \subseteq \dots$ que tiene que estabilizarse y entonces tengo

$$\begin{pmatrix} f & 0 \\ g & h \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} f & g \\ 0 & h \end{pmatrix}$$

con $f \mid g$. Una operación de fila (o columna)

me da una matriz diagonal $\begin{pmatrix} d_1 & 0 \\ 0 & d_2 \end{pmatrix}$. Luego,

$$\begin{pmatrix} d_1 & 0 \\ 0 & d_2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} d_1 & 0 \\ d_1x + d_2y & d_2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} d_1 & 0 \\ d_1x + d_2y & d_2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} d_1 & 0 \\ d & d_2 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 0 & -d_2\alpha \\ d & d_2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & -d_2\alpha \\ d & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} d & 0 \\ 0 & -d_2\alpha \end{pmatrix}$$

donde $d = (d_1, d_2) = d_1x + d_2y$, $a = d\alpha$, $b = d\beta$

Corolario: M finitamente generado

$\rightarrow \exists a_1, \dots, a_m \in R$ tales que $a_i | a_{i+1}$

y $\exists t \in \mathbb{N}_0$ tal que

$$M \cong R/(a_1) \oplus \dots \oplus R/(a_m) \oplus R^t$$

dem: A es la matriz de relaciones y B

en su forma de Smith: $B = PAQ$.

$$\text{Si } B = \left(\begin{array}{c|c} a_1 & \\ \hline a_m & \\ \hline 0 & \end{array} \right) \rightarrow M \cong R/(a_1) \oplus \dots \oplus R/(a_m) \oplus R^t$$

$$\text{donde } R^t = \underbrace{R/(0) \oplus \dots \oplus R/(0)}_{t \text{ veces}}$$

Ejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 22 & 0 \\ -2 & 2 & -6 & -4 \\ 2 & 2 & 6 & 8 \end{pmatrix}$$

Tengo un módulo M libre con base x_1, x_2, x_3, x_4
 y el submódulo K generado por u_1, u_2, u_3
 con $u_1 = 22x_3$, $u_2 = -2x_1 + 2x_2 - 6x_3 - 4x_4$,
 $u_3 = 2x_1 + 2x_2 + 6x_3 + 8x_4$.

- Cambio filas 1 y 3 $(F_1 \leftrightarrow F_3)$

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & 6 & 8 \\ -2 & 2 & -6 & -4 \\ 0 & 0 & 22 & 0 \end{pmatrix}$$

- $F_2 \leftarrow F_1 + F_2$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & 6 & 8 \\ 0 & 4 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 22 & 0 \end{pmatrix}$$

- $C_2 \leftarrow C_2 - C_1$
- $C_3 \leftarrow C_3 - 3C_1$
- $C_4 \leftarrow C_4 - 4C_1$

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 22 & 0 \end{pmatrix}$$

$$C_4 \leftarrow C_4 - C_2 \quad \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 22 & 0 \end{pmatrix}$$

y ahora, como 4×22 hago así:

$$\begin{array}{l} F_2: F_2 + F_3 \\ \rightarrow \end{array} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 22 & 0 \\ 0 & 0 & 22 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_3: -5C_2 + C_3} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & +2 & 0 \\ 0 & 0 & 22 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{l} C_3 \leftarrow C_2 \\ \rightarrow \end{array} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & +2 & 4 & 0 \\ 0 & 22 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3: -11F_2 + F_3} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -44 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 44 & 0 \end{pmatrix}$$

Luego, la nueva base es y_1, y_2, y_3, y_4 y las relaciones:

$$v_1 = 2y_1$$

$$v_2 = 2y_2$$

$$v_3 = 4y_3$$

Ejemplo: A grupo abeliano con generadores
 m_1, m_2, m_3 son relaciones

$$\begin{cases} 8m_1 + 4m_2 + 4m_3 = 0 \\ 4m_1 + 8m_2 + 4m_3 = 0 \end{cases} \quad (*)$$

$A = \begin{pmatrix} 8 & 4 & 4 \\ 4 & 8 & 4 \end{pmatrix}$ se corresponde con los generadores m_1, m_2, m_3
y las relaciones (*)

Hagamos operaciones:

$$F_1 \leftarrow 2F_2 - F_1 :$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 12 & 0 \\ 4 & 8 & 4 \end{pmatrix} \quad \swarrow$$

los generadores: m_1, m_2, m_3 y
ahora las relaciones
son $12m_2 = 0$
 $4m_1 + 8m_2 + 4m_3 = 0$

$$C_2 \leftarrow 2C_1 - C_2$$

$$C_3 \leftarrow C_3 - C_1$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 12 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \swarrow$$

los generadores son:

$$m_1 + 2m_2 + m_3, m_2$$

y las relaciones

$$12m_2 = 0$$

$$4(m_1 + 2m_2 + m_3) = 0$$

y luego,

$$\begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 12 & 0 \end{pmatrix}$$

generadores: $-m_2, m_1 + 2m_2 + m_3$

relaciones: $4(m_1 + 2m_2 + m_3) = 0$

$$12m_2 = 0$$

$$\rightarrow A \cong \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_{12}$$

Ejercicio: Calcula la cantidad de grupos abelianos no isomorfos de orden 450.

$$450 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5^2$$

$$\rightarrow G \cong \mathbb{Z}_{450}, \quad G \cong \mathbb{Z}_{15} \times \mathbb{Z}_{30}$$

$$G \cong \mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_{90}, \quad G \cong \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_{150}$$

Teatrino de estructura de grupos abelianos finitamente generados.

Teatrino: G grupo abeliano finita mente generado y $T(G) = \{g \in G : \exists m \in \mathbb{N} \text{ s.t. } mg = 0\}$ el subgrupo de torsión. Entonces

(1) $\exists t \in \mathbb{N}_0$ (rango de G) y $L < G$, $L \cong \mathbb{Z}^t$ tal que $G = T(G) \oplus L$.

(2) $\exists! t \geq 0$, $d_1 \geq 2, \dots, d_s \geq 0$ con $d_i \mid d_{i+1}$ tales que $G \cong \mathbb{Z}_{d_1} \times \dots \times \mathbb{Z}_{d_s} \times \mathbb{Z}^t$

(3) (decomposición primaria) $\exists! t \geq 0$, $p_1 < \dots < p_n$ primos, $v_1 \geq 1, \dots, v_n \geq 1$, tales que $G \cong \mathbb{Z}_{p_1^{v_1}} \times \dots \times \mathbb{Z}_{p_n^{v_n}} \times \mathbb{Z}^t$

Ejemplos: 1) hay 3 grupos abelianos de orden p^3 :

$$\mathbb{Z}_{p^3}, \mathbb{Z}_{p^2} \times \mathbb{Z}_p, \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p.$$

2) $|G| = 360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$, 6 abelianos

Las posibilidades son:

$$2^3 : 2^3, 2 \cdot 2^2, 2 \cdot 2 \cdot 2$$

$$3^2 : 3^2, 3 \cdot 3$$

$$5 : 5$$

Tenemos: $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_6 \times \mathbb{Z}_{30}$, $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_{90}$, $\mathbb{Z}_6 \times \mathbb{Z}_{60}$,
 $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_{180}$, $\mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_{120}$, \mathbb{Z}_{360} .

3) Encontrar la descomposición primaria y los factores invariantes del grupo $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_{12} \times \mathbb{Z}_{18}$

$$\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_{12} \times \mathbb{Z}_{18} = \mathbb{Z}_4 \times (\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_3) \times (\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_9)$$

$$(\text{pues si } (m:n) = 1 \rightarrow \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_m = \mathbb{Z}_{nm})$$

Luego, la descomposición primaria es $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_9$

Busquemos ahora los factores invariantes

$$\begin{array}{ccc} 2 & 4 & 4 \\ & 3 & 9 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} & & \\ \hline 2 & 12 & 36 \end{array}$$

$$\rightarrow \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_9 \simeq \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_{12} \times \mathbb{Z}_{36}$$

Ejemplo: sea G abeliano con $|G| = 1350$

sabemos que los componentes de G son de la forma $\mathbb{Z}a_i$ con $a_i | a_{i+1} \forall i$

$$\rightarrow a_1 \cdots a_5 = 1350 = 2^3 3^2 5^2$$

Las posibilidades son:

$$(1) \quad a_1 = 2^1 3^2 5^2 \rightarrow G \cong \mathbb{Z}_{1350}$$

$$(2) \quad a_1 = 2^0 3^0 5^1 = 5, \quad a_2 = 2^1 3^3 5^1 = 270$$

$$\rightarrow G \cong \mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_{270}$$

$$(3) \quad a_1 = 2^0 3^1 5^0 = 3, \quad a_2 = 2^1 3^2 \cdot 5^2 = 450$$

$$\rightarrow G \cong \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_{450}$$

$$(4) \quad a_1 = 2^0 3^1 5^1 = 15, \quad a_2 = 2^1 3^2 5^1 = 90 \rightarrow G \cong \mathbb{Z}_{15} \times \mathbb{Z}_{90}$$

$$(5) \quad a_1 = 2^0 3^1 5^0 = 3, \quad a_2 = 2^0 3^1 5^0 = 3, \quad a_3 = 2^1 3^1 5^2 = 150$$

$$\rightarrow G \cong \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_{150}$$

$$(6) \quad a_1 = 2^0 3^1 5^0 = 3, \quad a_2 = 2^0 3^1 5^1, \quad a_3 = 2^1 3^1 5^1 = 30$$

$$\rightarrow G \cong \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_{15} \times \mathbb{Z}_{30}$$

Ejercicios: 1) Clasificar los grupos abelianos de orden 441×40 :

2) Sean M, N, P grupos abelianos. Probar que $M \oplus N \cong M \oplus P \nRightarrow N \cong P$.

3) en el problema anterior, probar que
 $N \cong P$ ni M, N, P son finitamente generados.

Ejercicio: Sea G un grupo abeliano de orden 24 tal que todo elemento de G tiene orden ≤ 12 .
Encontrar las posibles decomposiciones primarias de G .

$24 = 2^3 \cdot 3 \rightarrow$ los grupos abelianos de orden 24 son
 $\mathbb{Z}_{L_3} \times \mathbb{Z}_{L_8}, \mathbb{Z}_{L_2} \times \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_{L_3}, \mathbb{Z}_{L_2} \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_{L_2} \times \mathbb{Z}_{L_3}$.

si $(a, b, c) \in \mathbb{Z}_{L_2} \times \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_{L_3} \rightarrow 12(a, b, c) = (0, 0, 0)$
 \rightarrow en $\mathbb{Z}_{L_2} \times \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_{L_3}$ todo elemento tiene orden ≤ 12 .

Lo mismo pasa en $\mathbb{Z}_{L_2} \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_{L_3}$, pero

en $\mathbb{Z}_{L_3} \times \mathbb{Z}_{L_8}$, $12(1, 1) = (0, 4) \neq (0, 0)$, de
hecho, $(1, 1)$ tiene orden 24.

Solución del ejercicio 2): tomar $M = \bigoplus_{n=1}^{\infty} \mathbb{Z}_L$, $N = \mathbb{Z}_L$, $P = 0$

la parte 3) sale por el teorema de estructura, si $N \not\cong P$

\rightarrow las decomposiciones de N y P tienen \neq factores invariantes

\rightarrow lo mismo pasaria con $M \oplus N$ y $M \oplus P$.

Ejemplo: El grupo de Alexander de un nudo.

Es un grupo abeliano que funciona como invariante del nudo.

Supongamos tener una proyección con m cruces, entonces, contando el exterior como una región, hay n vértices y m aristas \rightarrow por el teorema de Euler hay $n+2$ caras o regiones

$(V+F-E=2)$. El grupo de Alexander


$A(K)$ del nudo K tiene $n+2$

generadores (uno por cada región) y

las relaciones son: $a+b=c+d$, en


el nudo:

$$\begin{array}{c|c} a & b \\ \hline c & d \end{array}$$

(1) a  $A(K) = \langle a, b, c, d \mid a+c=b+d, c+d=a+e, d+e=a+b \rangle$

$$\simeq \mathbb{Z}_2^2 \times \mathbb{Z}_3.$$

K



$$A(K) = \langle a, b, c, d, e, f \mid a+b=c+f, a+d=b+c \\ a+f=d+e, \\ c+d=e+f \rangle$$

$$\rightarrow A(K) \cong \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_5$$