

# Análisis 1 - Alimentos - 1º cuatrimestre 2019

## PRÁCTICA 3

### CONJUNTOS EN LA RECTA, EL PLANO Y EL ESPACIO

#### Subconjuntos de la recta

1. Hallar el conjunto  $S \subset \mathbb{R}$  de soluciones de las siguientes inecuaciones. En cada caso hallar (si tiene) el supremo e ínfimo, y el máximo y mínimo de  $S$ .

a)  $|x + 3| < 1$

b)  $|3x - 1| < |x - 1|$

c)  $|x - 3| \geq 1$

d)  $x^2 > |x + 3|$

e)  $\left| \frac{x - 2}{3x + 1} \right| \leq 1$

f)  $|x - 3| < 2 - x$

g)  $0 < x^2 \leq x^3$

h)  $|x + 3| + |x - 9| > 2$

i)  $\left| |x + 2| - |x - 1| \right| < 1$

2. Decidir cuáles de los conjuntos del ejercicio anterior son abiertos, cuáles cerrados, cuales no son ninguna de las dos cosas.
3. Sean  $a$  y  $b$  números reales. Decidir para qué valores de  $a$  y de  $b$  son válidas cada una de las siguientes afirmaciones

a)  $a < a$

b)  $a < b \Rightarrow a < b$

c)  $a > 0 \Rightarrow ab \geq b$ .

d)  $a + b \geq \max\{a, b\}$

#### Subconjuntos del plano y el espacio

4. Resolver las siguientes ecuaciones e inecuaciones en  $\mathbb{R}^2$ . Representar las soluciones en el plano.

a)  $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x - y \leq 2\}$

b)  $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x - y| > 2\}$

c)  $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y \leq 1\}$

d)  $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y = 1\}$

e)  $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| + |y| < 3\}$

f)  $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x - 2| + |y + 1| \geq 1\}$

g)  $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \max\{|x|; |y|\} = 1\}$

h)  $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \max\{|x|; |y|\} < 1\}$

5. Mostrar que los siguientes subconjuntos de  $\mathbb{R}^2$  son abiertos

a)  $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 < x^2 + y^2 < 7\}$ ;

b)  $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 2x + y > 1\}$ ;

c)  $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \neq 0 \vee y \neq 0\}$ .

6. Representar gráficamente los siguientes conjuntos  $A$ ; decidir cuáles son abiertos, cuáles cerrados y cuáles ninguna de las dos cosas.

a)  $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 2x^2 + (y - 1)^2 \leq 3\}$

b)  $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y^2 < 5x\} \cup \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = 1, |y| \leq \sqrt{5}\}$

c)  $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 - \frac{y^2}{4} < 1\}$

d)  $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x + y - z < 1) \wedge (z \leq 2)\}$

e)  $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$

7. Determinar cuáles de los siguientes subconjuntos de  $\mathbb{R}^2$  son compactos (cerrados y acotados):

a)  $A = B_1(0) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}$ ;

b)  $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$ ;

c)  $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0 \wedge y > 0\}$ ;

d)  $A = \{(0, \frac{1}{n}) : n \in \mathbb{N}\}$ ;

e)  $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1 \wedge y = 0\}$ .

8. Caracterizar (gráfica o analíticamente) los conjuntos  $\partial A$ ,  $\bar{A}$ ,  $\bar{A} \setminus A$  y  $A \setminus \partial A$ , para los conjuntos  $A$  que aparecen en los Ejercicios 6 y 7.

9. Dar el dominio de definición para cada una de las siguientes funciones y dibujarlo. Decidir cuáles dominios son abiertos o cerrados:

a)  $f(x, y) = \ln(16 - x^2 - y^2)(x^2 + y^2 - 4)$       b)  $f(x, y) = \sqrt{6 - (2x + 3y)}$

c)  $f(x, y) = (1 - x^2 - y^2)^{-12} + \sqrt{y - x^2}$       d)  $f(x, y) = 1x$

e)  $f(x, y) = \frac{\ln(1 - y + x^2)}{\operatorname{sen} x}$       f)  $f(x, y) = \int_x^y \frac{1}{1 + t^2} dt$

g)  $f(x, y) = \frac{\cos x}{\sqrt{1 - x^2 + y^2}}$       h)  $f(x, y) = \frac{\operatorname{sen}(x^2 y)}{\ln(1 - x^2)}$

10. Para distintos valores de  $c$  dibujar las curvas de nivel  $\{(x, y) : f(x, y) = c\}$ .

a)  $f(x, y) = x + y$       b)  $f(x, y) = x^2 + y^2$       c)  $f(x, y) = \sqrt{xy}$

d)  $f(x, y) = \frac{y}{x^2}$       e)  $f(x, y) = x^2 - y^2$       f)  $f(x, y) = xy$

g)  $f(x, y) = 2x^2 + 5y^2$       h)  $f(x, y) = 3x^2 - 2y^2$       i)  $f(x, y) = |x - 1| + |y|$ .

11. Hacer un gráfico aproximado de cada una de las siguientes funciones  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ , cambiando de coordenadas cuando sea necesario.

a)  $f(x, y) = 1 - x - y$       b)  $f(x, y) = 1 - x^2 - y^2$

c)  $f(x, y) = x^2 + 2y^2$       d)  $f(x, y) = x^2$

e)  $f(x, y) = 2xy$       f)  $f(x, y) = 4x^2 - 3y^2$

g)  $f(x, y) = x^2 + y^2 + 2xy$       h)  $f(x, y) = 2x^2 + 2y^2 + 2xy$

i)  $f(x, y) = x^2 + y^2 + 4xy$       j)  $f(x, y) = -x^2 - y^2 + 4xy$

12. Estudiar las superficies de  $\mathbb{R}^3$  representadas por las siguientes ecuaciones y determinar cuáles de estas superficies son la gráfica de una función  $z = f(x, y)$ .

$$\begin{array}{lll} a) \quad z = 2x^2 + y^2 & b) \quad z^2 = 1 - x^2 - \frac{y^2}{2} & c) \quad z = \frac{1}{x^2 + y^2} \\ d) \quad x^2 + y^2 = 4z^2 & e) \quad z^2 = \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{3} - 2 & f) \quad 6x^2 + y^2 - z^2 = 1 \end{array}$$

13. Para distintos valores de  $u$  graficar la superficie de nivel  $\{(x, y, z) : f(x, y, z) = u\}$ .

$$\begin{array}{ll} a) \quad f(x, y, z) = x + y + z & b) \quad f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2 \\ c) \quad f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 & d) \quad f(x, y, z) = x^2 + 2y^2 \\ e) \quad f(x, y, z) = x^2 - y^2 - z^2 & f) \quad f(x, y, z) = x^2 - y^2 + z \\ g) \quad f(x, y, z) = (x - 1)^2 + (y - 3)^2 - z^2 & h) \quad f(x, y, z) = (x - 2)^2 + (y - 3)^2 + 3z^2 \\ i) \quad f(x, y, z) = x^2 + z^2 & j) \quad f(x, y, z) = x^2 - y - z^2. \end{array}$$