

ELEMENTOS DE CÁLCULO NUMÉRICO (B) - 2do. cuatrimestre 2019

Práctica 7 - Diagonalización de matrices

1. Hallar los autovalores y bases de los respectivos autoespacios para cada una de las siguientes matrices:

(a) $\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{pmatrix}$

(b) $\begin{pmatrix} 10 & -9 \\ 4 & -2 \end{pmatrix}$

(c) $\begin{pmatrix} -2 & -7 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$

(d) $\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -1 & 0 & -5 \\ 1 & 2 & 6 \end{pmatrix}$

(e) $\begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 3 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

(f) $\begin{pmatrix} -1 & 4 & -2 \\ -3 & 4 & 0 \\ -3 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

(g) $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \\ -4 & 13 & -1 \end{pmatrix}$

(h) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(i) $\begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & -4 & -5 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

2. Determinar si cada una de las matrices A del ejercicio 1 es o no diagonalizable. En los casos en que sí lo sea, hallar una base de autovectores de A y una matriz invertible C que diagonalice a A (es decir, tal que $C^{-1} \cdot A \cdot C$ sea diagonal).

3. Sea $A = \begin{pmatrix} r & s & t \\ -12 & 6 & 16 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ una matriz tal que $v = (1, 2, 0)$, $w = (2, 6, 0)$ y $u = (-2, -2, -1)$ son autovectores de A .

(a) Probar que A es diagonalizable.

(b) Calcular los autovalores de A y determinar los valores de r , s y t .

4. Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.

(a) Probar que A es diagonalizable y hallar una matriz invertible C que diagonalice a A .

(b) Calcular A^{10} .

5. Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & a \\ 2 & 1 & b \\ 2 & 2 & c \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ tal que $(1, 1, 1)$ es autovector de autovalor $\lambda = 1$ de A .

(a) Determinar a , b y c y hallar todos los autovalores de A .

(b) ¿Es A diagonalizable?

(c) Calcular A^{100} y A^{201} .

6. Sea $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ y sea $v = (1, 2, 0) \in \mathbb{R}^3$.

(a) Probar que A es diagonalizable y hallar una matriz invertible C que diagonalice a A .

- (b) Calcular $A^6 \cdot v^t$ utilizando la diagonalización de A .
- (c) Escribir al vector v como combinación lineal de una base de $\mathbb{R}^3$ de autovectores de A .
- (d) Calcular nuevamente $A^6 \cdot v^t$ sin utilizar la diagonalización de A .
7. Sea $A = \begin{pmatrix} -2 & -3 & -2 \\ 3 & 4 & 2 \\ -2 & -2 & -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ y sea $v = (-2, 2, 3) \in \mathbb{R}^3$.
- (a) Hallar los autovalores de A y los autovectores asociados. deducir que A **no** es diagonalizable.
- (b) Escribir al vector v como combinación lineal de autovectores de A , y calcular $A^{63} \cdot v^t$.
8. Se considera la matriz $A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 3 \\ 1 & 3 & k \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.
- (a) Hallar todos los valores de $k \in \mathbb{R}$ tales que $\lambda = 2$ es autovalor de A .
- (b) Para cada uno de los valores k hallados en (a), decidir si A es diagonalizable.
9. Sea $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ b & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$.
- (a) Hallar todos los valores de $b \in \mathbb{R}$ para los cuales $\lambda = 3$ es autovalor de A .
- (b) Para cada b hallado, dar todos los valores de $a \in \mathbb{R}$ para los que A **no** es diagonalizable.
10. Hallar todos los $a \in \mathbb{R}$ tales que $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ **no** es diagonalizable.
11. Sea $A = \begin{pmatrix} a+1 & 0 & 0 \\ a+2 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$.
- (a) Hallar todos los valores de $a \in \mathbb{R}$ para los que A **no** es diagonalizable.
- (b) Para cada a hallado, dar todos los $b \in \mathbb{R}$ tales que $(0, b^2 + 1, 2)$ es autovector de A .
12. Sea $A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 6 \\ 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$. Hallar los autovalores y autovectores de A , A^3 y A^9 .
13. Sea $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ una matriz tal que $\{1, 2, 3\}$ son las raíces de χ_A . Sea $B = 5A^2 + 3A - 2I$. Calcular $\det(B)$ y $\text{tr}(B)$.
14. Sea $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ una matriz tal que $\lambda = 1$ es autovalor de A , $\text{tr}(A) = 2$ y $\det(A) = -2$.
- (a) Hallar **todos** los autovalores de A .
- (b) Decidir si A^t es o no diagonalizable.
15. Sea $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ una matriz tal que $\dim(N(A)) = 1$, $\text{rg}(A + 2I) = 2$ y $\text{tr}(A) = 0$.

- (a) Calcular los autovalores de A .
 - (b) Decidir si A es inversible y/o diagonalizable.
16. Sea $A \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ una matriz tal que $N(A + I) \neq \{0\}$, $\text{rg}(A - 2I) \leq 2$ y $\chi_A(1) = -4$. Decidir si A es diagonalizable y calcular $A^3 - 4A^2 + A + 6I$.