

## Práctica 4

1. Sea  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $A, B \subseteq \mathbb{R}$  y  $X, Y \subseteq \mathbb{R}$ . Decidir en cada caso si corresponde  $\subseteq$ ,  $\supseteq$  ó  $=$  y probarlo.

$$\begin{array}{llll}
 (i) & f(A \cup B) & \dots\dots & f(A) \cup f(B) \\
 (ii) & f^{-1}(X \cup Y) & \dots\dots & f^{-1}(X) \cup f^{-1}(Y) \\
 (iii) & f(A \cap B) & \dots\dots & f(A) \cap f(B) \\
 (iv) & f^{-1}(X \cap Y) & \dots\dots & f^{-1}(X) \cap f^{-1}(Y) \\
 (v) & f(A^c) & \dots\dots & (f(A))^c \\
 (vi) & f^{-1}(X^c) & \dots\dots & (f^{-1}(X))^c
 \end{array}$$

2. Sea  $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ . Probar que  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = l$  si y solo si para toda sucesión estrictamente decreciente  $\{x_n\}$  tal que  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ , vale  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = l$ .

3. Sean  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  monótona y  $x \in (a, b)$ . Demostrar que si existe una sucesión  $\{x_n\} \subset (a, b)$  tal que  $x_n < x$  para todo  $n$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$  y  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = l$ , entonces  $f(x^-) = l$ .

Enunciar el resultado correspondiente para  $f(x^+)$ .

4. Sean  $A, B \subseteq \mathbb{R}$  y sean  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $g : B \rightarrow \mathbb{R}$  tales que  $f(A) \subset B$ . Si  $f$  es continua en  $a \in A$  y  $g$  es continua en  $f(a)$ , probar que  $g \circ f$  es continua en  $a$ .

5. Sea  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  una función continua tal que  $f(x) = f(y)$  para todo  $x, y \in \mathbb{Q}$ . Demostrar que  $f$  es una función constante. Deducir que dos funciones continuas que coinciden sobre  $\mathbb{Q}$  son la misma función.

6. Hallar todos los puntos donde la función  $f$  es continua, siendo

(a)  $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$  la función:

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{si } x \in \mathbb{Q} \\ 1 - x & \text{si } x \notin \mathbb{Q} \end{cases} .$$

(b)  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  la función:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b} & \text{si } x = \frac{a}{b} \text{ con } a, b \in \mathbb{Z} \text{ coprimos y } b > 0 \\ 0 & \text{si } x \notin \mathbb{Q} \end{cases} .$$

7. Sea  $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$  continua. Demostrar que existe  $c \in [a, b]$  tal que  $f(c) = c$ . *Sugerencia.* Considerar la función  $x - f(x)$ .

8. Sea  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ . Probar que son equivalentes:
- $f$  es continua (en todo  $\mathbb{R}$ ).
  - $f^{-1}(O)$  es abierto para todo  $O \subseteq \mathbb{R}$  abierto.
  - $f^{-1}(F)$  es cerrado para todo  $F \subseteq \mathbb{R}$  cerrado.
9. Sea  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  una función continua. Probar que el gráfico de  $f$  es un subconjunto cerrado de  $\mathbb{R}^2$ .
10. Sea  $K \subset \mathbb{R}$  un conjunto compacto y sea  $f : K \rightarrow \mathbb{R}$  una función continua tal que  $f(x) > 0$  para todo  $x \in K$ . Probar que existe  $\alpha > 0$  tal que  $f(x) > \alpha$  para todo  $x \in K$ .
11. Sea  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  continua tal que  $\lim_{|x| \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ . Probar que  $f$  alcanza su mínimo valor.
12. Sea  $K \subset \mathbb{R}$  un conjunto compacto y sea  $f : K \rightarrow \mathbb{R}$  una función continua. Probar :
- $\{|x| : x \in K\}$  es compacto.
  - Dado  $c \in f(K)$  existe entre las raíces  $x$  de la ecuación  $f(x) = c$ , una de módulo mínimo.
13. \* Considérese el conjunto  $\mathbb{Q} \cap (0, 1)$ . Dado que este conjunto es numerable e infinito se puede escribir:  $\mathbb{Q} \cap (0, 1) = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$ . Se define  $f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$  de la manera siguiente:

$$f(x) = \sum_{n \in \Omega_x} \frac{1}{2^n}$$

donde  $\Omega_x = \{n \in \mathbb{N} : x_n < x\}$ .

Demostrar que:

- $f$  está bien definida.
  - $f$  es una función monótona creciente.
  - $f$  es discontinua en todo punto del conjunto  $\mathbb{Q} \cap (0, 1)$ ; más aún: para todo  $n \in \mathbb{N}$  se tiene  $f(x_n+) - f(x_n-) = \frac{1}{2^n} > 0$ .
  - $f$  es continua a izquierda en todo  $x \in (0, 1)$ ; es decir, para todo  $x \in (0, 1)$  vale que  $f(x-) = f(x)$ .
  - $f$  es continua en todo punto del conjunto  $(0, 1) - \mathbb{Q}$ .
14. Estudiar la continuidad uniforme de las funciones siguientes:
- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  siendo  $f(x) = |x|$ .
  - $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  siendo  $f(x) = x^2$ .
  - $f : (r, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$  siendo  $f(x) = \sqrt{x}$ , con  $r = 0$  y con  $r > 0$ .
  - $f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$  siendo  $f(x) = \sin(\frac{1}{x})$ .
  - $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  siendo  $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ .

15. Sea  $S \subseteq \mathbb{R}$  y sean  $f, g : S \rightarrow \mathbb{R}$  funciones uniformemente continuas.
- Probar que  $f + g$  es uniformemente continua.
  - Mostrar con un ejemplo que  $f \cdot g$  no necesariamente es uniformemente continua, aún si alguna de las funciones  $f$  ó  $g$  es acotada.
  - Probar que si  $h : f(S) \rightarrow \mathbb{R}$  es otra función uniformemente continua entonces  $h \circ f : S \rightarrow \mathbb{R}$  también lo es.

16. Sea  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  una función que es uniformemente continua en los intervalos  $[a, b]$  y  $[b, c]$ . Probar que  $f$  es uniformemente continua en  $[a, c]$ .

¿Es cierto que si  $f$  es una función uniformemente continua sobre un conjunto  $A \subseteq \mathbb{R}$  y también sobre un conjunto  $B \subseteq \mathbb{R}$ , entonces lo es en  $A \cup B$ ?

17. Sea  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $x_0$  y  $\alpha$  números reales. Se dice que  $f$  es localmente Lipschitz de orden  $\alpha$  en el punto  $x_0$  si existen  $\varepsilon, M \in \mathbb{R}_{>0}$  tales que

$$|f(x) - f(x_0)| < M|x - x_0|^\alpha \quad \text{para todo } x \text{ tal que } 0 < |x - x_0| < \varepsilon.$$

$M$  se llama la constante de Lipschitz de  $f$ . Cuando el orden  $\alpha = 1$  decimos simplemente que  $f$  es Lipschitz.

- Demostrar que si  $f$  es localmente Lipschitz de orden  $\alpha > 0$  en  $x_0$  entonces  $f$  es continua en  $x_0$ .
  - Mostrar que si  $f$  es localmente Lipschitz de orden  $\alpha > 1$  en  $x_0$ , entonces es derivable en  $x_0$  y  $f'(x_0) = 0$ .
18. Una función  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  se dice que es Lipschitz si existe una constante  $M > 0$ , llamada la constante de Lipschitz de  $f$ , tal que

$$|f(x) - f(y)| < M|x - y| \text{ para todo } x, y \in A.$$

Sea  $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  la función  $f(x) = \sqrt[3]{x}$ . Demostrar que  $f$  no es Lipschitz pero sin embargo  $f$  es uniformemente continua (en particular “unif. cont.  $\not\Rightarrow$  Lipschitz”).

19. Sea  $S \subset \mathbb{R}$  y sea  $f : S \rightarrow \mathbb{R}$  una función Lipschitz con constante igual a  $M < 1$ . Demostrar que si  $S$  es cerrado, y  $f(S) \subseteq S$  entonces existe  $y \in S$  tal que  $f(y) = y$ , en otras palabras,  $f$  tiene un punto fijo.

*Sugerencia.* Considerar la sucesión  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  en  $S$  construída recursivamente así:  $x_1 \in S$  cualquiera, si  $x_n$  está definido se toma  $x_{n+1} := f(x_n)$ , en otras palabras,  $x_{n+1} := f^{(n)}(x_1)$ . Demostrar que  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  es una sucesión de Cauchy; tomar  $y = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ .

Mostrar con un ejemplo que el resultado es falso si no se supone  $S$  cerrado.

20. Sea  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  la función  $f(x) = \frac{x + \sqrt{x^2 + 1}}{2}$ . Demostrar que  $f$  es Lipschitz con  $M = 1$  pero que  $f$  no tiene puntos fijos.

*Sugerencia.* Considerar la función  $g : K \rightarrow \mathbb{R}$  definida como  $g(x) = |x - f(x)|$ .

21. En cada uno de los casos siguientes, hallar el límite puntual de la sucesión  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  en el conjunto  $S \subset \mathbb{R}$ :

(a)  $f_n(x) = x^n$ ,  $S = (-1, 1]$ .

(b)  $f_n(x) = \frac{e^x}{x^n}$ ,  $S = (1, +\infty)$ .

(c)  $f_n(x) = n^2 x(1 - x^2)^n$ ,  $S = [0, 1]$ .

22. (a) Probar que la sucesión del ejercicio 21(a) converge uniformemente en  $T = (0, 1/2)$ , pero en  $S = (-1, 1]$  converge puntualmente a una función que no es continua.

(b) Probar que la sucesión del ejercicio 21(b) converge uniformemente en  $T = [2, 5]$ .

23. Analizar la convergencia puntual y uniforme de las siguientes sucesiones de funciones en los conjuntos indicados:

(a)  $f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{n}$ , sobre todo  $\mathbb{R}$ .

(b)  $f_n(x) = \sin(\frac{x}{n})$ , sobre todo  $\mathbb{R}$ .

(c)  $f_n(x) = \frac{n}{n+1}x$ , sobre todo  $\mathbb{R}$ .

24. Sea  $S \subset \mathbb{R}$  y sea  $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  una sucesión de funciones  $f_n : S \rightarrow \mathbb{R}$  que converge uniformemente a una función  $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ . Probar que si  $f_n$  es acotada para cada  $n \in \mathbb{N}$  entonces vale:

(a)  $f$  es acotada.

(b) Existe  $M \in \mathbb{R}$  tal que  $|f_n(x)| \leq M$  para todo  $x \in S$  y todo  $n \in \mathbb{N}$  (en otras palabras,  $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  es uniformemente acotada).

25. Sea  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la sucesión de funciones  $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  definida por

$$f_n(x) = n^2 x(1 - x)^n.$$

(a) Probar que  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge puntualmente a la función cero en el intervalo  $[0, 1]$ .

(b) Verificar que existe  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx$  pero que el límite no puede ‘pasar adentro de la integral’. Es decir, ver que  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx \neq \int_0^1 (\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)) dx$

26. Sea  $\{f_n\}$  una sucesión de funciones derivables definidas sobre el intervalo  $[a, b]$ . Supongamos que  $\{f'_n\}$  converge uniformemente en  $[a, b]$ . Probar que si existe  $x_0 \in [a, b]$  tal que  $\{f_n(x_0)\}$  converge, entonces  $\{f_n\}$  converge uniformemente en  $[a, b]$ .

27. Sea  $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  una sucesión de funciones definidas en  $S \subset \mathbb{R}$ . Sea  $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$  tal que la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty$ . Si  $|f_n(x)| \leq a_n$  para todo  $x \in S$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , se sigue que la sucesión  $S_N(x) = \sum_{n=1}^N f_n(x)$  converge uniformemente en  $S$ .