

Análisis II - Análisis matemático II - Matemática 3
Verano 2013

Práctica 7 - Diagramas de fase.

1. *Dinámica unidimensional.* En cada una de las siguientes ecuaciones de la forma $\dot{x} = f(x)$, realizar el gráfico de $f(x)$, hallar los puntos de equilibrio y realizar un bosquejo de la dinámica en el eje x . A partir de esto analizar la estabilidad de los puntos de equilibrio.

(a) $\dot{x} = 1 - x^2$ (b) $\dot{x} = x^3 - x$ (c) $\dot{x} = \sin(x)$

2. Dibujar los campos vectoriales siguientes y tratar de deducir cuáles son las correspondientes líneas de flujo.

(a) $F(x, y) = (x, y)$ (b) $F(x, y) = (-y, x)$

(c) $F(x, y) = (y, 0)$ (d) $F(x, y) = (-x + 2y, -2x - y)$

3. Considerar el sistema a un parámetro,

$$\begin{aligned}\dot{x} &= 2x \\ \dot{y} &= \lambda y \quad \text{con } \lambda \in \mathbb{R}.\end{aligned}$$

Determinar todas las soluciones y hacer un bosquejo del diagrama de fases para $\lambda = -1, 0, 1, 2$.

4. Sea A una matriz diagonal de 2×2 . Encontrar condiciones sobre A que garanticen que:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 0$$

para todas las soluciones de $\dot{x} = Ax$.

5. Sea A una matriz de 2×2 .

a) ¿Cuál es la relación entre los campos $x \rightarrow Ax$ y $x \rightarrow (-A)x$?

b) ¿Cuál es la relación geométrica entre la solución de $\dot{x} = Ax$ y $\dot{x} = -Ax$?

6. Determinar todas las soluciones del sistema

$$\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ -6 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

y hacer un bosquejo del diagrama de fases.

7. Hallar las soluciones y realizar un bosquejo del diagrama de fases para los sistemas (b) y (d) del Ejercicio 2.

8. Realizar un gráfico aproximado de las líneas de flujo de los siguientes campos vectoriales.

$$(a) F(x, y) = (x^2, y^2) \quad (b) F(x, y) = (x, x^2) \quad (c) F(x, y) = (1, x + y)$$

9. Para los siguientes sistemas, hallar los equilibrios y analizar su estabilidad.

$$(a) \begin{cases} \dot{x} = \sin x + \cos y \\ \dot{y} = xy \end{cases} \quad (b) \begin{cases} \dot{x} = (x + 1)e^y - 1 \\ \dot{y} = x + y \end{cases} \quad (c) \begin{cases} \dot{x} = x^2 - y - 1 \\ \dot{y} = xy \end{cases}$$

10. Para las siguientes ecuaciones, hallar los equilibrios y analizar su estabilidad.

$$(d) \ddot{x} + c\dot{x} - x^3 = 1 \quad (e) \ddot{x} + x^3 - x = 0 \quad (f) \ddot{x} - x + \cos x = 0$$

11. Para cada uno de los siguientes sistemas no lineales hallar los puntos de equilibrio y esbozar el diagrama de fases alrededor de cada uno de ellos.

$$(a) \begin{cases} \dot{x} = xe^y \\ \dot{y} = -1 + y + \sin(x) \end{cases} \quad (b) \begin{cases} \dot{x} = e^{x-y} - 1 \\ \dot{y} = xy - 1 \end{cases} \quad (c) \begin{cases} \dot{x} = x(y - 1) - 4 \\ \dot{y} = x^2 - (y - 1)^2 \end{cases}$$

Modelos de crecimiento poblacional.

12. Dada una población $x(t)$ se denomina **tasa de crecimiento** a la razón $\frac{\dot{x}}{x}$.

Como se vió en la Práctica 5, un modelo que considera que hay una población límite K es el modelo logístico en el que la razón de crecimiento es de la forma $r \left(1 - \frac{x}{K}\right)$.

Cuando hay dos poblaciones que conviven, digamos x e y , las razones de crecimiento de éstas dependen de ambas poblaciones. El modelo más sencillo que considera una población de depredadores y y su s presas x es el de Lotka–Volterra:

$$\begin{cases} \dot{x} = x(a - by) \\ \dot{y} = y(-c + dx) \end{cases}$$

con $a, b, c, d > 0$.

Si a este modelo se le agrega el hecho de que cada población tiene por si misma un límite para su supervivencia se obtiene el modelo

$$\begin{cases} \dot{x} = x(a - \delta x - by) \\ \dot{y} = y(-c + dx - \gamma y) \end{cases}$$

con todas las constantes positivas.

Considerar los siguientes sistemas correspondientes a poblaciones de depredador–presa con crecimiento limitado

$$(a) \begin{cases} \dot{x} = x(2 - x - y) \\ \dot{y} = y(-1 + x - y) \end{cases} \quad (b) \begin{cases} \dot{x} = x(2 - 3x - y) \\ \dot{y} = y(-1 + x - y) \end{cases}$$

Para cada uno de estos sistemas, encontrar los puntos de equilibrio y esbozar el diagrama de fases alrededor de cada uno de ellos. Observar que el comportamiento depende fuertemente de los valores de los parámetros.

Dinámica en un campo de fuerzas conservativo.

Dado $V(x) \in C^2(\mathbb{R})$ consideremos la ecuación diferencial

$$\ddot{x} = -V'(x).$$

que toma la siguiente forma de sistema en el plano de fases

$$\begin{cases} \dot{x} = v \\ \dot{v} = -V'(x) \end{cases}$$

En mecánica $V(x)$ es el potencial y $-V'(x)$ es la fuerza.



13. Demostrar que la energía

$$H(x, v) = \frac{1}{2}v^2 + V(x)$$

es una constante del movimiento. El primer término es el de la energía cinética y el segundo, la potencial. Más aún, dado $V(x, y, z)$, si $(\ddot{x}, \ddot{y}, \ddot{z}) = -\nabla V|_{(x(t), y(t), z(t))}$ y $\mathbf{v} = (\dot{x}, \dot{y}, \dot{z})$, entonces $H(x, y, z, \mathbf{v}) = \frac{1}{2}\|\mathbf{v}\|^2 + V(x, y, z)$ es una constante del movimiento.

14. Considerar $V(x) = \frac{1}{2}kx^2$. Esbozar el diagrama de fases considerando diferentes niveles de la energía $H(x, v)$. Verificar que todas las trayectorias son acotadas. Utilizar la cantidad conservada obtenida en el punto anterior para obtener la posición máxima en función del dato inicial. Este potencial es el del oscilador armónico, es decir un resorte sin la acción de fuerzas externas.
15. $V(x) = \frac{1}{2}kx^2 - mgx$ es el potencial que da origen a la fuerza a la que está sometida una masa m que cuelga de un resorte con constante k (llamamos x a la posición aunque el movimiento se desarrolla en sentido vertical para no confundir con la variable y del plano de fases que representa la velocidad). Compare este caso con el del ejercicio anterior.
16. Considerar el potencial $V(x) = \frac{a}{x^2} - \frac{1}{x}$, con $x > 0$, $a > 0$. Esbozar el diagrama de fases considerando diferentes niveles de la energía. Describir cualitativamente el movimiento para valores iniciales tales que la energía sea positiva, negativa o nula. Se trata del movimiento radial (es decir, x representa la distancia al origen) de una partícula sometida a un campo gravitatorio, la cantidad $\frac{1}{x^2}$ suele interpretarse como un *potencial centrífugo*, y $V(x)$ es el *potencial eficaz*.
17. Considerar el potencial del punto anterior. Fijado x_0 obtener el valor mínimo de $|v_0|$ para el cual la trayectoria cuyo nivel de energía es $H(x_0, v_0)$ es no acotada. (La cantidad v_0 es la *velocidad de escape*.)

18. Hacer el bosquejo del diagrama de fases de los siguientes potenciales,



Dinámica de un campo gradiente

19. Sea $V(x, y) = ax^2 + by^2 + x^2y$, con $a, b \in \mathbb{R}$ no nulos. Consideremos el sistema $\dot{X} = -\nabla V(X)$, donde $X = (x, y)$.

- Verificar que el origen es un punto de equilibrio y clasificar su estabilidad en función de los parámetros a y b .
- Si a y b son no nulos, hallar los restantes puntos de equilibrio y analizar su estabilidad.
- Para una función $V(x)$ general, observar que los equilibrios son los puntos críticos de V . ¿De qué depende su estabilidad?

Campo central de fuerzas

20. Considerar el movimiento de una partícula en un campo de fuerzas central, ésto es, se considera la ecuación

$$m\ddot{x} = -\nabla V(x) \quad x \in \mathbb{R}^3/\{0\}$$

donde $V(x) = V_0(|x|)$ con $V_0 \in C^2((0, \infty), \mathbb{R})$.

- Probar que se conserva el momento angular, M , relativo al origen. Donde $M = x \times m\dot{x}$ (producto vectorial).
- Mostrar que todas las órbitas son planares (en el plano perpendicular a M).