


PRÁCTICA 4

INTEGRALES

1. Calcular

- $\int_{\gamma} \bar{z} dz$ para $\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{C}$ dada por $\gamma(t) = e^{it}$,
- $\int_{\gamma} |z|^2 z dz$ para la siguiente curva γ :




2. Sea $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ una curva. Notamos por $-\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ a la curva dada por $-\gamma(t) = \gamma(a + b - t)$. Probar que

$$\int_{-\gamma} f(z) dz = - \int_{\gamma} f(z) dz.$$

3. Sean $a, b \in \mathbb{C}$, $a \neq 0$ y sea $T : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $T(z) = az + b$. Dadas una curva γ y $c \notin \gamma$, probar que

$$\int_{T \circ \gamma} \frac{dz}{z - T(c)} = \int_{\gamma} \frac{dz}{z - c}.$$

4. Sea γ la curva:



Demostrar que

$$\left| \int_{\gamma} \frac{\operatorname{sen}(z)}{z^2} dz \right| \leq \pi \frac{1+e}{2}.$$


5. Sea $\gamma_r : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{C}$ dada por $\gamma_r(t) = re^{it}$. Probar que $\lim_{r \rightarrow +\infty} \int_{\gamma_r} \frac{e^{iz}}{z} dz = 0$.

6. Sea γ como en el ejercicio 4. Calcular $\int_{\gamma} \cos(z) dz$.

7. Sean $r \in \mathbb{R}_{>0}$, $a, b \in \mathbb{C}$ tales que $|b-a| \neq r$ y $\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{C}$ dada por $\gamma(t) = a + re^{it}$.

- Calcular $\int_{\gamma} (z-b)^n dz$ si n es un entero distinto de -1.

- Probar que si $|b - a| < r$, entonces $\int_{\gamma} \frac{dz}{z-b} = 2\pi i$.
 - Probar que si $|b - a| > r$, entonces $\int_{\gamma} \frac{dz}{z-b} = 0$.
8. Sea $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ un abierto y $f_n, f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$. Demostrar que si $f_n \xrightarrow{\text{unif}} f$ en una curva $\gamma \subseteq \Omega$ entonces $\int_{\gamma} f_n(z) dz \rightarrow \int_{\gamma} f(z) dz$.
9. Sea γ la curva cuya imagen es la elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ parametrizada por $\gamma(t) = a \cos t + ib \sin t$ con $0 \leq t \leq 2\pi$. Calcular $\int_{\gamma} \frac{dz}{z}$ y deducir que $\int_0^{2\pi} \frac{dt}{a^2 \cos^2 t + b^2 \sin^2 t} = \frac{2\pi}{ab}$.
10. Sea γ una curva y $w \in \mathbb{C}$ tal que $w \notin \gamma$. Notamos por $\eta(\gamma, w)$ al índice de la curva γ con respecto a w . Probar:
- $\eta(\gamma, w) = -\eta(-\gamma, w)$ donde $-\gamma$ se define como en el ejercicio 2.
 - $\eta(\gamma, w) = 0$ para todo $w \notin \{|z| \leq \max|\gamma|\}$.
 - $\eta(\gamma, w)$ es continua.
 - $\eta(\gamma, w)$ es constante como función de w en cada componente conexa de $\mathbb{C} \setminus \gamma$.
11. Encontrar todos los posibles valores de $\int_{\gamma} \frac{dz}{1+z^2}$, donde γ es una curva diferenciable simple cerrada que no pasa por $\pm i$.
12. Evaluar $\int_{\gamma} \frac{e^z}{z} dz$ siendo γ alguna de las siguientes curvas:



13. Sean $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ una curva diferenciable a trozos y $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ un abierto. Sea $\varphi : \text{Im}(\gamma) \times \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ una función continua y $g : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ definida por $g(z) = \int_{\gamma} \varphi(w, z) dw$. Probar que:
- a) g es continua.
 - b) Si para todo $w \in \text{Im}(\gamma)$, la función $\varphi(w, -) : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ es holomorfa y además $\frac{\partial \varphi(w, z)}{\partial z}$ resulta continua en w y z , entonces g es holomorfa y $g'(z) = \int_{\gamma} \frac{\partial \varphi(w, z)}{\partial z} dw$.
14. Sean $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ una curva diferenciable a trozos y sea $f : \text{Im}(\gamma) \rightarrow \mathbb{C}$ una función continua. Sea $g : \mathbb{C} \setminus \text{Im}(\gamma) \rightarrow \mathbb{C}$ la función $g(z) = \int_{\gamma} \frac{f(w)}{w-z} dw$. Probar que g es holomorfa y $g^{(n)}(z) = n! \int_{\gamma} \frac{f(w)}{(w-z)^{n+1}} dw$.
15. Calcular:
- $\int_{\gamma} \frac{e^z}{z-2} dz$, $\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{C}$ dada por $\gamma(t) = 4e^{it}$,

- $\int_{\gamma} \frac{z}{z+1} dz, \quad \gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{C}$ dada por $\gamma(t) = 1 + e^{ikt} \quad (k \in \mathbb{Z})$,
 - $\int_{\gamma} \frac{\operatorname{sen} z}{z^3} dz, \quad \gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{C}$ dada por $\gamma(t) = e^{it}$,
 - $\int_{\gamma} \frac{\log(1+z)}{(z-\frac{1}{2})^3} dz, \quad \gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{C}$ dada por $\gamma(t) = \frac{2}{3}e^{it}$,
 - $\int_{\gamma} \frac{\cos(\pi z)}{(z^2-1)^2} dz, \quad \gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{C}$ dada por $\gamma(t) = 1 + e^{ikt} \quad (k \in \mathbb{Z})$.
16. Sea $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ un abierto y $f_n, f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ tales que $f_n \xrightarrow{\text{unif}} f$ en K para todo compacto K de Ω (notar que f_n puede no tender uniformemente a f en Ω). Probar que si f_n es holomorfa en Ω para todo $n \in \mathbb{N}$, entonces f es holomorfa en Ω y $f'_n \xrightarrow{\text{unif}} f'$ en K para cada compacto K de Ω .
17. Probar que $f(z) = \int_0^{+\infty} e^{-zt^2} dt$ es una función holomorfa en $\operatorname{Re}(z) > 0$.
18. Probar que si $f(z)$ es continua en el disco cerrado $|z| \leq r$ y holomorfa en el disco abierto $|z| < r$, se tiene

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|w|=r} \frac{f(w)}{w-z} dw$$

para todo $|z| < r$.