

1. Sean $(X_n)_{n \geq 2}$ v. a. independientes $X_n \sim \varepsilon(1)$. Sea $Y_n = \frac{X_n}{\ln n}$.
- a) Probar que $Y_n \xrightarrow{P} 0$.
 - b) Probar que $\lim_{n \rightarrow \infty} P(\cup_{m=n}^{\infty} |Y_m| \geq \epsilon) = 1$. Deducir que $P(Y_n \rightarrow 0) = 0$.
 - c) Sean $(X_n)_{n \geq 1}$ v. a. independientes tal que $P(X_n = 1) = \frac{1}{n}$, $P(X_n = 0) = 1 - \frac{1}{n}$.
Entonces $X_n \xrightarrow{P} 0$, pero $P(X_n \rightarrow 0) = 0$.

2. Sean X_1, \dots, X_n v.a. independientes tales que $X_1 = 0$ y para $j \geq 2$

$$P(X_j = k) = \begin{cases} \frac{1}{j^3} & \text{si } k = \pm 1, \pm 2, \dots, \pm j \\ 1 - \frac{2}{j^2} & \text{si } k = 0 \end{cases}$$

Probar que

$$\sum_{j=1}^n \frac{X_j}{n^\alpha} \xrightarrow{P} 0 \quad \text{si } \alpha > \frac{1}{2}$$

Sugerencia: $\sum_{k=1}^j k^2 = \frac{j(j+1)(2j+1)}{6}$.

3. Sean X_1, \dots, X_n v.a. independientes tales que $X_n \sim \mathcal{U}[0, a_n]$, $a_n > 0$. Probar que:
- a) Si $a_n = n^2$ entonces con probabilidad 1 sólo un número finito de las X_n toma valores < 1 .
 - b) Si $a_n = n$ entonces con probabilidad 1 un número infinito de las X_n toma valores < 1 .
4. Se tira una moneda equilibrada infinitas veces en forma independiente. Consideremos una racha fija (s_1, \dots, s_k) donde cada $s_i \in \{c, s\}$; $1 \leq i \leq k$.
- a) ¿Cuál es la probabilidad de que la racha aparezca entre el tiro $n + 1$ y el $n + k$?
 - b) Mostrar que la probabilidad de que la racha aparezca infinitas veces es 1.
5. Se elige al azar un número en el intervalo $[0, 1]$.
- a) Encontrar la probabilidad de que la primera cifra decimal sea 2.
 - b) Encontrar la probabilidad de que la n -ésima cifra decimal sea 5 y la $(n + 1)$ -ésima sea 7.
 - c) Sea B el suceso: “el número 57 aparece infinitas veces en el desarrollo decimal”. Probar que $P(B) = 1$.
 - d) Sea A_n el suceso: “el 9 aparece n veces consecutivas en los $2n$ primeros lugares”. Calcular $P(A^\infty)$
con $A^\infty = \{A_n \text{ infinitas veces}\} = \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$.
 - e) ¿Cuál es la probabilidad de que sea racional?

Observación: Si un número admite dos desarrollos decimales se optará por el finito. Por ejemplo, se toma 0.745 y no 0.7449̂.

6. Una colección $\{X_\alpha\}_{\alpha \in A}$ de variables aleatorias se dice *acotada en probabilidad* (o *tight* que suele traducirse como *tensa* o *rígida*) si dado $\varepsilon > 0$ existe $K > 0$ tal que

$$P(|X_\alpha| > K) < \varepsilon \quad \forall \alpha \in A.$$

- a) Sea $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de variables aleatorias y X una v. a. tales que $X_n \xrightarrow{P} X$. Probar que $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ está acotada en probabilidad. Más aún, dado $\varepsilon > 0$ mostrar que existe un $K > 0$ tal que

$$P(|X_n| > K) < \varepsilon \quad \forall n \in \mathbb{N} \text{ y } P(|X| > K) < \varepsilon,$$

es decir que la colección $\{(X_n)_{n \in \mathbb{N}}, X\}$ está acotada en probabilidad.

- b) Probar que si $X_n \xrightarrow{P} 0$ e $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ está acotada en probabilidad, entonces $X_n Y_n \xrightarrow{P} 0$.

7. Sean $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ e $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dos sucesiones de v. a.

- a) Si $X_n \xrightarrow{P} X$ e $Y_n \xrightarrow{P} Y$ probar que $X_n + Y_n \xrightarrow{P} X + Y$ y que $X_n Y_n \xrightarrow{P} XY$.

- b) Si $|X_n| \leq c \quad \forall n$, probar que la condición necesaria y suficiente para que $X_n \xrightarrow{P} 0$ es que $\lim_{n \rightarrow \infty} E(|X_n|) = 0$. Exhibir un contraejemplo para la equivalencia anterior en el caso en que la sucesión $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ no sea acotada.

8. Sean $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ e $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dos sucesiones de v. a. y sean X e Y dos v. a.

- a) Si $X_n \xrightarrow{P} X$ y g es una función uniformemente continua, probar que $g(X_n) \xrightarrow{P} g(X)$.

- b) Ídem 8a para g continua.

Sugerencia: Usar 8a y el ejercicio 6.

- c) Si $X_n \xrightarrow{P} X$, $Y_n \xrightarrow{P} Y$ y g es una función continua, probar que $g(X_n, Y_n) \xrightarrow{P} g(X, Y)$.

- d) Si $X_n \xrightarrow{c.s.} X$, $Y_n \xrightarrow{c.s.} Y$ y g es una función continua, probar que $g(X_n, Y_n) \xrightarrow{c.s.} g(X, Y)$.

- e) Usando 7b probar que si $X_n \xrightarrow{P} c$ donde c es una constante y si f es una función acotada y continua en c , entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} E[f(X_n)] = f(c)$.

9. Sean f y g funciones continuas en $[0, 1]$ tales que $0 \leq f(x) \leq cg(x)$ donde c es una constante positiva y $\int_0^1 g(x) dx > 0$.

- a) Sean X_1, \dots, X_n las coordenadas de un punto P elegido al azar en el cubo $[0, 1]^n$ (es decir, con distribución uniforme). Sean $Y_n = \sum_{i=1}^n \frac{f(X_i)}{n}$ y $Z_n = \sum_{i=1}^n \frac{g(X_i)}{n}$. Verificar que:

$$Y_n \xrightarrow{P} \int_0^1 f(x) dx$$

$$Z_n \xrightarrow{P} \int_0^1 g(x) dx$$

- b) Probar que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \dots \int_0^1 \frac{f(x_1) + \dots + f(x_n)}{g(x_1) + \dots + g(x_n)} dx_1 \dots dx_n = \frac{\int_0^1 f(x) dx}{\int_0^1 g(x) dx}$$

Sugerencia: Usar el ejercicio 8e.

10. Un minorista recibe galletitas sin sal de 3 fábricas distintas siendo las cantidades recibidas medidas en kg. v.a. independientes X, Y, Z con distribuciones: $X \sim N(100, 20)$, $Y = 97 + W$ con $W \sim \varepsilon(\frac{1}{3})$ y $Z \sim \mathcal{U}[80, 90]$. Acotar inferiormente la probabilidad de que el total recibido se encuentre entre 275 y 295.

11. Una máquina produce rieles cuya longitud es una v.a. con distribución $\mathcal{U}[0, 8, 1, 2]$. Se eligen al azar n rieles en forma independiente y se forma el promedio \bar{X} de sus longitudes. Hallar n para que

$$P(0,99 < \bar{X} < 1,01) > 0,90.$$

12. Una máquina produce artículos de 3 clases: A, B y C en proporciones 25 %, 25 % y 50 % respectivamente. Las longitudes de los artículos A y B siguen distribuciones $\mathcal{U}[0, 1]$ y $\mathcal{U}[0, 2]$ respectivamente y las longitudes de los artículos C se distribuyen según la densidad $f(x) = \left(1 - \frac{x}{2}\right) I_{[0,2]}(x)$. Se eligen n artículos al azar de la producción total y se calcula el promedio de sus longitudes.
- a) Dar una cota inferior para la probabilidad de que el promedio de las longitudes esté comprendido entre $\frac{15}{24}$ y $\frac{19}{24}$ si el tamaño de la muestra es $n = 100$.
- b) ¿Cuál debe ser el tamaño de la muestra para que la probabilidad de que el promedio de las longitudes esté comprendido entre $\frac{15}{24}$ y $\frac{19}{24}$ sea mayor o igual que 0.90?
13. Sea p la probabilidad de que una persona elegida al azar apoye la legalización del consumo de marihuana (p es desconocida). Se toma una muestra de 50 personas elegidas al azar, se les pregunta si apoyan o no la legalización y se estima p a partir de la frecuencia relativa f_r que se define por

$$f_r = \frac{\text{N}^\circ \text{ de personas encuestadas que están a favor de la legalización}}{50}$$

Observar que f_r es una variable aleatoria, y p es un número. Cuánto más cerca esté f_r de p , mejor estimador será. Hallar una cota superior para $P(|f_r - p| > 0,1)$ que no dependa de p .

14. Sean $(X_n)_{n \geq 1}$ v.a. independientes con $P(X_n = n^\theta) = P(X_n = -n^\theta) = \frac{1}{2}$ y $\bar{X}_n = \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{n}$. Probar que si $0 < \theta < \frac{1}{2}$ entonces $\bar{X}_n \xrightarrow{P} 0$.
15. Sean $(X_n)_{n \geq 1}$ v.a.i.i.d., $X_i \sim \mathcal{U}[0, 1]$. Hallar el límite c.s. de Y_n donde $Y_n = \left(\prod_{i=1}^n X_i\right)^{1/n}$.
16. Sean $(X_n)_{n \geq 1}$ v.a.i.i.d., $E(X_1) = \text{var}(X_1) = 1$ y $E(X_1^4) < \infty$. Probar que entonces

$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{\left(n \sum_{i=1}^n X_i^2\right)^{1/2}} \xrightarrow{\text{c.s.}} \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

17. Sean $(X_n)_{n \geq 1}$ v.a. i.i.d., $E(|X_1|^2) < \infty$. Hallar

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E(X_1 | X_1 + \dots + X_n)$$

Sugerencia: Probar que $E(X_1 | X_1 + \dots + X_n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.