

Práctica 4: Diferenciación - Aplicaciones - Parte 1

Derivada de una curva - Recta tangente

1. Para cada una de las curvas dadas a continuación

(a) $\mathbf{r}(t) = (t - 2, t^2 + 1)$, $-2 \leq t \leq 2$, $t = 1$,

(b) $\mathbf{r}(t) = (\sin(t), 2 \cos(t))$, $0 \leq t \leq 2\pi$, $t = \frac{\pi}{4}$.

resolver los siguientes items:

i. Graficar.

ii. Calcular la derivada $\mathbf{r}'(t)$.

iii. Para el valor de t dado, graficar el vector posición $\mathbf{r}(t)$ y el vector tangente $\mathbf{r}'(t)$.

2. Para cada una de las siguientes curvas, hallar la ecuación paramétrica de la recta tangente en el punto dado. Graficar la curva y la recta tangente hallada.

(a) $x = 1 + 2\sqrt{t}$, $y = -t$, $0 \leq t \leq 9$, $(3, -1)$,

(b) $x = e^t$, $y = te^t$, $-2 \leq t \leq 3$, $(1, 0)$.

3. Para cada una de las siguientes curvas, encontrar el vector tangente unitario en el punto determinado por el valor de t indicado.

(a) $\mathbf{r}(t) = (te^{-t}, \tan(t), t^2 + t)$, $t = 0$,

(b) $\mathbf{r}(t) = (t^3 + 3t, t^2 + 1, 3t + 4)$, $t = 1$.

Derivadas parciales

4. Para cada una de las siguientes funciones, hallar las derivadas parciales f_x y f_y . Graficar f y, para el punto p indicado, ubicar $(p, f(p))$ y graficar $\nabla f(p)$.

(a) $f(x, y) = x^2y^3$, $p = (2, 1)$, (b) $f(x, y) = \frac{y}{1 + x^2y^2}$, $p = (1, 1)$.

5. Calcular las derivadas parciales de primer orden de las siguientes funciones.

(a) $f(x, y) = x^4 + 2xy + y^3x - 1$, (b) $f(x, y) = \sin(x)$,

(c) $f(x, y) = x^2 \sin^2(y)$, (d) $f(x, y) = xe^{x^2+y^2}$,

(e) $f(x, y, z) = ye^x + z$.

6. Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x, y) = |x| + |y|$.
- (a) Graficarla en GeoGebra y, a partir de la observación del gráfico, conjeturar sobre la existencia o no de $f_x(0, 0)$ y $f_y(0, 0)$.
- (b) Justificar analíticamente las conjeturas hechas en el ítem anterior.

7. Calcular las derivadas parciales de segundo orden de las siguientes funciones.

$$(a) f(x, y) = x^3y^5 + 2x^4y, \quad (b) f(x, y) = \sin^2(x + y),$$

$$(c) f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad (d) f(x, y) = \frac{xy}{x - y}.$$

8. Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3y - xy^3}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

- (a) Graficarla en GeoGebra.
- (b) Hallar $f_x(x, y)$ y $f_y(x, y)$ para $(x, y) \neq (0, 0)$.
- (c) Hallar $f_x(0, 0)$ y $f_y(0, 0)$.
- (d) Demostrar que $f_{xy}(0, 0) = -1$ y $f_{yx}(0, 0) = 1$. ¿Contradice esto al Teorema de Clairaut-Schwarz? ¿Por qué? (Sugerencia: graficar en GeoGebra f_{xy} y f_{yx}).

Plano tangente

9. Para cada una de las siguientes superficies, estudiar la existencia del plano tangente en el punto dado. En caso de que exista, dar la ecuación.

(a) $z = 3y^2 - 2x^2 + x$, $(2, -1, -3)$,

(b) $z = \sqrt{xy}$, $(1, 1, 1)$,

(c) $z = xe^{xy}$, $(2, 0, 2)$.

10. Graficar en GeoGebra la superficie $z = x^2 + xy + 3y^2$ y su plano tangente en $(1, 1, 5)$.

11. Estudiar la diferenciabilidad de las siguientes funciones en el punto dado.

(a) $f(x, y) = 1 + x \ln(xy - 5)$ en $(2, 3)$,

(b) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2y}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0), \end{cases}$ en $(0, 0)$

12. Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable tal que $f(2, 5) = 6$, $f_x(2, 5) = 1$ y $f_y(2, 5) = -1$. Estimar el valor de $f(2.2, 4.9)$.

13. Estudiar la continuidad, existencia de derivadas parciales y diferenciabilidad de las siguientes funciones en el origen. En caso de que exista, dar la ecuación del plano tangente al gráfico de f en el origen.

$$(a) f(x, y, z) = \sqrt{|xyz|},$$

$$(b) f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^4 - y^4}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

$$(c) f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2}{x^2 + y^2} \sin\left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right) & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Regla de la cadena

14. Utilizar la regla de la cadena para calcular la derivada de la composición $f \circ \mathbf{r}$ en cada uno de los siguientes casos.

$$(a) f(x, y) = x^2 + y^2 + xy, \mathbf{r}(t) = (\sin t, e^t),$$

$$(b) f(x, y) = \cos(x + 4y), \mathbf{r}(t) = (5t^4, 1/t),$$

$$(c) f(x, y) = \sqrt{1 + x^2 + y^2}, \mathbf{r}(t) = (\ln t, \cos t).$$

15. Si $z = f(x, y)$, $x = g(t)$, $y = h(t)$ y se sabe que

$$g(3) = 2, \quad h(3) = 7,$$

$$g'(3) = 5, \quad h'(3) = -4,$$

$$f_x(2, 7) = 6, \quad f_y(2, 7) = -8.$$

Determinar dz/dt cuando $t = 3$.

16. Utilizar la regla de la cadena para calcular $\partial z/\partial s$ y $\partial z/\partial t$ en cada uno de los siguientes casos.

$$(a) z = x^2 y^3, x = s \cos(t), y = s \sin(t),$$

$$(b) z = \sin(x) \cos(y), x = st^2, y = s^2 t,$$

$$(c) z = e^{x+2y}, x = s/t, y = t/s.$$

17. Utilizando un diagrama de árbol, escribir la regla de la cadena para las derivadas parciales indicadas. Suponer que todas las funciones son diferenciables.

$$(a) z = f(x, y), x = x(r, s, t), y = y(r, s, t), \frac{\partial z}{\partial r}, \frac{\partial z}{\partial s}, \frac{\partial z}{\partial t},$$

$$(b) w = f(x, y, z), x = x(r, s), y = y(r, s), z = z(r, s), \frac{\partial w}{\partial r}, \frac{\partial w}{\partial s}.$$

18. Utilizar la regla de la cadena para calcular las derivadas parciales indicadas en el punto dado en cada uno de los siguientes casos.

(a) $z = x^4 + x^2y$, $x = s + 2t - u$, $y = stu^2$, $\frac{\partial z}{\partial s}$, $\frac{\partial z}{\partial t}$, $\frac{\partial z}{\partial u}$ en $(s, t, u) = (4, 2, 1)$,

(b) $w = xy + yz + zx$, $x = r \cos(\theta)$, $y = r \sin(\theta)$, $z = r\theta$, $\frac{\partial w}{\partial r}$, $\frac{\partial w}{\partial \theta}$ en $(r, \theta) = (2, \frac{\pi}{2})$.

19. Sea $T(x, y)$ la temperatura (en grado celsius) en un punto (x, y) . Un insecto se arrastra de tal modo que su posición después de t segundos está dada por $x = \sqrt{1+t}$, $y = 2 + \frac{1}{3}t$, donde x e y se miden en centímetros. La función temperatura satisface $T_x(2, 3) = 4$ y $T_y(2, 3) = 3$. ¿Qué tan rápido se eleva la temperatura del insecto en su trayectoria después de 3 segundos?

20. Sea $z = f(x - y)$ con $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función derivable. Demostrar que

$$\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = 0.$$

21. Sean $z = f(x, y)$ con f una función C^2 , $x = r^2 + s^2$ e $y = 2rs$. Determinar $\partial^2 z / \partial r \partial s$ en función de las derivadas parciales de f .

22. Calcular la matriz diferencial $DF(x, y)$ para cada una de las siguientes funciones $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$.

(a) $F(x, y) = (x^3y^5, 2x^4y)$

(b) $F(x, y) = (\sin^2(x + y), e^{2x+y})$

23. Este ejercicio guiado propone incorporar una interpretación geométrica de la matriz diferencial DF para funciones $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$.

Considerar la función $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida como

$$F(r, \theta) = (r \cos(\theta), r \sin(\theta)) = (x(r, \theta), y(r, \theta))$$

- (a) Dibujar la región rectangular $R = \{(r, \theta) : 2 \leq r \leq 3, \frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{8}\}$ en el plano (r, θ) y dibujar la región transformada $F(R)$ en el plano (x, y) . Sugerencia: transformar los puntos de los lados de la región rectangular R (notar que $F(R)$ no es un paralelogramo).
- (b) Calcular la matriz diferencial de $DF(r, \theta)$ para todo punto $(r, \theta) \in \mathbb{R}^2$.
- (c) Considerar la transformación lineal dada por la matriz $A = DF(2, \frac{\pi}{4})$ y los vectores $v_1 = (1, 0)$ y $v_2 = (0, \frac{\pi}{8})$. Llamamos \tilde{R} al rectángulo generado por v_1 y v_2 en el plano (r, θ) . Calcular $w_1 = Av_1$, $w_2 = Av_2$ y dibujar el paralelogramo generado por w_1 y w_2 en el plano (x, y) . Esto es $A(\tilde{R})$.
- (d) Dibujar la región $F(2, \frac{\pi}{4}) + A(\tilde{R})$. Observar que la matriz diferencial da una aproximación lineal de la transformación F cerca del punto $(2, \frac{\pi}{4})$. Dibujar con GeoGebra.

- (d) Implementar en GeoGebra usando sliders una versión general de este ejercicio para un rectángulo inicial arbitrario de la forma $R = \{(r, \theta) : 0 \leq r_0 \leq r \leq r_1, 0 \leq \theta_0 \leq \theta \leq \theta_1\}$ en el plano (r, θ) .
24. Sean $F(x, y) = (x^2 + y, y^2 - x)$, $G(x, y) = (y, -x)$. Calcular $D(G \circ F)_{(1, -1)}$ y mostrar que es igual al producto de las matrices $DG_{(0,0)}$ $DF_{(1, -1)}$.
25. Si $f(x) = x + e^x$, mostrar que f es estrictamente creciente y calcular $(f^{-1})'(1)$.
26. Sea $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ biyectiva, de clase C^1 con inversa C^1 . Sabiendo que $F(0, 0) = (1, 3)$, y que

$$DF_{(0,0)} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

calcular $(DF^{-1})_{(1,3)}$, la matriz diferencial de la función inversa en $(1, 3)$.