

ANÁLISIS II – ANÁLISIS MATEMÁTICO II – MATEMÁTICA 3

Primer Cuatrimestre 2025

Práctica 3: Teorema de Green.

Ejercicio 1. Verificar el Teorema de Green para el disco D con centro $(0, 0)$ y radio R y las siguientes funciones:

- (a) $P(x, y) = xy^2, \quad Q(x, y) = -yx^2.$
- (b) $P(x, y) = 2y, \quad Q(x, y) = x.$

Ejercicio 2. Verificar el Teorema de Green y calcular $\int_{\mathcal{C}} y^2 dx + x dy$, siendo \mathcal{C} la curva recorrida en sentido positivo:

- (a) Cuadrado con vértices $(0, 0), (2, 0), (2, 2), (0, 2).$
- (b) Elipse dada por $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$
- (c) $\mathcal{C} = \mathcal{C}_1 \cup \mathcal{C}_2$, donde $\mathcal{C}_1 : y = x, x \in [0, 1]$, y $\mathcal{C}_2 : y = x^2, x \in [0, 1].$

Ejercicio 3. Usando el teorema de Green, hallar el área de:

- (a) El disco D con centro $(0, 0)$ y radio R
- (b) La región dentro de la elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$

Ejercicio 4. Sea D la región encerrada por el eje x y el arco de cicloide:

$$x = \theta - \sin \theta, \quad y = 1 - \cos \theta, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

Usando el teorema de Green, calcular el área de D .

Ejercicio 5. Hallar el área entre las curvas dadas en polares por

$$\begin{aligned} r = 1 + \cos \theta & \quad \text{con} \quad -\pi \leq \theta \leq \pi, \\ r = \sqrt{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta} & \quad \text{con} \quad -\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

Ejercicio 6. Probar la fórmula de integración por partes: Si $D \subset \mathbb{R}^2$ es un dominio elemental, ∂D su frontera orientada en sentido antihorario y $\mathbf{n} = (n_1, n_2)$ la normal exterior a D , entonces

$$\iint_D u v_x dx dy = - \iint_D u_x v dx dy + \int_{\partial D} u v n_1 ds,$$

para todo par de funciones $u, v \in C(\bar{D}) \cap C^1(D).$

Ejercicio 7. Sean P y Q funciones continuamente diferenciables en \mathbb{R}^2 . Verificar que el Teorema de Green para estas funciones es válido cuando la región D es el anillo

$$D = \{(x, y) / 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}.$$

Sugerencia: Aplicar el Teorema de Green en los discos de radios 1 y 2.

Ejercicio 8. Sea \mathcal{C} la curva

$$\begin{aligned} x = 0, & \quad 0 \leq y \leq 4, \\ y = 4, & \quad 0 \leq x \leq 4, \\ y = x, & \quad 0 \leq x \leq 1, \\ y = 2 - x, & \quad 1 \leq x \leq 2, \\ y = x - 2, & \quad 2 \leq x \leq 3, \\ y = 4 - x, & \quad 2 \leq x \leq 3, \\ y = x, & \quad 2 \leq x \leq 4, \end{aligned}$$

orientada positivamente. Calcular

$$\int_{\mathcal{C}} \frac{y}{(x-1)^2 + y^2} dx + \frac{1-x}{(x-1)^2 + y^2} dy.$$

Ejercicio 9. Sea $D = \{(x, y) / 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0\}$. Calcular

$$\int_{\partial D} x^2 y dx - x y^2 dy.$$

Como siempre, ∂D está recorrido en sentido directo (el contrario a las agujas del reloj).

Ejercicio 10. Calcular el trabajo efectuado por el campo de fuerzas $F(x, y) = (y + 3x, 2y - x)$ al mover una partícula rodeando una vez la elipse $4x^2 + y^2 = 4$ en el sentido de las agujas del reloj.

Ejercicio 11. Sea $\mathbf{F}(x, y) = (P(x, y), Q(x, y)) = \left(\frac{y}{x^2+y^2}, \frac{-x}{x^2+y^2}\right)$. Calcular $\int_{\mathcal{C}} \mathbf{F} \cdot ds$ donde \mathcal{C} es la circunferencia unitaria centrada en el origen orientada positivamente. Calcular $Q_x - P_y$. ¿Se satisface en este caso el Teorema de Green?

Ejercicio 12. Sea \mathcal{C} una curva cerrada, simple y suave orientada positivamente que encierra la circunferencia unitaria centrada en el origen. Calcular $\int_{\mathcal{C}} \mathbf{F} \cdot ds$ para el campo \mathbf{F} definido en el ejercicio 11.

Ejercicio 13. Calcular $\int_{\mathcal{C}} f_1 dx + f_2 dy$ siendo

$$f_1(x, y) = \frac{x \operatorname{sen} \left(\frac{\pi}{2(x^2+y^2)} \right) - y(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)^2},$$

$$f_2(x, y) = \frac{y \operatorname{sen} \left(\frac{\pi}{2(x^2+y^2)} \right) + x(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)^2},$$

y

$$\mathcal{C} = \begin{cases} y = x + 1 & \text{si } -1 \leq x \leq 0, \\ y = 1 - x & \text{si } 0 \leq x \leq 1, \end{cases}$$

recorrida del $(-1, 0)$ al $(1, 0)$.

Ejercicio 14. Determinar todas las circunferencias \mathcal{C} en el plano \mathbb{R}^2 sobre las cuales vale la siguiente igualdad

$$\int_{\mathcal{C}} -y^2 dx + 3x dy = 6\pi.$$

Ejercicio 15. Calcular la integral $\int_{\mathcal{C}} \mathbf{F} \cdot ds$ donde

$$\mathbf{F}(x, y) = (y^2 e^x + \cos x + (x - y)^2, 2y e^x + \operatorname{sen} y),$$

y \mathcal{C} es la curva

$$x^2 + y^2 = 1, \quad y \geq 0,$$

orientada de manera tal que comience en $(1, 0)$ y termine en $(-1, 0)$.

Ejercicio 16. Sean $u, v \in C^1(D)$, donde $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} \leq 1\}$. Consideremos los campos definidos por $\mathbf{F}(x, y) = (u(x, y), v(x, y))$, $\mathbf{G}(x, y) = (v_x - v_y, u_x - u_y)$. Calcular

$$\iint_D (\mathbf{F} \cdot \mathbf{G})(x, y) dx dy$$

sabiendo que sobre el borde de D se tiene $u(x, y) = x$, $v(x, y) = 1$.