

## PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA (C)

### PRÁCTICA 3

1. Sea  $X$  una v.a. con función de densidad

$$f_X(x) = \begin{cases} 0,75(1-x^2) & -1 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

- Verificar que  $f_X$  es realmente una función de densidad.
- Calcular:

$$P(X > 0) \quad P(-0,5 < X < 0,5) \quad P(|X| > 0,25)$$

- Hallar  $F_X$ , la función de distribución acumulada de  $X$ .
- Graficar  $f_X$  y  $F_X$ .

2. Sea  $X$  una v.a. continua con función de distribución

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \frac{x^3}{\theta} & \text{si } 0 \leq x < 2 \\ 1 & \text{si } 2 \leq x \end{cases}$$

- ¿Cuál es el valor de  $\theta$ ?
- Calcular, usando  $F_X(x)$ ,

$$P(X \leq 1) \quad P(0,5 \leq X \leq 1) \quad P(0,5 < X \leq 1 | X < 1)$$

- Hallar la mediana  $\tilde{\mu}$  de esta distribución.
- Encontrar la función de densidad  $f_X(x)$ .
- Graficar  $f_X$  y  $F_X$ . Agregar la recta vertical  $x = \tilde{\mu}$ .

3. Sea  $U$  una v.a. con distribución  $\mathcal{U}[0, \theta]$ , para  $\theta > 0$ .

- Hallar la función de distribución acumulada de  $U$ .
- Si  $P(1 \leq U \leq 3) = 0,5$ , ¿qué valores puede tomar  $\theta$ ?
- Para  $\theta$  hallados en el ítem b) estimar la  $P(U^2 < 2)$ .

4. Consideremos una v.a.  $Y$  con función de densidad

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{25}y & 0 \leq y < 5 \\ \frac{2}{5} - \frac{1}{25}y & 5 \leq y < 10 \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

- a) Calcular la función de distribución de  $Y$ .
- b) Calcular  $E(Y)$  y  $V(Y)$ .
- c) Calcular  $E(1/Y)$ . ¿Qué conclusión saca respecto a la relación entre  $E(1/Y)$  y  $1/E(Y)$ .
5. Se eligen  $n$  puntos al azar en el intervalo  $[0, 1]$  de forma independiente (con distribución uniforme). Sea  $X =$  Cantidad de puntos que caen en el intervalo  $[0, p]$  ( $0 < p < 1$ ). ¿Qué distribución tiene  $X$ ?
6. Sea  $Z$  una v.a. con distribución  $N(0, 1)$ . Calcular:
- a)  $P(0 \leq Z \leq 2)$
- b)  $P(|Z| \leq 2,5)$
- c)  $P(Z \geq -1,37)$
- d)  $c$  tal que  $P(Z < c) = 0,98$
- e)  $c$  tal que  $P(|Z| \leq c) = 0,90$
- f) el valor  $z_\alpha$  para  $\alpha = 0,1, 0,05, 0,025, 0,01$ , donde  $z_\alpha$  se define como el valor tal que  $P(Z > z_\alpha) = \alpha$
7. Sea  $X$  una v.a. con distribución  $N(5, 0,25)$ . Calcular:
- a)  $P(4,75 \leq X \leq 5,50)$
- b)  $P(|X| > 5,25)$
- c)  $c$  tal que  $P(|X - 5| \leq c) = 0,90$
- d) el 90-percentil de  $X$ .
8. Se supone que en cierta población humana, el índice cefálico  $I$  (anchura del cráneo expresada como porcentaje de la longitud) es una v.a. con distribución  $N(\mu, \sigma^2)$ . Si hay un 58 % de individuos con  $I \leq 75$ , un 38 % con  $75 < I \leq 80$  y un 4 % con  $I \geq 80$ , hallar la función de densidad de  $I$  y calcular  $P(78 \leq I \leq 82)$ .
9. La distancia intercuartil (IQR) de una v.a. se define como la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil. Hallar la IQR de  $Z$ , una v.a. con distribución  $N(0, 1)$ .
10. (\*) La mediana de desviaciones absolutas (MAD) de una v.a. se define como la mediana del valor absoluto de la diferencia entre la variable aleatoria y su mediana. Hallar la MAD de  $Z$ , una v.a. con distribución  $N(0, 1)$ . *Sugerencia:* Hallar la f.d.a de  $|Z|$ .
11. La biblioteca de una facultad dispone de una red de computadoras al alcance de los estudiantes. La proporción de tiempo que un usuario destina a búsqueda bibliográfica es una variable aleatoria  $T$  con función de densidad

$$f_T(t) = c(100 - t) I_{[0,100]}(t)$$

- a) Hallar el valor de la constante  $c$

- b) Supóngase que de acuerdo con el porcentaje de tiempo destinado a las búsqueda bibliográfica el usuario es clasificado en distintas categorías. La clasificación se realiza de la siguiente manera: si  $T < 25\%$  el usuario es de tipo 1, si  $25\% \leq T < 50\%$  el usuario es tipo 2, si  $50\% \leq T < 75\%$  el usuario es tipo 3 y si  $T > 75\%$ , el usuario es de tipo es 4. Hallar la distribución del tipo de usuario.
12. El diámetro  $D$  (expresado en dm) del tronco de cierta especie de árboles es una variable aleatoria con función de densidad

$$f_D(x) = k x I_{(0,10)}(x).$$

- a) Hallar el valor de la constante  $k$ .
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que el diámetro de un árbol de esa especie elegido al azar mida entre 4 y 6 dm?
- c) Idem b) sabiendo que el diámetro mide más de 5 dm.
- d) En un área del bosque hay 3 árboles de esa especie. Calcular la probabilidad de que exactamente 2 de ellos tengan el diámetro entre 4 y 6 dm.
- e) ¿Cuántos árboles habría que muestrear en el bosque para que la probabilidad de encontrar al menos uno cuyo diámetro mida entre 4 y 6 dm, sea mayor o igual que 0.99?
13. Una muestra de tabaco puede provenir de dos variedades distintas, I y II, con probabilidades 0.35 y 0.65 respectivamente. El contenido de nicotina es una v.a., cuya distribución es  $N(1,9, 0,16)$  en la variedad I y  $N(2,2, 0,09)$  en la variedad II.
- a) Hallar la probabilidad de que en una muestra elegida al azar el contenido de nicotina sea mayor o igual que 2.1.
- b) Hallar la probabilidad de que dado que el contenido de nicotina es mayor que 2.1, la muestra provenga de la variedad I.

14. La porción de memoria ocupada en un servidor de un sistema de terminales en red es una variable aleatoria continua  $X$  que toma valores entre 0 (sin carga) y 1 (carga completa). La densidad de  $X$  está dada por

$$f_X(x) = 4x^3 \quad \text{si } 0 < x < 1$$

- a) Halle la mediana de la porción ocupada de memoria.
- b) Deduzca la densidad de la variable que mide la porción de memoria que falta ocupar, es decir  $Z = 1 - X$ .
15. El tiempo de caída de un sistema se define como la fracción de tiempo que el sistema no está operativo debido a una falla del hardware o del software. Supongamos que  $T =$  tiempo de caída de un sistema en horas es una variable aleatoria con función de densidad dada por

$$te^{-\frac{t^2}{2}} \quad I_{(0,\infty)}(x)$$

- a) Deduzca la función de distribución acumulada de  $T$ .
- b) Cuando el sistema está caído por más de una hora, todos los archivos de trabajo abiertos en el momento de la caída se pierden. Si un usuario está trabajando en un archivo mientras el sistema cae, ¿cuál es la probabilidad de que el archivo no se pierda?
- c) Supongamos que al caer el sistema, el tiempo que tarda un usuario en recuperar su trabajo es una función creciente del tiempo de caída, digamos  $T^2$ . Deduzca la función de densidad de  $T^2$
16. La vida útil (en meses) de un componente electrónico es una v.a.  $V$  con distribución  $\mathcal{E}(\lambda)$ , tal que  $P(V > 20) = 0,449$ .
- a) Hallar  $E(V)$  y  $Var(V)$ .
- b) Hallar la probabilidad de que la vida útil de uno de estos componentes sea mayor que 10 meses.
- c) Si se sabe que uno de estos componentes dura más de 20 meses, ¿cuál es la probabilidad de que dure más de 30 meses? Comparar con (b).
- d) Si se sabe que uno de estos componentes dura más de  $t$  meses, ¿cuál es la probabilidad de que dure más de  $t + s$  meses ( $t > 0, s > 0$ )?
17. Las tareas llegan a una cola de un sistema de computación con un solo servidor de acuerdo con un proceso de Poisson de parámetro  $\lambda = 4$  tareas por minuto. Llamemos a dicho proceso  $X_t$ . Sea  $T$  el tiempo de espera hasta que llegue la primera tarea medido en minutos. Calcule la probabilidad de que a lo sumo haya que esperar 15 segundos hasta que arribe la primera tarea.
18. Un sistema consta de 5 componentes electrónicos como los del Ejercicio 16, conectados en serie. Al fallar uno cualquiera de éstos, automáticamente se desconecta el sistema. Se supone que los tiempos de vida de los componentes son independientes. Es decir, si se definen los eventos

$$A_i = \{\text{el } i\text{-ésimo componente dura por lo menos hasta el instante } t\},$$

con  $i = 1, \dots, 5$ , estos eventos son independientes.

Sea  $X$  el momento en el cual el sistema se desconecta.

- a) Escribir el evento  $\{X \geq t\}$  en función de los  $A_i$ .
- b) Usar la independencia de los  $A_i$  para calcular  $P(X \geq t)$ .
- c) Hallar las funciones de distribución y de densidad de  $X$ . ¿A qué familia pertenece esta distribución?
19. Un programa tiene tres bloques. El tiempo de compilación en segundos de cada bloque es una variables aleatoria exponencial  $\lambda = 1$  y es independiente del tiempo de compilación de los otros bloques.

- a) Calcule la probabilidad de que alguno de los tres bloques tenga un tiempo de compilación superior a los 2 segundos.
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente dos bloques tengan un tiempo de compilación superior a los 2 segundos?

20. Sea  $X$  una v.a. con función de densidad  $\Gamma(\alpha, \lambda)$ :

$$f(x; \alpha, \lambda) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x} I_{[0, \infty)}(x), \quad \text{con } \alpha > 0, \lambda > 0.$$

- a) Hallar  $E(X)$  y  $V(X)$ .  
(NOTA: Usar que  $\Gamma(\alpha) = (\alpha - 1)\Gamma(\alpha - 1)$  para  $\alpha > 0$ .)
- b) Probar que si  $X \sim \Gamma(\alpha, \lambda)$  y  $c > 0$  entonces  $cX \sim \Gamma(\alpha, \lambda/c)$ .

21. Sea  $X$  una v.a. con distribución  $U(0, 1)$ . Hallar las funciones de distribución y de densidad de las siguientes variables aleatorias.

- a)  $cX + d$
- b)  $X^\alpha$ , para  $\alpha = 2$  y  $\alpha = 3$
- c)  $\ln X$
- d)  $-\frac{1}{\lambda} \ln(1 - X)$ , siendo  $\lambda > 0$ .

22. Sea  $Z$  una v.a. con distribución normal standard. Pruebe que  $Z^2 \sim \Gamma(1/2, 1/2)$ . (Esta variable aleatoria recibe el nombre de  $\chi^2$  con un grado de libertad).

(NOTA:  $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$ .)

23. (\*) Sea  $X$  una v.a. con función de distribución  $\mathcal{E}(2)$ . Se define  $Y = [X] + 1$  (donde  $[\cdot]$  es la parte entera). Probar que  $Y \sim \mathcal{G}(1 - e^{-2})$ .