

ANÁLISIS COMPLEJO

Práctica N°1: Números Complejos.

1. Expresar los siguientes números complejos en la forma $a + ib$, con $a, b \in \mathbb{R}$:

- (a) $(i + 1)(i - 1)(i + 3)$, (d) $\frac{1+i}{i}$, (g) $(1 + i)^{65} + (1 - i)^{65}$.
(b) $(3 - 2i)^2$, (e) $2 + i2 - i$,
(c) $\frac{1}{-1+3i}$, (f) $(1 + i)^{100}$,

2. Sean z y w dos números complejos. Demostrar que:

- (a) $\bar{z} = z$ si y solo si $z \in \mathbb{R}$, (d) $\operatorname{Re}(z) = \frac{z+\bar{z}}{2}$,
(b) $\overline{z+w} = \bar{z} + \bar{w}$, (e) $\operatorname{Im}(z) = \frac{z-\bar{z}}{2i}$.
(c) $\overline{zw} = \bar{z} \bar{w}$,

3. Probar que si $z_0 \in \mathbb{C}$ es raíz de $a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_0 = 0$, entonces $\bar{z}_0 \in \mathbb{C}$ es raíz de $\bar{a}_n X^n + \bar{a}_{n-1} X^{n-1} + \dots + \bar{a}_0 = 0$. Deducir que si $P(X)$ es un polinomio con coeficientes reales y $z_0 \in \mathbb{C}$ es raíz de $P(X)$, entonces $\bar{z}_0 \in \mathbb{C}$ también lo es.

4. Hallar todas las soluciones en \mathbb{C} de la ecuación $iz^2 + (3 - i)z - (1 + 2i) = 0$.

5. Para $z \in \mathbb{C}$, se define $|z| = \sqrt{z\bar{z}}$. Probar que:

- (a) Si $z = a + bi$, $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$,
(b) $|zw| = |z||w|$ y si $w \neq 0$, $\left|\frac{z}{w}\right| = \frac{|z|}{|w|}$,
(c) $-|z| \leq \operatorname{Re}(z) \leq |z|$ y $-|z| \leq \operatorname{Im}(z) \leq |z|$,
(d) $|z+w|^2 = |z|^2 + |w|^2 + 2\operatorname{Re}(z \cdot \bar{w})$ y $|z-w|^2 = |z|^2 + |w|^2 - 2\operatorname{Re}(z \cdot \bar{w})$,
(e) $|z+w|^2 + |z-w|^2 = 2(|z|^2 + |w|^2)$,
(f) $|z+w| \leq |z| + |w|$ y $|z-w| \geq ||z| - |w||$.

Interpretar geoméricamente la propiedad (e), también conocida como “Ley del paralelogramo”.

6. Probar que $d : \mathbb{C} \times \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $d(z, w) = |z - w|$ es una métrica.

7. Sea $\alpha = a + bi \in \mathbb{C}$ y $c > 0$. Para $z = x + iy$, transformar la condición $|z - \alpha| = c$ en una ecuación que involucre solo a x, y, a, b y c ; describir qué figura geométrica representa esta ecuación.

8. Describir geoméricamente los siguientes subconjuntos de \mathbb{C} :

- (a) $|z - i + 3| = 5$, (c) $\operatorname{Re}(2z + 3) \geq 0$,
 (b) $|z - i + 3| \leq 5$, (d) $\operatorname{Re}((1 + 2i)z) \geq 0$.

9. **Definición:** Para $z \in \mathbb{C}$, $z = a + bi$, se define $e^z = e^a \cdot (\cos b + i \operatorname{sen} b)$.

- (a) Demostrar que para todo $z, w \in \mathbb{C}$, $e^{w+z} = e^w e^z$.
 (b) Describir los z tales que $e^z = 1$.
 (c) Demostrar que si $e^z = e^w$, entonces existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $z = w + 2k\pi i$.
 (d) Probar que para todo $z \in \mathbb{C}$, $e^{\bar{z}} = \overline{e^z}$.

10. (a) Pasar de la forma $a + ib$ a la forma polar:

- i. $1 + i$, ii. $-5i$, iii. -3 .

(b) Pasar de la forma polar a la forma $a + ib$:

- i. $3e^{i\frac{\pi}{4}}$, ii. $e^{-i\pi}$, iii. $\pi e^{-i\frac{\pi}{3}}$.

11. (a) Para $n = 2, 3, 4, 5$, dibujar todos los números complejos z tales que $z^n = 1$.

(b) Sea $n \in \mathbb{N}$ y $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Mostrar que hay n números complejos distintos tales que $z^n = \alpha$.

12. Sea $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $f(z) = e^z$.

- (a) Hallar la imagen por f del conjunto $\{z \in \mathbb{C} \mid 0 \leq \operatorname{Im}(z) < 2\pi\}$.
 (b) Hallar la imagen por f del primer cuadrante.
 (c) Mostrar que la imagen de la recta $\{t + it \mid t \in \mathbb{R}\}$ es una espiral.

13. (a) Sea $\theta \in \mathbb{R}$. Mostrar que $\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$ y $\operatorname{sen} \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$.

(b) Generalizando las igualdades del ítem anterior, se define para $z \in \mathbb{C}$,

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} \quad \text{y} \quad \operatorname{sen} z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}.$$

Comprobar que para todo $z \in \mathbb{C}$,

$$\cos^2(z) + \operatorname{sen}^2(z) = 1 \quad \text{y} \quad e^{iz} = \cos z + i \operatorname{sen} z.$$

- (c) Mostrar que $\operatorname{sen} z$ y $\cos z$ tienen período 2π .
 (d) Mostrar que los únicos valores de z para los cuales $\cos z = 0$ y $\operatorname{sen} z = 0$ son los valores reales usuales.
 (e) Probar que para todo $z \in \mathbb{C}$, $\cos(\bar{z}) = \overline{\cos(z)}$ y $\operatorname{sen}(\bar{z}) = \overline{\operatorname{sen}(z)}$

14. Hallar todos los $z \in \mathbb{C}$ tales que $\cos z \in \mathbb{R}$ y los $z \in \mathbb{C}$ tales que $\operatorname{sen} z \in \mathbb{R}$.

15. (a) Probar que $\cos z$ y $\operatorname{sen} z$ son funciones suryectivas de \mathbb{C} en \mathbb{C} .

(b) Hallar todas las soluciones de la ecuación $\cos z = \frac{5}{4}$.

16. Sean $a, b, b' \in \mathbb{R}$. Probar que si $|b| < |b'|$, entonces $|\cos(a+bi)| < |\cos(a+b'i)|$ y $|\sen(a+bi)| < |\sen(a+b'i)|$.
17. Sea $z \neq 1$. Probar que $1 + z + \dots + z^n = \frac{z^{n+1}-1}{z-1}$. Para $0 < \theta < 2\pi$, dar una fórmula para la suma $1 + \cos \theta + \dots + \cos n\theta$.
18. Demostrar que para todo par de números reales positivos a, b , vale que

$$\arctan\left(\frac{1}{a+b}\right) + \arctan\left(\frac{b}{a^2+ab+1}\right) = \arctan\left(\frac{1}{a}\right).$$

Sucesiones

19. (a) Probar que si $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z$ entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} |z_n| = |z|$.
 (b) Dar un ejemplo donde no valga la recíproca.
20. (a) Sea $\alpha \in \mathbb{C}$, $|\alpha| < 1$. ¿Cuánto vale $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha^n$? Repetir para $|\alpha| > 1$.
 (b) Si $|\alpha| < 1$, probar que $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \alpha + \dots + \alpha^n) = \frac{1}{1-\alpha}$.
21. Calcular, en caso de que existan, los límites de las siguientes sucesiones:
- (a) $\frac{1}{n} \left(\frac{1+i}{2}\right)^n$, (c) $\cos(n\pi) + i \frac{\sen(\frac{n}{2})}{n^2}$, (e) ni^{2n+1} .
 (b) $n \left(\frac{1+i}{2}\right)^n$, (d) $\left(\frac{(-1)^n+1}{3}\right)^n$.
22. Se define el *conjunto de Mandelbrot* como el conjunto \mathcal{M} de los números complejos c tales que la sucesión definida de manera recursiva del siguiente modo:

$$z_0 = c, \quad z_{n+1} = z_n^2 + c,$$

resulta acotada. Demostrar que $\mathcal{M} \subset \{|z| \leq 2\}$.