

MATEMATICA 2

Práctica 1 - Espacios vectoriales

A lo largo de esta práctica, K simbolizará el conjunto de los números reales o el conjunto de los números complejos, indistintamente.

Ejercicio 1. Probar en cada caso que el conjunto V , con la suma y el producto por escalares definidos, es un espacio vectorial sobre K :

i) $V = K^{\mathbb{N}} = \{(a_i)_{i \in \mathbb{N}} = (a_1, a_2, \dots, a_n, \dots) / a_i \in K \forall i \in \mathbb{N}\}$, el conjunto de todas las sucesiones de elementos de K .

$$+ : (a_i)_{i \in \mathbb{N}} + (b_i)_{i \in \mathbb{N}} = (a_i + b_i)_{i \in \mathbb{N}}$$

$$\cdot : k \cdot (a_i)_{i \in \mathbb{N}} = (k \cdot a_i)_{i \in \mathbb{N}}$$

ii) Dado X un conjunto, sea $V = K^X = \{f : X \rightarrow K \text{ tal que } f \text{ es una función}\}$.

$$+ : (f + g)(x) = f(x) + g(x) \quad \forall x \in X$$

$$\cdot : (k \cdot f)(x) = k \cdot f(x) \quad \forall x \in X$$

Ejercicio 2. Decidir cuáles de los siguientes subconjuntos son subespacios de V como K -espacio vectorial:

i) $S_1 = \{v \in \mathbb{R}^3 / v = a \cdot (1, 0, 0) + b \cdot (1, 1, 1); a, b \in \mathbb{R}\}$, $V = \mathbb{R}^3$, $K = \mathbb{R}$

ii) $S_2 = \{a \cdot i / a \in \mathbb{R}\}$, $V = \mathbb{C}$, $K = \mathbb{R}$ ó $K = \mathbb{C}$

iii) $S_3 = \{f \in K[X] / f = 0 \text{ ó } \text{gr} f \geq 2\}$, $V = K[X]$

iv) $S_4 = \{f \in K[X] / f = 0 \text{ ó } \text{gr} f \leq 5\}$, $V = K[X]$

v) $S_5 = \{M \in K^{4 \times 4} / M^t = M\}$, $V = K^{4 \times 4}$

vi) $S_6 = \{M \in K^{3 \times 3} / \text{tr}(M) = 0\}$, $V = K^{3 \times 3}$

vii) $S_7 = C^\infty(\mathbb{R})$, $V = \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$, $K = \mathbb{R}$

viii) $S_8 = \{f \in C^\infty(\mathbb{R}) / f''(1) = f(2)\}$, $V = \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$, $K = \mathbb{R}$

ix) Dados a y $b \in \mathbb{R}$ fijos, $S_9 = \{f \in C^\infty(\mathbb{R}) / f'' + af' + bf = 0\}$, $V = \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$, $K = \mathbb{R}$

x) $S_{10} = \{f \in C(\mathbb{R}) / \int_0^1 f(x) dx = 0\}$, $V = \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$, $K = \mathbb{R}$

Ejercicio 3. Sea $A \in K^{n \times m}$ y sea $S = \{x \in K^m : A \cdot x = 0\}$ el conjunto de soluciones del sistema lineal homogéneo cuya matriz asociada es A . Probar que S es un subespacio de K^m .

Ejercicio 4. Encontrar un sistema de generadores para los siguientes espacios vectoriales sobre K :

- i) \mathbb{K}^n
- ii) $\mathbb{K}_n[X] = \{f \in \mathbb{K}[X] / f = 0 \text{ ó } \text{gr}(f) \leq n\}$
- iii) $\mathbb{K}[X]$
- iv) $\mathbb{K}^{n \times n}$
- v) \mathbb{C}^n , $\mathbb{K} = \mathbb{R}$
- vi) $S_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + y - z = 0 ; x - y = 0\}$, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$
- vii) $S_2 = \{A \in \mathbb{R}^{3 \times 3} / A = -A^t\}$, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$
- viii) $S_3 = \{f \in \mathbb{R}_4[X] / f(1) = 0 \text{ y } f(2) = f(3)\}$, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$
- ix) $S_4 = \{f \in C^\infty(\mathbb{R}) / f''' = 0\}$, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$

Ejercicio 5. Sea $S = \langle (1, -1, 2, 1), (3, 1, 0, -1), (1, 1, -1, -1) \rangle \subseteq \mathbb{R}^4$.

- i) Determinar si $(2, 1, 3, 5) \in S$
- ii) Determinar si $S \subseteq \{x \in \mathbb{R}^4 / x_1 - x_2 - x_3 = 0\}$
- iii) Determinar si $\{x \in \mathbb{R}^4 / x_1 - x_2 - x_3 = 0\} \subseteq S$

Ejercicio 6. Decidir cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles falsas:

- i) Sea V un \mathbb{K} -espacio vectorial y sean $v, w \in V$. Entonces $\langle v, w \rangle = \langle v, w + 5v \rangle$
- ii) Sean $v_1, v_2, v_3, v_4, w \in \mathbb{R}^7$ tales que $\langle v_1, v_2, w \rangle = \langle v_3, v_4, w \rangle$. Entonces $\langle v_1, v_2 \rangle = \langle v_3, v_4 \rangle$
- iii) Sea V un \mathbb{K} -espacio vectorial y sean $v_1, v_2, v_3, w \in V$.
 $\langle v_1, v_2, v_3, w \rangle = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle \iff w \in \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$

Ejercicio 7. Decidir si las siguientes sucesiones de vectores son linealmente independientes sobre \mathbb{K} :

- i) $(1, 2, 3), (2, 3, 1), (1, 1, 4), (5, 1, 1)$ en \mathbb{R}^3 , $\mathbb{K} = \mathbb{R}$
- ii) $(1 - i, i), (2, -1 + i)$ en \mathbb{C}^2 para $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ y $\mathbb{K} = \mathbb{C}$
- iii) $(1 - X)^3, (1 - X)^2, 1 - X, 1$ en $\mathbb{K}[X]$
- iv) $f(x) = \text{sen } x, g(x) = \text{cos } x$ en $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$
- v) $f(x) = e^x, g(x) = x, h(x) = e^{-x}$ en $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$
- vi) $u = (1, 0, 1, 0, 1, \dots), v = (0, 1, 0, 1, 0, \dots), w = (1, 1, 0, 1, 1, 0, \dots)$ en $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$

Ejercicio 8. Hallar todos los $k \in \mathbb{R}$ para los cuales cada uno de los siguientes subconjuntos de \mathbb{R}^3 es un conjunto linealmente independiente:

- i) $\{(1, 2, k), (1, 1, 1), (0, 1, 1 - k)\}$
- ii) $\{(k, 1, 0), (3, -1, 2), (k, 2, -2)\}$

Ejercicio 9. Hallar una base y la dimensión de los siguientes K -espacios vectoriales

- i) $\langle (1, 4, -2, 1), (1, -3, -1, 2), (3, -8, -2, 7) \rangle$, $K = \mathbb{R}$
- ii) $\{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 / x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0\}$, $K = \mathbb{R}$
- iii) \mathbb{C} , $K = \mathbb{R}$ y $K = \mathbb{C}$
- iv) $\{f \in \mathbb{R}[X] / f = 0 \text{ ó } \text{gr}(f) \leq 3 \text{ y } f(2) = f(-1)\}$, $K = \mathbb{R}$
- v) $\{f \in \mathbb{R}[X] / f = 0 \text{ ó } \text{gr}(f) \leq 3 \text{ y } f \text{ es un múltiplo de } (x^2 - 2)\}$, $K = \mathbb{R}$
- vi) $\{(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in K^{\mathbb{N}} / a_i = a_j \forall i, j\}$

Ejercicio 10.

- i) Probar que el conjunto $\{(1, 0, 0), (0, i, 0), (1, 1, i)\}$ es base de \mathbb{C}^3 como \mathbb{C} -espacio vectorial pero no como \mathbb{R} -espacio vectorial. Calcular la dimensión de \mathbb{C}^3 como \mathbb{R} -espacio vectorial.
- ii) Probar que el conjunto $\{e_1, \dots, e_n\}$ es una base de \mathbb{C}^n como \mathbb{C} -espacio vectorial pero no como \mathbb{R} -espacio vectorial.
- iii) Probar que $\{e_1, \dots, e_n, ie_1, \dots, ie_n\}$ es una base de \mathbb{C}^n como \mathbb{R} -espacio vectorial. ¿Cuál es la dimensión de \mathbb{C}^n como \mathbb{R} -espacio vectorial?

Ejercicio 11. Completar los siguientes conjuntos linealmente independientes a una base del K -espacio vectorial V indicado:

- i) $\{(1, 1, 1, 1), (0, 2, 1, 1)\}$, $V = \mathbb{R}^4$, $K = \mathbb{R}$
- ii) $\{X^3 - 2X + 1, X^3 + 3X\}$, $V = \mathbb{R}_3[X]$, $K = \mathbb{R}$
- iii) $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ i & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & i \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\}$, $V = \mathbb{C}^{2 \times 2}$, $K = \mathbb{R}$ y $K = \mathbb{C}$

Ejercicio 12. Extraer una base de S de cada uno de los siguientes sistemas de generadores:

- i) $S = \langle (1, 1, 2), (1, 3, 5), (1, 1, 4), (5, 1, 1) \rangle \subseteq \mathbb{R}^3$, $K = \mathbb{R}$
- ii) $S = \langle X^2 + 2X + 1, X^2 + 3X + 1, X + 2 \rangle \subseteq \mathbb{R}[X]$, $K = \mathbb{R}$
- iii) $S = \left\langle \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & i \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & i \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\rangle \subseteq \mathbb{C}^{2 \times 2}$, $K = \mathbb{R}$ y $K = \mathbb{C}$

Ejercicio 13. Hallar la dimensión del \mathbb{R} -espacio vectorial S para cada $k \in \mathbb{R}$ en los siguientes casos:

- i) $S = \langle (1, k, 1), (-1, k, 1), (0, 1, k) \rangle \subset \mathbb{R}^3$
- ii) $S = \left\langle \begin{pmatrix} 1 & k \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} k & 1 \\ 0 & 2k \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\rangle \subset \mathbb{R}^{2 \times 2}$

iii) $S = \{x \in \mathbb{R}^3 / Ax = 0\}$ siendo $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -k & -1 \\ -1 & 1 & k^2 \\ 1 & k & k-2 \end{pmatrix}$$

Ejercicio 14. En cada uno de los siguientes casos caracterizar los subespacios $S \cap T$ y $S + T$ de V . Determinar si la suma es directa:

- i) $V = \mathbb{R}^3$, $S = \{(x, y, z) / 3x - 2y + z = 0\}$ y $T = \{(x, y, z) / x + z = 0\}$
- ii) $V = \mathbb{R}^3$, $S = \{(x, y, z) / 3x - 2y + z = 0, x - y = 0\}$ y $T = \langle (1, 1, 0), (5, 7, 3) \rangle$
- iii) $V = \mathbb{R}^3$, $S = \langle (1, 1, 3), (1, 3, 5), (6, 12, 24) \rangle$ y $T = \langle (1, 1, 0), (3, 2, 1) \rangle$
- iv) $V = \mathbb{R}[X]$, $S = \{f \in \mathbb{R}[X] / f(1) = 0\}$ y $T = \langle 1, X, X^2, X^3 + 2X^2 - X, X^5 \rangle$
- v) $V = \mathbb{R}[X]$, $S = \{f \in \mathbb{R}[X] / f(0) = 0\}$ y $T = \{f \in \mathbb{R}[X] / f'(0) = f''(0) = 0\}$

Ejercicio 15. Determinar todos los $k \in \mathbb{R}$ para los cuales $S \cap T = \langle (0, 1, 1) \rangle$, siendo $S = \{x \in \mathbb{R}^3 / x_1 + x_2 - x_3 = 0\}$ y $T = \langle (1, k, 2), (-1, 2, k) \rangle$.

Ejercicio 16. Para cada S dado hallar $T \subseteq V$ tal que $S \oplus T = V$ (en este caso, T se dice un *suplemento* de S con respecto a V):

- i) $S = \langle (1, 2, -1, 3), (2, 3, -2, 1), (0, 1, 0, 7) \rangle$, $V = \mathbb{R}^4$
- ii) $S = \{A \in \mathbb{R}^{4 \times 4} / \text{tr}(A) = 0\}$, $V = \mathbb{R}^{4 \times 4}$
- iii) $S = \langle 3, 1 + X^2 \rangle$, $V = \mathbb{R}_4[X]$

Ejercicio 17. Decidir si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justificar:

- i) S, T subespacios de \mathbb{R}^3 , $\dim S = \dim T = 2 \Rightarrow \exists v \neq 0$ tal que $v \in S \cap T$
- ii) S, T, W subespacios de \mathbb{R}^5 , $\dim S = \dim T = \dim W = 2 \Rightarrow \dim(S \cap T \cap W) \geq 1$

Ejercicio 18. Encontrar las coordenadas de $v \in V$ respecto de la base B en los siguientes casos:

- i) $V = \mathbb{R}^3$; $v = (1, 2, -1)$ y $B = \{(1, 2, -1), (0, 1, 1), (0, 0, 2)\}$
- ii) $V = \mathbb{R}^3$; $v = (x_1, x_2, x_3)$ y $B = \{(1, 2, -1), (2, 1, 3), (1, 3, -3)\}$
- iii) $V = \mathbb{R}_3[X]$; $v = 2X^2 - X^3$ y $B = \{3, 1 + X, X^2 + 5, X^3 + X^2\}$
- iv) $V = \mathbb{R}^{2 \times 2}$; $v = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ y $B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \right\}$

Ejercicio 19. En cada uno de los siguientes casos, calcular $C(B, B')$, hallar las coordenadas de v respecto de B y utilizando la matriz de cambio de base, las coordenadas de v respecto de B' :

- i) $V = \mathbb{R}^2$, $B = \{(1, 1), (1, 2)\}$, $B' = \{(-1, 3), (2, 5)\}$, $v = (2, 3)$
- ii) $V = \mathbb{R}^3$, $B = \{(1, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 1)\}$, $B' = \{(-1, 1, 1), (2, 0, 1), (1, -1, 3)\}$,
 $v = (-1, 5, 6)$
- iii) $V = \mathbb{R}_2[X]$, $B = \{3, 1 + X, X^2\}$, $B' = \{1, X + 3, X^2 + X\}$, $v = X$
- iv) $V = \mathbb{R}^4$, $B = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$, $B' = \{v_3, v_1, v_4, v_2\}$, $v = 2.v_1 + 3.v_2 - 5.v_3 + 7.v_4$
- v) $V = \mathbb{R}^{2 \times 2}$, $B = \{E^{11}, E^{12}, E^{21}, E^{22}\}$ (la matriz E^{ij} es la matriz que tiene un 1 en el lugar ij y 0 en todos los demás lugares),
 $B' = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \right\}$, $v = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$