

PRÁCTICA 7: CONVERGENCIAS Y LEY DE LOS GRANDES NÚMEROS

Ejercicio 1. Una máquina produce artículos de 3 clases: A, B y C en proporciones 25%, 25% y 50% respectivamente. Las longitudes de los artículos A y B siguen distribuciones $\mathcal{U}[0, 1]$ y $\mathcal{U}[0, 2]$ respectivamente y las longitudes de los artículos C se distribuyen según la densidad $f(x) = (1 - \frac{x}{2}) 1_{[0,2]}(x)$. Se eligen n artículos al azar de la producción total y se calcula el promedio de sus longitudes.

- a) Dar una cota inferior para la probabilidad de que el promedio de las longitudes esté comprendido entre $\frac{15}{24}$ y $\frac{19}{24}$ si el tamaño de la muestra es $n = 100$.
- b) ¿Cuál debe ser el tamaño de la muestra para que la probabilidad de que el promedio de las longitudes esté comprendido entre $\frac{15}{24}$ y $\frac{19}{24}$ sea mayor o igual que 0.90?

Ejercicio 2. Desigualdad de Tchebychev a un lado

- a) Sea X una variable aleatoria con $\mathbb{E}(X) = 0$ y $\text{Var}(X) = \sigma^2 < \infty$. Probar que para todo $a > 0$ vale

$$P(X > a) \leq \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + a^2}.$$

Sugerencia: Observar que para todo $b > 0$ vale la desigualdad

$$P(X > a) = P(X + b > a + b) \leq P((X + b)^2 > (a + b)^2). \tag{1}$$

Aplicar la desigualdad de Markov en (1) y calcular el mínimo en b de la cota hallada.

- b) Un conjunto de 200 personas (integrado por 100 mujeres y 100 hombres) se divide aleatoriamente en 100 pares de 2 personas cada uno. Utilizar la desigualdad de Tchebychev a una lado para hallar una cota superior para la probabilidad de que menos de 30 de estos pares estén formados por una mujer y un hombre. Comparar con la cota obtenida a partir de la desigualdad de Tchebychev original.

Ejercicio 3. Sean $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de variables aleatorias independientes tal que $X_1 \equiv 0$ y para $n \geq 2$

$$P(X_n = k) = \begin{cases} \frac{1}{n^3} & \text{si } k = \pm 1, \pm 2, \dots, \pm n \\ 1 - \frac{2}{n^2} & \text{si } k = 0 \end{cases}$$

Probar que si $\alpha > \frac{1}{2}$ entonces

$$\sum_{i=1}^n \frac{X_i}{n^\alpha} \xrightarrow{P} 0.$$

Sugerencia: $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

Ejercicio 4. Sean $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de variables aleatorias tal que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \text{Var}(X_n) = 0$.

- a) Probar que si $\mathbb{E}(X_n) = 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$ entonces $X_n \xrightarrow{P} 0$.

b) Probar que si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}(X_n) = \mu \in \mathbb{R}$ entonces $X_n \xrightarrow{P} \mu$.

Ejercicio 5. Sean $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de variables aleatorias y X otra variable aleatoria, todas ellas definidas sobre el mismo espacio (Ω, \mathcal{F}, P) .

- Escribir el conjunto $\{X_n \rightarrow X\}$ en términos de eventos de la forma $\{|X_n - X| \leq \alpha\}$ con $\alpha > 0$ y verificar que es un evento perteneciente a la σ -álgebra \mathcal{F} .
- Escribir el conjunto $\{X_n \not\rightarrow X\}$ en términos de numerables eventos de la forma $\{|X_n - X| > \alpha\}$ con $\alpha > 0$.
- Verificar que $\{X_n \rightarrow X\} = \{X_n - X \rightarrow 0\}$.
- Sea $L^+ = \limsup_{n \rightarrow +\infty} X_n$, i.e., para cada $\omega \in \Omega$ se define $L^+(\omega) = \limsup_{n \rightarrow +\infty} X_n(\omega)$.
 - Para cada $\alpha > 0$ escribir el conjunto $\{L^+ \geq \alpha\}$ en términos de numerables eventos de la forma $\{X_n > r$ para infinitos valores de $n\}$ con $r \in \mathbb{R}$ y verificar que es un evento perteneciente a la σ -álgebra \mathcal{F} . Deducir que L^+ es una variable aleatoria.
 - Para cada $\alpha > 0$ escribir el conjunto $\{L^+ > \alpha\}$ en términos de numerables eventos de la forma $\{X_n > r$ para infinitos valores de $n\}$ con $r \in \mathbb{R}$.
- Demostrar afirmaciones análogas a las del ítem *d)* para $L^- = \liminf_{n \rightarrow +\infty} X_n$.

Ejercicio 6. Sea $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de variables aleatorias independientes con distribución $\varepsilon(1)$ y para cada $n \in \mathbb{N}$ definamos la variable aleatoria

$$Y_n = \frac{X_n}{\log(n+1)}.$$

- Probar que $Y_n \xrightarrow{P} 0$.
- Probar que $P(L^+ = 1) = 1$, donde $L^+ := \limsup_{n \rightarrow +\infty} Y_n$.
- Probar que $P(L^- = 0) = 1$, donde $L^- := \liminf_{n \rightarrow +\infty} Y_n$.
- Deducir de los ítems anteriores que la sucesión $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ no tiene límite casi seguro.

Ejercicio 7. Se elige uniformemente un número X en el intervalo $[0, 1]$.¹

- Dados $k \in \mathbb{N}$ y una secuencia ordenada de k dígitos $(a_1, \dots, a_k) \in \{0, \dots, 9\}^k$, calcular la probabilidad para cada $n \in \mathbb{N}$ de que dicha secuencia coincida con la de los dígitos del desarrollo decimal de X entre los lugares n y $n+k-1$.
- Dados $k \in \mathbb{N}$ y una secuencia ordenada de k dígitos $(a_1, \dots, a_k) \in \{0, \dots, 9\}^k$, calcular la probabilidad de que dicha secuencia aparezca infinitas veces en el desarrollo decimal de X .
- Calcular $P\{\text{ocurren infinitos } A_n\}$, donde para cada $n \in \mathbb{N}$ se define el evento A_n como

$$A_n = \{\text{El 9 aparece al menos } n \text{ veces consecutivas en los } 2n \text{ primeros lugares del desarrollo decimal de } X\}$$

¹Si un número admite dos desarrollos decimales se optará por el finito. Por ejemplo, se tomará 0.745 y no 0.7449.

d) ¿Cuál es la probabilidad de que X sea racional?

Ejercicio 8. Se tira infinitas veces una moneda de manera independiente y con probabilidad p de obtener cara en cada lanzamiento.

- a) Dado $k \in \mathbb{N}$ calcular la probabilidad de obtener infinitas rachas de k caras consecutivas.
- b) Sea A_n el evento de obtener una racha de caras consecutivas de longitud no menor que n entre los lanzamientos 2^n y $2^{n+1} - 1$. Probar que

$$P(\text{Ocurren infinitos } A_n) = \begin{cases} 0 & \text{si } p < \frac{1}{2} \\ 1 & \text{si } p \geq \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Sugerencia: Si $p \geq \frac{1}{2}$ entonces $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - (1 - p^n)^{\lfloor \frac{2^n}{n} \rfloor}\right) = +\infty$.

Ejercicio 9.

- a) Probar que una sucesión de variables aleatorias $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge en probabilidad a una variable aleatoria X si y sólo si toda subsucesión de $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ contiene otra subsucesión que converge casi seguramente a X .
- b) Probar que si toda subsucesión de $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ contiene otra subsucesión que converge casi seguramente a X no es cierto que $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge casi seguramente a X .

Ejercicio 10. Una colección $(X_i)_{i \in \mathcal{I}}$ de variables aleatorias se dice *acotada en probabilidad o tight* si dado $\varepsilon > 0$ existe un compacto K_ε tal que

$$\sup_{i \in \mathcal{I}} P(X_i \notin K_\varepsilon) < \varepsilon.$$

- a) Probar que toda colección finita de variables aleatorias es acotada en probabilidad.
- b) Mostrar que una familia infinita de variables aleatorias no es necesariamente acotada en probabilidad.
- c) Sean $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de variables aleatorias y X_0 una variable aleatoria tal que $X_n \xrightarrow{P} X_0$. Probar que la familia $(X_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ está acotada en probabilidad.

Ejercicio 11. Sean $(\mathbf{X}_k)_{k \in \mathbb{N}}$ una sucesión de vectores aleatorios sobre \mathbb{R}^n y \mathbf{X}_0 otro vector aleatorio sobre \mathbb{R}^n .

- a) Probar que si $\mathbf{X}_k \xrightarrow{cs} \mathbf{X}_0$ y $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es una función continua entonces $g(\mathbf{X}_k) \xrightarrow{cs} g(\mathbf{X}_0)$.
- b) Probar que si $\mathbf{X}_k \xrightarrow{P} \mathbf{X}_0$ y $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es una función continua entonces $g(\mathbf{X}_k) \xrightarrow{P} g(\mathbf{X}_0)$. *Sugerencia:* Hay dos posibilidades. La más fácil, tomar subsucesión de la subsucesión. La otra, tener presente que $(\mathbf{X}_k)_{k \in \mathbb{N}_0}$ es una sucesión acotada en probabilidad y que toda función continua es uniformemente continua sobre compactos.

Ejercicio 12. Sean $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ e $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dos sucesiones de variables aleatorias.

- Probar que si $X_n \xrightarrow{P} 0$ e $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ está acotada en probabilidad entonces $X_n Y_n \xrightarrow{P} 0$.
- Probar que si $X_n \xrightarrow{P} X$ e $Y_n \xrightarrow{P} Y$ entonces $X_n + Y_n \xrightarrow{P} X + Y$ y que $X_n Y_n \xrightarrow{P} XY$.

Ejercicio 13. Sea $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de variables aleatorias.

- Sea X una variable aleatoria. Definimos a Z por

$$Z = \begin{cases} \frac{1}{X} & \text{si } X \neq 0 \\ 0 & \text{si } X = 0. \end{cases}$$

Probar que Z es una variable aleatoria. La notaremos por $\frac{1}{X}$.

- Supongamos que $X_n \xrightarrow{cs} X$ con $P(X = 0) = 0$. Probar que $\frac{1}{X_n} \xrightarrow{cs} \frac{1}{X}$, donde $\frac{1}{X_n}$ se define como en el ítem anterior.
- Supongamos que $X_n \xrightarrow{P} X$ con $P(X = 0) = 0$. Probar que $\frac{1}{X_n} \xrightarrow{P} \frac{1}{X}$.

Sugerencia: Tomar subsucesión de la subsucesión.

Ejercicio 14. Sea $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de variables aleatorias independientes con distribución $\mathcal{U}[0, 1]$. Hallar el límite casi seguro de la sucesión $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$, donde para cada $n \in \mathbb{N}$ la variable aleatoria Y_n se define como

$$Y_n = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n X_i}.$$

Ejercicio 15. Sea $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas tal que $\mathbb{E}(X_1) = 1$, $\mathbb{E}(X_1^2) = 2$ y $\mathbb{E}(X_1^4) < +\infty$. Probar que

$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{\sqrt{n \sum_{i=1}^n X_i^2}} \xrightarrow{cs} \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Ejercicio 16. Sea $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de variables aleatorias i.i.d. con $\mathbb{E}(|X_1|) = +\infty$.

- Probar que para todo $k \in \mathbb{N}$ se verifica $\sum_{n \in \mathbb{N}} P(|X_n| > kn) = +\infty$.
- Probar que $\limsup_{n \rightarrow +\infty} \frac{|X_n|}{n} = +\infty$ cs.
- Deducir que $\limsup_{n \rightarrow +\infty} \frac{|S_n|}{n} = +\infty$ cs., donde $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$.
- Concluir del ítem anterior que si $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas tal que $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{cs} \mu$ para cierto $\mu \in \mathbb{R}$ entonces $\mathbb{E}(|X_1|) < +\infty$.