

ANÁLISIS COMPLEJO

Práctica N°3.

1. Sea $\alpha \in \mathbb{C}$ con $|\alpha| < 1$.

(a) Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha^n$.

(b) Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \alpha + \dots + \alpha^n)$.


2. Calcular, en caso de que existan, los límites de las siguientes sucesiones:

(i) $\frac{1}{n}i^n$, (ii) $n\left(\frac{1+i}{\sqrt{2}}\right)^n$, (iii) $\cos(n\pi) + i\frac{\sin(\frac{n}{2})}{n^2}$,
 (iv) $\left(\frac{1+2i^n}{3}\right)^n$, (v) $n\left(\frac{1+i}{2}\right)^n$.

3. Se define el *conjunto de Mandelbrot* como el conjunto \mathcal{M} de los $z \in \mathbb{C}$ tales que la sucesión recursiva definida por:

$$z_0 = 0, \quad z_{n+1} = z_n^2 + z,$$

resulta acotada.



Demostrar que $\mathcal{M} \subset \{|z| \leq 2\}$.

4. Estudiar la convergencia de la serie cuyo término general es el siguiente:

(i) $a_n = \frac{n+1}{2n+1}$, (ii) $a_n = \frac{n}{2n^2+3}$, (iii) $a_n = \frac{1}{\sqrt{n+5}}$,
 (iv) $a_n = \log\left(1 + \frac{1}{n}\right)$, (v) $a_n = \sin\left(\frac{1}{n^2}\right)$.

5. Demostrar que la serie de término general $a_n = \frac{1}{n^p \log(n)^q}$, $n \geq 2$,

(i) converge si $q > 0$ y $p > 1$, (ii) converge si $q > 1$ y $p = 1$,
 (iii) diverge si $q > 0$ si $p < 1$, (iv) diverge si $0 < q \leq 1$ y $p = 1$.

6. Hallar el radio de convergencia de las siguientes series de potencia:

(i) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^3 4^n} z^n$, (ii) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1+2i)^n}{n^n} z^n$, (iii) $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n^2} z^n$,
 (iv) $\sum_{n=0}^{\infty} 4^{n^2} z^n$, (v) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} z^{n^2}$, (vi) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} z^n$.

7. Sea $k \in \mathbb{N}$. Probar que $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ y $\sum_{n=0}^{\infty} a_n n^k z^n$ tienen el mismo radio de convergencia.
8. Sean $(a_n)_{n \geq 0}$ y $(z_n)_{n \geq 0}$ sucesiones de números complejos.
- (a) **Criterio de Dedekind.** Demostrar que si $\lim a_n = 0$, $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n - a_{n+1})$ converge absolutamente y las sumas parciales de $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ están acotadas, entonces $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z_n$ converge.
- (b) **Criterio de Bois-Reymond.** Demostrar que si $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n - a_{n+1})$ converge absolutamente y $\sum_{n=0}^{\infty} z_n$ converge, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n z_n$ converge.
9. Hallar el radio de convergencia de las siguientes series y estudiar el comportamiento en el borde del disco de convergencia:

$$\begin{array}{lll}
 \text{(i)} & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} z^n, & \text{(ii)} \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n+2}} z^n, & \text{(iii)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n+1}} z^n, \\
 \text{(iv)} & \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4^n}{5^n} z^n, & \text{(v)} \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+2)^n} z^n, & \text{(vi)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(2-i)n^2} z^n, \\
 \text{(vii)} & \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{1+(1+i)^n} z^n, & \text{(viii)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} n! z^{n^2}, & \text{(ix)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} z^{n!}, \\
 \text{(x)} & \sum_{n=0}^{\infty} \operatorname{sen} n z^n, & \text{(xi)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} z^{n(n+1)}.
 \end{array}$$

10. Hallar los valores de $z \in \mathbb{C}$ para los cuales las siguientes series resultan convergentes:

$$\begin{array}{lll}
 \text{(i)} & \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z+i)^n}{(n+1)(n+2)}, & \text{(ii)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+|z|}, & \text{(iii)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+|z|}, \\
 \text{(iv)} & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n z^n}, & \text{(v)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{nz}}{n^2}, & \text{(vi)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{inz}}{n+1}.
 \end{array}$$

11. Sea $m \in \mathbb{N}$. Demostrar que los conjuntos de convergencia de las series $\sum_{n=1}^{\infty} a_n z^n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} a_{m+n} z^n$ son iguales.
12. Sea $f(z) = \sum_n a_n z^n$ una serie de potencias con radio de convergencia $\rho > 0$.
- (a) Demostrar que $f(-z) = f(z)$ para todo z con $|z| < \rho$ si y solo si $a_n = 0$ para todo n impar.
- (b) Demostrar que $f(-z) = -f(z)$ para todo z con $|z| < \rho$ si y solo si $a_n = 0$ para todo n par.
13. La *sucesión de Fibonacci* se define recursivamente por $a_0 = 0$, $a_1 = 1$ y $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ para $n \geq 2$.
- (a) Probar que $R(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ tiene radio de convergencia positivo, y la función $R(z)$ es una función racional. Hallar una fórmula explícita para $R(z)$.
- (b) Descomponiendo $R(z)$ en fracciones simples y usando la suma de la serie geométrica, obtener un nuevo desarrollo de $R(z)$ en serie de potencias.
- (c) Comparar ambos desarrollos y obtener una fórmula cerrada para el n -ésimo término de la sucesión de Fibonacci.