

1. a) Sean X e Y variables aleatorias independientes. Probar que si:
 - i. $X \sim \mathcal{Bi}(n, p), Y \sim \mathcal{Bi}(m, p) \Rightarrow X|X + Y = k \sim \mathcal{H}(m + n, n, k)$.
 - ii. $X \sim \mathcal{P}(\lambda), Y \sim \mathcal{P}(\mu) \Rightarrow X|X + Y = k \sim \mathcal{Bi}\left(k, \frac{\lambda}{\lambda + \mu}\right)$
 - iii. Hallar $\mathbb{E}(X|X + Y = k)$ en los dos casos anteriores.
2. Se tienen dos urnas numeradas 0 y 1 con bolas blancas y negras. La urna 0 tiene 2 bolas blancas y 8 negras, mientras que la urna 1 tiene 7 bolas blancas y 3 negras.

- a) Elegimos una urna al azar. Luego sacamos de ella, con reposición, 5 bolas. Definimos las variables aleatorias

$X =$ cantidad de bolas blancas obtenidas en las 5 extracciones.
 $Y =$ urna elegida.

Calcular $\mathbb{E}(X|Y = 0)$, $\mathbb{E}(X|Y = 1)$ y $\mathbb{E}(X)$. Compararlas entre sí.

- b) Ahora cambiamos el procedimiento. Elegimos una urna al azar, y de ella extraemos 1 bola, que luego reponemos en la urna correspondiente. Luego repetimos el experimento 5 veces, de manera independiente. Sea $Z =$ cantidad de bolas blancas obtenidas en las 5 extracciones. Hallar $\mathbb{E}(Z)$ y compararla con la $\mathbb{E}(X)$ hallada en el ítem anterior.
3. Sean (Ω, \mathcal{F}, P) un espacio de probabilidad y $X \in L^2(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Se define la varianza condicional de X dada Y como la variable aleatoria

$$\text{Var}(X|Y) := \mathbb{E}\left(\left(X - \mathbb{E}(X|Y)\right)^2 \middle| Y\right).$$

Probar que

$$\text{Var}(X) = \text{Var}[\mathbb{E}(X|Y)] + \mathbb{E}(\text{Var}(X|Y)).$$

4. Sean (Ω, \mathcal{F}, P) un espacio de probabilidad y X e Y variables aleatorias en $L^2(\Omega, \mathcal{F}, P)$.
 - a) Supongamos que (X, Y) es un vector discreto con probabilidad conjunta p_{XY} . Sea $g : \mathcal{R}_Y \rightarrow \mathbb{R}$ medible Borel tal que $\mathbb{E}(X|Y) = g(Y)$ y definamos $\sigma^2 : \mathcal{R}_Y \rightarrow \mathbb{R}$ por la fórmula

$$\sigma^2(y) = \sum_{x \in \mathcal{R}_X} (x - g(y))^2 p_{X|Y=y}(x).$$

Es decir, para cada $y \in \mathcal{R}_Y$, $\sigma^2(y)$ denota la varianza condicional de X dado el evento $\{Y = y\}$. Probar que $\text{Var}(X|Y) = \sigma^2(Y)$.

- b) Supongamos que (X, Y) es un vector absolutamente continuo con función de densidad conjunta f_{XY} . Si $\text{sop}(Y) = \{y \in \mathbb{R} : \int_{\mathbb{R}} f_{XY}(x, y) dx > 0\}$ y $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ medible Borel es tal que $\mathbb{E}(X|Y) = g(Y)$ definamos $\sigma^2 : \text{sop}(Y) \rightarrow \mathbb{R}$ por la fórmula

$$\sigma^2(y) = \int_{\mathbb{R}} (x - g(y))^2 f_{X|Y=y}(x) dx.$$

Probar que $\text{Var}(X|Y) = \sigma^2(Y)$.

Observación. Este ejercicio nos presenta una receta para calcular varianzas condicionales en términos de las distribuciones condicionales. Mediante la ecuación a probar en el ejercicio 3, esto nos permite calcular de manera eficiente varianzas a partir de las distribuciones condicionales.

5. Sean X e Y variables aleatorias definidas en un mismo espacio con Y discreta. Probar que $E(X|Y) = g(Y)$ donde $g : \mathcal{R}_Y \rightarrow \mathbb{R}$ se define para cada $y \in \mathcal{R}_Y$ mediante la fórmula

$$g(y) = \frac{1}{P(Y=y)} E(\mathbf{1}_{\{Y=y\}}).$$

6. Sean X e Y variables aleatorias tales que para cada $y \in \mathbb{R}$ se tiene que $P(Y \leq y|X)$ es una constante $F(y)$ que no depende de X . Probar que $F_Y(y) = F(y)$ para todo $y \in \mathbb{R}$ y que X e Y son independientes.
7. Sean $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de variables aleatorias i.i.d. con esperanza y varianza finitas y N una variable aleatoria a valores en \mathbb{N} con esperanza y varianza finitas e independiente de $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

a) Probar que $\mathbb{E} \left[\sum_{i=1}^N X_i \right] = \mathbb{E}(N)\mathbb{E}(X_1)$.

b) Probar que

$$\text{Var} \left[\sum_{i=1}^N X_i \right] = \mathbb{E}(N)\text{Var}(X_1) + \mathbb{E}^2(X_1)\text{Var}(N).$$

c) El número de reclamos recibido por una compañía de seguros en una semana es una variable aleatoria Poisson de parámetro λ . El monto pagado por cada uno de esos reclamos es una variable aleatoria con media μ y varianza σ^2 . Hallar la esperanza y la varianza del total pagado por la compañía en concepto de reclamos en una semana. ¿Qué hipótesis se están haciendo? ¿Son razonables?

8. Sea $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de variables aleatorias discretas independientes. Para cada $n \in \mathbb{N}$ definamos $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$. Observar que S_n es una variable discreta para todo $n \in \mathbb{N}$.

a) Dados números naturales $k < n < m$, mostrar que S_k y S_m son condicionalmente independientes dado S_n , i.e., para todo $x_k \in \mathcal{R}_{S_k}$ y $x_m \in \mathcal{R}_{S_m}$ se verifica

$$P(S_k = x_k, S_m = x_m | S_n) = P(S_k = x_k | S_n)P(S_m = x_m | S_n).$$

Sugerencia: Mostrar que $P(S_k = x_k, S_m = x_m | S_n = x_n) = P(S_k = x_k | S_n = x_n)P(S_m = x_m | S_n = x_n)$ para todo $x_n \in \mathcal{R}_{S_n}$.

b) Mostrar que si $\mathbb{E}(X_i) = 0$ para todo $i \in \mathbb{N}$ entonces dados $n < m$ se verifica $\mathbb{E}(S_m | S_n) = S_n$.

9. La llegada de un tren a la estación se produce con distribución uniforme entre las 10 am y las 10:20 am. La partida del mismo se produce con distribución uniforme entre su llegada y las 11 am. Sean X la hora de llegada de dicho tren e Y la hora de su partida.

a) Calcular $\mathbb{E}(Y)$ y $\text{Cov}(X, Y)$.

b) Hallar la función de densidad de Y .

c) Calcular la probabilidad de que el tren haya llegado a la estación entre las 10:10 am y las 10:15 am sabiendo que partió después de las 10:25 am.

10. a) Sean X e Y dos variables aleatorias independientes con distribución exponencial de parámetro $\lambda > 0$ y sea $Z = X + Y$. Probar que $X|Z \sim \mathcal{U}[0, Z]$, es decir, que para todo $x \in \mathbb{R}$ se tiene

$$P(X \leq x | Z) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \frac{x}{Z} & \text{si } 0 \leq x \leq Z \\ 1 & \text{si } x > Z. \end{cases}$$

- b) Dado $\lambda > 0$, sean Z una variable aleatoria con distribución $\Gamma(2, \lambda)$ y X otra variable aleatoria tal que su distribución condicional dada Z es $\mathcal{U}[0, Z]$. Mostrar que X y $Z - X$ son variables aleatorias independientes con distribución exponencial de parámetro λ . ¿Cuál es la relación con el ítem anterior?
- c) Sea Z una variable aleatoria con distribución $\Gamma(2, 1)$ y X otra variable aleatoria tal que su distribución condicional dada Z es $\mathcal{U}[0, Z]$. Calcular $P(Z \geq 2|X \leq 1)$.

11. Sea (X, Y) un vector aleatorio bidimensional tal que $f_{X|Y=y}(x) = \frac{3x^2}{y^3} \mathbb{1}_{(0,y)}(x)$ y $f_Y(y) = 5y^4 \mathbb{1}_{(0,1)}(y)$.

- a) Calcular la función de densidad del cociente $\frac{X}{Y}$ y probar que es independiente de Y sin apelar al teorema de cambio de variables.
- b) Hallar la densidad condicional $f_{Y|X=x}$ para cada $x \in (0, 1)$.

12. Sean X e Y variables aleatorias tales que $Y \sim \mathcal{U}[2, 3]$ y para cada $y \in [2, 3]$ se verifica

x	-1	0	1
$p_{X Y=y}(x)$	$\frac{3-y}{2}$	$y-2$	$\frac{3-y}{2}$

- a) Hallar p_X .
- b) Calcular la función de distribución $F_{Y|X=x}(y)$ para cada $x \in \mathcal{R}_X$.

13. Sean X e Y variables aleatorias tales que X es discreta con probabilidad puntual

x	1	2
$p_X(x)$	1/4	3/4

y la distribución condicional de Y dada X es $\varepsilon(X)$.

- a) Calcular $F_Y(y)$ y $f_Y(y)$.
- b) Calcular $P(X = x, Y \leq y)$ para $y > 0$ y $x \in \mathcal{R}_X$.
- c) Para cada $x \in \mathcal{R}_X$ sea $g_x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una aplicación medible Borel tal que $P(X = x|Y) = g_x(Y)$. Para cada $x \in \mathcal{R}_X$ expresar $P(X = x, Y \leq y)$ en términos de g_x .
- d) Para cada $x \in \mathcal{R}_X$ calcular explícitamente $P(X = x|Y)$.