

PRÁCTICA 11: DISTRIBUCIONES CONDICIONALES Y ESPERANZA CONDICIONAL

Ejercicio 1.

- a) Sean X e Y variables aleatorias independientes con $X \sim Bi(n, p)$ e $Y \sim Bi(m, p)$, respectivamente. Probar que $X|X + Y = k \sim \mathcal{H}(m + n, n, k)$ y hallar $E(X|X + Y = k)$.
- b) Sean X e Y dos variables aleatorias definidas en un mismo espacio con $X + Y \sim \mathcal{P}(\lambda)$ para $\lambda > 0$. Probar que $X|X + Y = k \sim Bi(k, p)$ para cierto $0 < p < 1$ si y sólo si X e Y son independientes y tienen distribución $X \sim \mathcal{P}(\lambda p)$ e $Y \sim \mathcal{P}(\lambda(1 - p))$, respectivamente.

Ejercicio 2. Se tienen dos urnas numeradas 0 y 1 con bolas blancas y negras, con 10 bolas cada una. La urna 0 tiene un 2 bolas blancas, mientras que la urna 1 tiene 7 bolas blancas.

- a) Se elige una urna al azar. Luego sacamos de ella, con reposición, 5 bolas. Definimos las variables aleatorias

$$X = \text{cantidad de bolas blancas obtenidas en las 5 extracciones.}$$

$$Y = \text{urna elegida.}$$

Calcular $\mathbb{E}(X|Y = 0)$, $\mathbb{E}(X|Y = 1)$ y $\mathbb{E}(X)$. Compararlas entre sí.

- b) Ahora cambiamos el procedimiento. Elegimos una urna al azar, y de ella extraemos 1 bola, que luego reponemos en la urna correspondiente. Luego repetimos el experimento 5 veces, de manera independiente. Sea X = cantidad de bolas blancas obtenidas en las 5 extracciones. Hallar $\mathbb{E}(Z)$ y compararla con la $\mathbb{E}(X)$ hallada en el ítem anterior.

Ejercicio 3. Sean (Ω, \mathcal{F}, P) un espacio de probabilidad y $X \in L^2(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Se define la varianza condicional de X dada Y como la variable aleatoria

$$\text{Var}(X|Y) := \mathbb{E}\left((X - \mathbb{E}(X|Y))^2 \middle| Y\right).$$

Probar que

$$\text{Var}(X) = \text{Var}[E(X|Y)] + \mathbb{E}(\text{Var}(X|Y)).$$

Ejercicio 4. Sean (Ω, \mathcal{F}, P) un espacio de probabilidad y X e Y variables aleatorias en $L^2(\Omega, \mathcal{F}, P)$.

- a) Supongamos que (X, Y) es un vector discreto con probabilidad conjunta p_{XY} . Sea $g : \mathcal{R}_Y \rightarrow \mathbb{R}$ medible Borel tal que $\mathbb{E}(X|Y) = g(Y)$ y definamos $\sigma^2 : \mathcal{R}_Y \rightarrow \mathbb{R}$ por la fórmula

$$\sigma^2(y) = \sum_{x \in \mathcal{R}_X} (x - g(y))^2 p_{X|Y=y}(x).$$

Es decir, para cada $y \in \mathcal{R}_Y$, $\sigma^2(y)$ denota la varianza condicional de X dado el evento $\{Y = y\}$. Probar que $\text{Var}(X|Y) = \sigma^2(Y)$.

- b) Supongamos que (X, Y) es un vector absolutamente continua con función de densidad conjunta f_{XY} . Si $\text{sop}(Y) = \{y \in \mathbb{R} : \int_{\mathbb{R}} f_{XY}(x, y) dx > 0\}$ y $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ medible Borel es tal que $\mathbb{E}(X|Y) = g(Y)$ definamos $\sigma^2 : \text{sop}(Y) \rightarrow \mathbb{R}$ por la fórmula

$$\sigma^2(y) = \int_{\mathbb{R}} (x - g(y))^2 f_{X|Y=y}(x) dx.$$

Probar que $\text{Var}(X|Y) = \sigma^2(Y)$.

Observación. Este ejercicio nos presenta una receta para calcular varianzas condicionales en términos de las distribuciones condicionales. Mediante la ecuación a probar en el ejercicio 3, esto nos permite calcular de manera eficiente varianzas a partir de las distribuciones condicionales.

Ejercicio 5. Sean X e Y variables aleatorias definidas en un mismo espacio con Y discreta. Probar que $\mathbb{E}(X|Y) = g(Y)$ donde $g : \mathcal{R}_Y \rightarrow \mathbb{R}$ se define para cada $y \in \mathcal{R}_Y$ mediante la fórmula

$$g(y) = \frac{1}{P(Y = y)} \mathbb{E}(X 1_{\{Y=y\}}).$$

Ejercicio 6. Sean $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de variables aleatorias i.i.d. con esperanza y varianza finitas y N una variable aleatoria a valores en \mathbb{N} con esperanza y varianza finitas e independiente de $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

a) Probar que $\mathbb{E} \left[\sum_{i=1}^N X_i \right] = \mathbb{E}(N) \mathbb{E}(X_1)$.

b) Probar que

$$\text{Var} \left[\sum_{i=1}^N X_i \right] = \mathbb{E}(N) \text{Var}(X_1) + \mathbb{E}^2(X_1) \text{Var}(N).$$

- c) El número de reclamos recibido por una compañía de seguros en una semana es una variable aleatoria Poisson de parámetro λ . El monto pagado por cada uno de esos reclamos es una variable aleatoria con media μ y varianza σ^2 . Hallar la esperanza y la varianza del total pagado por la compañía en concepto de reclamos en una semana. ¿Qué hipótesis se están haciendo? ¿Son razonables?

Ejercicio 7. La llegada de un tren a la estación se produce con distribución uniforme entre las 10 am y las 10:20 am. La partida del mismo se produce con distribución uniforme entre su llegada y las 11 am. Sean X la hora de llegada de dicho tren e Y la hora de su partida.

a) Calcular $\mathbb{E}(Y)$ y $\text{Cov}(X, Y)$.

b) Hallar la función de densidad de Y .

- c) Calcular la probabilidad de que el tren haya llegado a la estación entre las 10:10 am y las 10:15 am sabiendo que partió después de las 10:25 am.

Ejercicio 8.

- a) Sean X e Y dos variables aleatorias definidas en un mismo espacio con $X + Y \sim \Gamma(2, \lambda)$ para $\lambda > 0$. Probar que $X|X + Y = z \sim \mathcal{U}[0, z]$ para todo $z > 0$ si y sólo si X e Y son independientes y tienen distribución $\mathcal{E}(\lambda)$.

b) Sean X y Z variables aleatorias que satisfacen $Z \sim \Gamma(2, 1)$ y $X|Z = z \sim \mathcal{U}[0, z]$ para todo $z > 0$.

i) Calcular $P(Z \geq 2|X \leq 1)$.

ii) Calcular $P(Z - X \geq 2|X \leq 1)$.

Ejercicio 9. Sea (X, Y) un vector aleatorio bidimensional tal que $f_{X|Y=y}(x) = \frac{3x^2}{y^3} \mathbb{1}_{(0,y)}(x)$ y $f_Y(y) = 5y^4 \mathbb{1}_{(0,1)}(y)$.

a) Calcular la función de densidad del cociente $\frac{X}{Y}$ y probar que es independiente de Y sin apelar al teorema de cambio de variables.

b) Hallar la densidad condicional $f_{Y|X=x}$ para cada $x \in (0, 1)$.

Ejercicio 10. Sea n un número natural y sea (X, Y) un vector aleatorio discreto con función de probabilidad puntual dada por

$$p_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} \frac{2}{n(n+1)} & \text{si } x \leq y, \ x, y \in \{1, 2, \dots, n\} \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Calcular $\mathbb{E}[X|Y]$ y $\mathbb{E}[Y|X]$.

Ejercicio 11. Sea $U \sim \mathcal{U}(0, 6)$. Para cada $n \in \mathbb{N}$ consideramos las variables aleatorias X_n tales que $X_n|U=u \sim N\left(\frac{u^2}{n}, \frac{1}{n^2}\right)$.

a) Para cada $n \in \mathbb{N}$, calcular $\mathbb{E}(X_n)$ y $\text{Var}(X_n)$.

Sugerencia: use que $\text{Var}(X) = \text{Var}[\mathbb{E}(X|Y)] + \mathbb{E}[\text{Var}(X|Y)]$ y no haga demasiadas cuentas.

b) Probar que $X_n \xrightarrow{p} 0$.

c) Hallar $n \in \mathbb{N}$ de manera que

$$\mathbb{P}\left(\frac{12 - \sqrt{n}}{n} < X_n < \frac{12 + \sqrt{n}}{n}\right) \geq 0.99$$