

ANÁLISIS II - MATEMÁTICA 3 - ANÁLISIS MATEMÁTICO II

PRÁCTICA 2: TEOREMA DE GREEN

Ejercicio 1. Verificar el teorema de Green para el disco D con centro $(0,0)$ y radio R y las siguientes funciones:

- (a) $P(x, y) = xy^2$, $Q(x, y) = -yx^2$.
 (b) $P(x, y) = 2y$, $Q(x, y) = x$.

Ejercicio 2. Verificar el teorema de Green y calcular $\int_C y^2 dx + x dy$, siendo C la curva recorrida en sentido positivo:

- (a) Cuadrado con vértices $(0,0)$, $(2,0)$, $(2,2)$, $(0,2)$.
 (b) Elipse dada por $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.
 (c) $C = C_1 \cup C_2$, donde $C_1 : y = x$, $x \in [0, 1]$, y $C_2 : y = x^2$, $x \in [0, 1]$.

Ejercicio 3. Usando el teorema de Green hallar el área de:

- (a) El disco D con centro $(0,0)$ y radio R .
 (b) La región dentro de la elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

Ejercicio 4. Sea D la región encerrada por el eje x y el arco de cicloide:

$$x = \theta - \sin \theta, \quad y = 1 - \cos \theta, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

Usando el teorema de Green calcular el área de D .

Ejercicio 5. Hallar el área entre las curvas dadas en coordenadas polares por

$$r = 1 + \cos \theta, \quad -\pi \leq \theta \leq \pi,$$

$$r = \sqrt{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta}, \quad -\pi/4 \leq \theta \leq \pi/4.$$

Ejercicio 6. Probar la fórmula de *integración por partes*: si $D \subset \mathbb{R}^2$ es un dominio elemental, ∂D su frontera orientada en sentido antihorario y $\mathbf{n} = (n_1, n_2)$ la normal exterior a D , entonces

$$\int_D u v_x dx dy = - \int_D u_x v dx dy + \int_{\partial D} u v n_1 ds,$$

para todo par de funciones $u, v \in C(\bar{D}) \cap C^1(D)$.

Ejercicio 7. Sean P y Q funciones continuamente diferenciables en \mathbb{R}^2 . Verificar que el teorema de Green para estas funciones es válido cuando la región D es el anillo

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}.$$

Sugerencia: aplicar el teorema de Green en los discos de radios 1 y 2.

Ejercicio 8. Sea C la curva dada por

$$\begin{aligned} x &= 0, & 0 &\leq y \leq 4, \\ y &= 4, & 0 &\leq x \leq 4, \\ y &= x, & 0 &\leq x \leq 1, \\ y &= 2 - x, & 1 &\leq x \leq 2, \\ y &= x - 2, & 2 &\leq x \leq 3, \\ y &= 4 - x, & 2 &\leq x \leq 3, \\ y &= x, & 2 &\leq x \leq 4, \end{aligned}$$

orientada positivamente. Calcular

$$\int_C \frac{y}{(x-1)^2 + y^2} dx + \frac{1-x}{(x-1)^2 + y^2} dy.$$

Ejercicio 9. Sea $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0\}$. Calcular

$$\int_{\partial D} x^2 y \, dx - xy^2 \, dy.$$

Como siempre, ∂D está recorrido en sentido positivo (el contrario a las agujas del reloj).

Ejercicio 10. Calcular el trabajo efectuado por el campo de fuerzas $\mathbf{F}(x, y) = (y + 3x, 2y - x)$ al mover una partícula rodeando una vez la elipse $4x^2 + y^2 = 4$ en el sentido de las agujas del reloj.

Ejercicio 11. Sea $\mathbf{F}(x, y) = (P(x, y), Q(x, y)) = \left(\frac{y}{x^2+y^2}, \frac{-x}{x^2+y^2}\right)$. Calcular $\int_{\mathcal{C}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ donde \mathcal{C} es la circunferencia unitaria centrada en el origen orientada positivamente. Calcular $Q_x - P_y$. ¿Se satisface en este caso el Teorema de Green?

Ejercicio 12. Calcular $\int_{\mathcal{C}} P \, dx + Q \, dy$ siendo

$$P(x, y) = \frac{x \sin\left(\frac{\pi}{2(x^2+y^2)}\right) - y(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)^2}, \quad Q(x, y) = \frac{y \sin\left(\frac{\pi}{2(x^2+y^2)}\right) + x(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)^2},$$

y \mathcal{C} la curva

$$\mathcal{C} = \begin{cases} y = x + 1 & \text{si } -1 \leq x \leq 0, \\ y = 1 - x & \text{si } 0 \leq x \leq 1, \end{cases}$$

recorrida del $(-1, 0)$ al $(1, 0)$.

Ejercicio 13. Determinar todas las circunferencias \mathcal{C} en el plano \mathbb{R}^2 sobre las cuales vale la igualdad

$$\int_{\mathcal{C}} -y^2 \, dx + 3x \, dy = 6\pi.$$

Ejercicio 14. Calcular la integral $\int_{\mathcal{C}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ donde

$$\mathbf{F}(x, y) = (y^2 e^x + \cos x + (x - y)^2, 2ye^x + \sin y),$$

y \mathcal{C} es la curva $x^2 + y^2 = 1$ con $y \geq 0$, orientada de manera tal que comience en $(1, 0)$ y termine en $(-1, 0)$.

Ejercicio 15. Sean $u, v \in C^1(D)$, donde $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} \leq 1\}$. Consideremos los campos definidos por $\mathbf{F}(x, y) = (u(x, y), v(x, y))$, $\mathbf{G}(x, y) = (v_x - v_y, u_x - u_y)$. Calcular

$$\iint_D (\mathbf{F} \cdot \mathbf{G})(x, y) \, dx \, dy$$

sabiendo que sobre el borde de D se tiene $u(x, y) = x$ y $v(x, y) = 1$.