

Ecuaciones Diferenciales A/B – 2º cuatrimestre 2024

PRÁCTICA 5: ECUACIÓN DEL CALOR

Ejercicio 1. Sea $v : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y sea $u : \mathbb{R} \times (0, \infty)$ la función definida por:

$$u(x, t) = v(x^2/t).$$

1. Verificar que u satisface la ecuación del calor en $\mathbb{R} \times (0, \infty)$ si y sólo si v es solución de la siguiente ecuación diferencial ordinaria:

$$4zv''(z) + (2+z)v'(z) = 0 \quad z > 0,$$

y que la solución general de esta última ecuación está dada por:

$$v(z) = C_1 \int_0^z e^{-s/4} s^{-1/2} ds + C_2 \quad z > 0 \quad (C_1, C_2 \in \mathbb{R}).$$

2. Usar el ítem 1 para deducir la solución fundamental de la ecuación del calor en $\mathbb{R} \times (0, \infty)$.

Sugerencia: Verificar primero que si u es una solución *suficientemente* derivable de la ecuación del calor en $\mathbb{R} \times (0, \infty)$ entonces $\partial_x u$ también lo es.

Ejercicio 2. Sea $v : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y sea $u : \mathbb{R}^n \times (0, \infty)$ la función definida por:

$$u(x, t) = t^{-\alpha} v(xt^{-\beta}),$$

para $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ dados.

1. Verificar que u satisface la ecuación del calor en $\mathbb{R}^n \times (0, \infty)$ si y sólo si v es solución de la siguiente ecuación:

$$(1) \quad \alpha t^{-(\alpha+1)} v(y) + \beta t^{-(\alpha+1)} y \cdot \nabla v(y) + t^{-(\alpha+2\beta)} \Delta v(y) = 0 \quad y = t^{-\beta} x \in \mathbb{R}^n, t > 0.$$

2. Verificar que si $\beta = 1/2$ entonces la ecuación (1) se reduce a:

$$\alpha v(y) + \frac{1}{2} y \cdot \nabla v(y) + \Delta v(y) = 0 \quad y \in \mathbb{R}^n,$$

y que si una función radial v , digamos $v(y) = w(|y|)$ para $w : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, es solución de esta ecuación entonces w satisface:

$$\alpha w(r) + \frac{1}{2} r w'(r) + w''(r) + \frac{n-1}{r} w'(r) = 0 \quad r > 0.$$

3. Deducir la solución fundamental de la ecuación del calor en $\mathbb{R}^n \times (0, \infty)$ a partir de considerar $\alpha = n/2$ y $\beta = 1/2$.

Ejercicio 3.

1. Hallar todas las soluciones u de la ecuación del calor en $\mathbb{R} \times (0, \infty)$ que satisfacen:

$$u(x, t) = u(\lambda x, \lambda^2 t) \quad \forall x, \lambda \in \mathbb{R}, t > 0.$$

2. Repetir el ítem 1 para la ecuación no lineal $\partial_x (K(u) \partial_x u) = \partial_t u$, donde $K \in C^1(\mathbb{R})$.
3. Verificar que si u es solución de la ecuación del calor en $\mathbb{R}^n \times (0, +\infty)$ entonces la función u_λ definida por $u_\lambda(x, t) = u(\lambda x, \lambda^2 t)$ también lo es, cualquiera sea $\lambda \in \mathbb{R}$.

Ejercicio 4. Sea u_i una solución de la ecuación del calor en $\mathbb{R} \times (0, \infty)$ que satisface la condición inicial $u_i(\cdot, 0) = \varphi_i$, donde φ_i está dado e $i = 1, \dots, n$. Probar que la función $u : \mathbb{R}^n \times [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ definida por:

$$u(x, t) = u_1(x_1, t) u_2(x_2, t) \dots u_n(x_n, t),$$

es solución de la ecuación del calor en $\mathbb{R}^n \times (0, \infty)$ y satisface $u(\cdot, 0) = \varphi$, donde $\varphi(x) = \varphi_1(x_1) \varphi_2(x_2) \dots \varphi_n(x_n)$ para $x \in \mathbb{R}^n$.

Ejercicio 5 (Ecuaciones que se pueden reducir a la ecuación del calor). Determinar explícitamente el cambio de variables sugerido en cada ítem para obtener que u es solución de la ecuación dada si y sólo si v es solución de la ecuación del calor:

1. $u_t(x, t) = a(t)\Delta u(x, t)$ en $\mathbb{R}^n \times (0, \infty)$, $a : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ continua y positiva.

Cambio de variables: $t = \phi(\tau)$, $v(x, \tau) = u(x, \phi(\tau))$.

2. $u_t(x, t) = \Delta u(x, t) + b(t) \cdot \nabla u(x, t)$ en $\mathbb{R}^n \times (0, \infty)$, $b : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}^n$ continua.

Cambio de variables: $x = \psi(y, t)$, $v(y, t) = u(\psi(y, t), t)$.

3. $u_t(x, t) + c(t)u(x, t) = \Delta u(x, t)$ en $\mathbb{R}^n \times (0, \infty)$, $c : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ continua.

Cambio de variables: $v(x, t) = u(x, t)\varphi(t)$.

Ejercicio 6 (Principio de Duhamel). Para $s > 0$, sea $v(\cdot; s) : [0, \ell] \times [s, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ solución del problema:

$$\begin{cases} v_t(x, t; s) - v_{xx}(x, t; s) = 0 & 0 < x < \ell, t > s, \\ v(0, t; s) = v(\ell, t; s) = 0 & t > s, \\ v(x, s; s) = g(x, s) & 0 < x < \ell. \end{cases}$$

Probar que la función $u : [0, \ell] \times [s, \infty)$ definida por:

$$u(x, t) = \int_0^t v(x, t; s) ds,$$

es solución del siguiente problema para la ecuación del calor no homogénea:

$$\begin{cases} u_t(x, t) - u_{xx}(x, t) = g(x, t) & 0 < x < \ell, t > 0, \\ u(0, t) = u(\ell, t) = 0 & t > 0, \\ u(x, 0) = 0 & 0 < x < \ell. \end{cases}$$

Ejercicio 7. Deducir la solución dada para cada uno de los siguientes problemas:

1. $u_t - u_{xx} = 0$ $x > 0, t > 0$, $u(x, 0) = 0$ $x > 0$, $u(0, t) = h(t)$ $t > 0$, donde $h(0) = 0$.

Solución: $u(x, t) = \frac{x}{\sqrt{4\pi}} \int_0^t \frac{1}{(t-s)^{3/2}} e^{-\frac{x^2}{4(t-s)}} h(s) ds$.

Sugerencia: Definir $v(x, t) = u(x, t) - h(t)$ y extender a $v(\cdot, t)$ por imparidad.

2. $u_t - u_{xx} = 0$ $x > 0, t > 0$, $u(x, 0) = f(x)$ $x > 0$, $u_x(0, t) = 0$ $t > 0$.

Solución: $u(x, t) = \int_0^\infty N(x, \xi, t) f(\xi) d\xi$,

donde $N(x, \xi, t) = \Phi(x - \xi, t) + \Phi(x + \xi, t)$ y Φ es la solución fundamental de la ecuación del calor.

Sugerencia: Extender f por paridad a $-\infty < x < 0$ y resolver el problema de valores iniciales para la f extendida.

Definición: Para $T > 0$ y $U \subset \mathbb{R}^n$ abierto y acotado, definimos:

$$U_T = U \times (0, T], \quad \partial_p U_T = \overline{U_T} \setminus U_T.$$

Al conjunto $\partial_p U_T$ se lo denomina "frontera parabólica" de U_T .

Ejercicio 8 (Principio débil del máximo para subsoluciones de la ecuación del calor). Se dice que $u \in C^{2,1}(U_T) \cap C(\overline{U_T})$ es una *subsolución* de la ecuación del calor en U_T si:

$$u_t - \Delta u \leq 0 \quad \text{en } U_T.$$

Demostrar que si u es una subsolución de la ecuación del calor en U_T entonces $\max_{\overline{U_T}} u = \max_{\partial_p U_T} u$.

Ejercicio 9. Sea $u \in C^{2,1}(U_T) \cap C(\overline{U_T})$ solución del problema:

$$u_t - \Delta u = f \quad \text{en } U_T, \quad u = 0 \quad \text{sobre } \partial_p U_T,$$

donde f no depende de t . Probar que si $f \leq 0$, entonces $u_t \leq 0$.

Sugerencia: Definir $w(x, t) = u(x, t + \varepsilon) - u(x, t)$, calcular $w_t - \Delta w$ y aplicar el principio del máximo.

Ejercicio 10. Sea $u \in C^{2,1}(U_T) \cap C(\overline{U_T})$ una solución de la ecuación del calor en U_T y sea $K \subset \overline{U_T} \setminus \partial_p U_T$ compacto. Probar que existe $C > 0$ constante que depende de $\text{dist}(K, \partial_p U_T)$ tal que:

$$\sup_K |\nabla_x u| \leq C \sup_{U_T} |u|.$$

Sugerencia: Probar primero que si u es solución de la ecuación del calor en $C(0, 0; 2)$ entonces existe $C > 0$ constante tal que:

$$\sup_{C(0,0;1)} |\nabla_x u| \leq C \sup_{C(0,0;2)} |u|,$$

donde $C(x, t; r) = B_r(x) \times (t - r^2, t]$ para $x \in \mathbb{R}^n$, $t > 0$ y $r > 0$.

Ejercicio 11. Para $n \in \mathbb{N}$, sea $u_n \in C^{2,1}(U_T)$ una solución del siguiente problema:

$$\partial_t u_n - \Delta u_n = 0 \quad \text{en } U_T, \quad u_n = f_n \quad \text{sobre } \partial_p U_T.$$

Probar que si $f_n \rightarrow f$ uniformemente en $\partial_p U_T$, entonces existe $u \in C^{2,1}(U_T)$ tal que $u_n \rightarrow u$ uniformemente en U_T y u es solución de:

$$u_t - \Delta u = 0 \quad \text{en } U_T, \quad u = f \quad \text{en } \partial_p U_T.$$

Ejercicio 12.

1. Probar que si u es una solución acotada de la ecuación del calor en \mathbb{R}^{n+1} entonces u es constante. ¿Es cierto el resultado si eliminamos la hipótesis que u sea acotada?
2. Sea u una función Lipschitz continua que satisface la ecuación del calor en \mathbb{R}^{n+1} y tal que $u = 0$ si $x_1 = 0$. Probar que existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tal que $u(x, t) = \alpha x_1$.

Ejercicio 13 (Principio del máximo para problemas parabólicos). Sean $T > 0$ y $U \subset \mathbb{R}^n$ abierto y acotado. Probar que si $u \in C^{2,1}(U_T) \cap C(\overline{U_T})$ satisface:

$$u_t + \mathcal{L}u = 0 \quad \text{en } U_T,$$

entonces $\max_{\overline{U_T}} u = \max_{\partial_p U_T} u$, donde $\partial_t + \mathcal{L}$ es el operador *parabólico* definido por:

$$\partial_t u + \mathcal{L}u = \partial_t u - \sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x, t) \partial_{ij} u + \sum_{i=1}^n b_i(x, t) \partial_i u,$$

los coeficientes a_{ij}, b_i son continuos en U_T y la matriz $A = (a_{ij})$ es simétrica definida positiva para cada $(x, t) \in U_T$.