

Práctica 3

Derivabilidad / Ecuaciones de Cauchy - Riemann

1. Calcular la función derivada de las siguientes funciones:

a) $f(z) = z$ b) $f(z) = z^2$ c) $f(z) = \frac{1}{z}$

2. Sea $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ derivable en $z_0 \in \mathbb{C}$. Probar que existe $\alpha : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, \mathbb{C} -lineal, tal que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0) - \alpha(h)}{h} = 0$$

• **Regla de L'Hospital**

Sean f, g funciones holomorfas en z_0 tales que $f(z_0) = g(z_0) = 0$ y $g'(z_0) \neq 0$. Entonces:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z)}{g(z)} = \frac{f'(z_0)}{g'(z_0)}$$

3. Calcular:

a) $\lim_{z \rightarrow i} \frac{z^{10} + 1}{z^6 + 1}$ c) $\lim_{z \rightarrow e^{\frac{\pi i}{3}}} \frac{z - e^{\frac{\pi i}{3}}}{z^3 + 1}$

b) $\lim_{z \rightarrow 2i} \frac{z^2 + 4}{2z^2 + (3 - 4i)z - 6i}$ d) $\lim_{z \rightarrow i} \frac{z^2 - 2iz + 1}{z^4 + 2z^2 + 1}$

4. Sea $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$. Dar condiciones necesarias y suficientes sobre sus partes real e imaginaria de modo que resulte derivable en $a \in \mathbb{R}$ y calcular $\gamma'(a)$. Calcular $\gamma'(t)$ para $\gamma(t) = \cos t + i \sin t$.

5. Sean $f, g : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ dadas por

$$f(x, y) = \sqrt{|xy|} \qquad g(x + iy) = \begin{cases} \frac{x^3 - y^3 + i(x^3 + y^3)}{x^2 + y^2} & x + iy \neq 0, \\ 0 & x + iy = 0. \end{cases}$$

Demostrar que f, g son continuas en 0 y verifican las ecuaciones de Cauchy-Riemann pero no son derivables.

6. Sea $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ la función dada por

$$f(x + iy) = \begin{cases} \frac{x^3y + i(x^2y^2)}{x^4 + y^2} & x + iy \neq 0, \\ 0 & x + iy = 0. \end{cases}$$

- a) Verificar que se cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann en el $(0, 0)$.
- b) Analizar el límite de diferenciabilidad para f en $(0, 0)$ por rectas.
- c) Probar que f no es derivable en $z = 0$.

7. a) Mostrar que las condiciones de Cauchy-Riemann en coordenadas polares se escriben:

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta} \qquad \frac{\partial v}{\partial r} = -\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta}$$

b) Verificar que en coordenadas polares se tiene

$$f' = e^{-i\theta} \left(\frac{\partial u}{\partial r} + i \frac{\partial v}{\partial r} \right) = \frac{e^{-i\theta}}{r} \left(\frac{\partial v}{\partial \theta} - i \frac{\partial u}{\partial \theta} \right).$$

c) Calcular la derivada de $f(z) = z^{\frac{m}{n}} = r^{\frac{m}{n}} \left(\cos \frac{m\theta}{n} + i \operatorname{sen} \frac{m\theta}{n} \right)$

8. Determinar los puntos donde f es derivable y donde es holomorfa.

a) $f(z) = \begin{cases} \frac{x + iy}{x^2 + y^2} & z \neq 0, \\ 0 & z = 0. \end{cases}$

b) $f(z) = \bar{z}$

c) $f(z) = x^2 + iy^2$

d) $f(z) = x^2 - y^2 - 2xy + i(x^2 - y^2 + 2xy)$

9. Determinar si las siguientes funciones son holomorfas en los conjuntos especificados y, en caso de no serlo, encontrar un conjunto abierto en el que la función sea holomorfa o bien demostrar que no es holomorfa en ninguna parte.

a) $f(z) = \frac{3 + 2z}{i + 2z}$ en $D : |z| < 1$

b) $f(z) = \cos x$ en $D : |z| < 1$

c) $f(z) = e^{-y}(\cos x + i \operatorname{sen} x)$ en \mathbb{C}

d) $f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$ en \mathbb{C} (P, Q polinomios)

e) $f(z) = \frac{P(z) \cdot Q(z)}{z}$ en $D : 0 < |z| < 1$ (P, Q polinomios)

10. Analizar dónde son holomorfas las siguientes funciones y hallar $f'(z)$ en cada caso.

- a) $f(z) = z^3 - 2z$
- b) $f(z) = \frac{z+1}{1-z}$
- c) $f(z) = z^2 \cdot \bar{z}$
- d) $f(z) = x^2 + iy^3$
- e) $f(z) = e^x(\cos y + i \operatorname{sen} y)$

11. Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ abierto y conexo. Probar:

- a) Si f y \bar{f} son holomorfas en Ω , entonces f es constante.
- b) Si f es holomorfa en Ω y $f' = 0$ en Ω , entonces f es constante en Ω .
- c) Si f y g son holomorfas en Ω y $f' = g'$ en Ω , entonces $f - g$ es constante en Ω .

¿Es necesaria la hipótesis de conexión?

12. Sea $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ holomorfa. Probar:

- a) $\operatorname{Re}(f)$ constante $\Rightarrow f$ constante.
- b) $\operatorname{Im}(f)$ constante $\Rightarrow f$ constante.
- c) $|f|$ constante $\Rightarrow f$ constante.
- d) $\operatorname{Arg}(f)$ constante $\Rightarrow f$ constante.

13. Sea $u(x, y) = e^{-x}(x \operatorname{sen} y - y \cos y)$.

- a) Probar que u es armónica.
- b) Encontrar v tal que $f = u + iv$ sea holomorfa.
- c) Hacer lo mismo para $u(x, y) = 2x(1 - y)$

14. Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ abierto, y sea $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. Decimos que $v : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ es conjugada armónica de u (en Ω) si $f = u + iv$ es holomorfa en Ω .

- a) Probar que si v y \tilde{v} son conjugadas armónicas de u en Ω , entonces v y \tilde{v} difieren en una constante aditiva. ¿Falta alguna hipótesis?
- b) Probar que si u y v son mutuamente conjugadas armónicas, entonces son constantes. ¿Falta alguna hipótesis?

15. a) Hallar todas las funciones holomorfas de \mathbb{C} en \mathbb{C} tales que su parte real es $x^2 - y^2$.

b) Hallar el polinomio armónico más general entre los de la forma:

$$ax^3 + bx^2y + cxy^2 + dy^3$$

Encontrar además la función armónica conjugada y la correspondiente función holomorfa.

- c) Encontrar una función f holomorfa en todo el plano complejo cuya parte real sea $e^x(x \cos y - y \sin y)$.
- d) Mostrar que $f(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2}$ es armónica. Indicar su dominio de armonicidad y hallar una función holomorfa que tenga a f como parte imaginaria.
- e) Dada $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de clase C^2 se sabe que $u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $u(x, y) = F(xy)$ es armónica en \mathbb{R}^2 . ¿Cómo debe ser F ?
16. Demostrar que si f es holomorfa en un abierto conexo $\Omega \subset \mathbb{C}$ y $f(z) \cdot \overline{f(z)} \neq 0$ para todo $z \in \Omega$, entonces $g(z) = \log |f(z)|$ es armónica en Ω .