

Práctica 5

Integrales complejas y fórmulas de Cauchy

1. Calcular

a) $\int_0^{\pi/4} e^{it} dt$ b) $\int_0^\infty e^{-zt} dt \quad (\operatorname{Re}(z) > 0)$ c) $\int_1^2 \log(it) dt$

2. a) Sean γ, σ las poligonales de vértices $\{1, i\}$ y $\{1, 1+i, i\}$ respectivamente. Hallar una parametrización de γ y de σ y calcular $\int_\gamma f$ y $\int_\sigma f$, donde $f(z) = |z|^2$.

b) Deducir que en el plano complejo deja de ser cierto que toda función continua tiene primitiva.

3. Calcular: $\int_\gamma 3z dz$ y $\int_\gamma 3|z| dz$, para

- a) γ : segmento que une -1 con 1 .
- b) γ : $|z| = 1$ de -1 a 1 , recorrido en el sentido horario.
- c) γ : $|z| = 1$ de -1 a 1 , recorrido en el sentido antihorario.
- d) γ : poligonal de vértices $-1, i, 1$.

4. Calcular

- a) $\int_C e^z dz$, si $C : \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$, recorrida una vez en sentido horario.
- b) $\int_0^1 x dz$, uniendo ambos puntos con un segmento y luego con la poligonal de vértices: $0, i, 1$.
- c) $\int_{|z-a|=r} (z-a)^m dz$ para cada $m \in \mathbb{Z}$, recorriendo la curva una vez en sentido horario.

5. Sea γ el polígono cerrado de vértices: $1-i, 1+i, -1+i, -1-i, 1-i$.

Hallar $\int_\gamma \frac{dz}{z}$.

6. Sean $D \subset \mathbb{C}$ abierto, $\gamma : [a, b] \rightarrow D$ diferenciable a trozos y $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ continua. Se define:

$$\int_\gamma f |dz| = \int_a^b f(\gamma(t)) |\gamma'(t)| dt$$

a) ¿Qué se obtiene cuando $f \equiv 1$?

b) Calcular $\int_{\gamma} |dz|$ para $\gamma : |z - a| = r$.

c) Probar que $\left| \int_{\gamma} f dz \right| \leq \int_{\gamma} |f| |dz|$ y deducir que si $|f(z)| \leq M$ y $\ell = \text{long}(\gamma)$, entonces $\left| \int_{\gamma} f dz \right| \leq M\ell$.

7. Calcular

a) $\int_{\gamma} x dz$, γ : segmento de 0 a $1 + i$

b) $\int_{|z|=1} |z - 1| |dz|$

c) $\int_{C_i} z^n dz$ ($a \in \mathbb{R}_{>0}, n \in \mathbb{N}$)

$$C_1 : z(t) = ae^{it}, 0 \leq t \leq \pi; \quad C_2 : z(t) = ae^{it}, 0 \leq t \leq 2\pi$$

d) $\int_{C_i} \frac{dz}{z - 2}$ $C_1 : |z - 2| = 4$; $C_2 : |z - 1| = 5$

e) $\int_{\gamma} (x^2 + iy^2) |dz|$ $\gamma : |z| = 2$

f) $\int_{|z-1|=1} \bar{z}^2 dz$

8. Hallar $\int_{\gamma} z^{-\frac{1}{2}} dz$, donde:

a) $\gamma : |z| = 1$, $\text{Im}(z) \geq 0$, de 1 a -1 .

b) $\gamma : |z| = 1$, $\text{Im}(z) \leq 0$, de 1 a -1 .

9. Sea $\gamma(t) = 1 + e^{it}$ para $0 \leq t \leq 2\pi$. Hallar

a) $\int_{\gamma} (z^2 - 1)^{-1} dz$.

b) Idem para $\gamma(t) = 2e^{it}$, $-\pi \leq t \leq \pi$.

10. Sea f holomorfa en un abierto conexo Ω tal que $|f(z) - 1| < 1$ en Ω . Mostrar que

$$\int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = 0 \text{ para cualquier curva cerrada } \gamma \text{ contenida en } \Omega.$$

Nota: f' es continua.

- Comparar $\int_{\gamma} f(z) dz$ y $\int_{\gamma} g(z) dz$, siendo $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C} - \mathbb{R}_{\leq 0}$ una curva que une 1 con i .

- a) $f(z) = ze^{-z}$
- b) $f(z) = \frac{1}{z^2 + 2z + 2}$

- a) $\int_{\gamma} \frac{e^{iz}}{z^2} dz, \quad \gamma(t) = e^{it}, 0 \leq t \leq 2\pi$
- b) $\int_{\gamma} \frac{\operatorname{sen} z}{z^3} dz, \quad \gamma(t) = e^{it}, 0 \leq t \leq 2\pi$
- c) $\int_{\gamma} \frac{e^z - e^{-z}}{z^n} dz, \quad \gamma(t) = e^{it}, 0 \leq t \leq 2\pi, n \in \mathbb{N}$
- d) $\int_{\gamma} \frac{dz}{(z - \frac{1}{2})^n}, \quad \gamma(t) = \frac{1}{2} + e^{it}, 0 \leq t \leq 2\pi, n \in \mathbb{N}$
- e) $\int_{\gamma} \frac{\log z}{z^n} dz, \quad \gamma(t) = 1 + \frac{1}{2}e^{it}, 0 \leq t \leq 2\pi, n \geq 0.$
- f) $\int_{\gamma} \frac{z^2 + 1}{z(z^2 + 4)} dz, \quad \gamma(t) = re^{it}, 0 \leq t \leq 2\pi, r \in \mathbb{R}_{>0} - \{2\}.$

a) Sea f holomorfa en $B(a, R)$ y tal que $|f(z)| \leq M$ para todo $z \in B(a, R)$. Probar que en tal caso:

$$|f^{(n)}(a)| \leq \frac{n!M}{B^n}$$

- $$|f^{(n)}(z)| > n! \cdot n^n$$

- Deducir que si f es una función entera tal que para algún $k \geq 0$, $\lim_{|z| \rightarrow \infty} \left| \frac{f(z)}{z^k} \right| = 0$, entonces f es un polinomio de grado menor que k (si $k > 0$) o $f \equiv 0$ (si $k = 0$).

17

